



**Digitization of the scientific library of the
State Museum of Natural History of NAS**

Jarocki, Felix Paweł Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne. T. 3:
Gady i Płazy / Felix Paweł. Jarocki. – w Warszawie: w Drukarni
Łątkiewicza, 1822. – 184 s.; trzema rycinami.; Spis nazwisk: 8 s.

Download a copy of the book from the site:

<http://libsmnh.com.ua>

Permanent link to the book page:

http://libsmnh.com.ua/books/jarocki_f_p/zoologia_czyli_zwierzetopismo_ogolne_t3/

Biblioteka Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie.


Sz 1e N^o 52.

17-52.

3



1984



ZOOLOGIIA

czyli

ZWIĘRZĘTOPISMO OGÓLNE

podług

NÁYNOWSZEGO SYSTEMATU

ułożone

przez

FELIXA PAWŁA JAROCKIEGO,

NAUK WYZWOLONYCH i FILOZOFII DOKTORA, PROFESSORA ZOOLOGII W KRÓLEWSKO WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE, CZŁONKA TOWARZYSTWA MINERALOGICZNEGO W JENIE, etc.

Nr. inwentarza

A-52

TOM TRZECI.

z trzema rycinami

DZIAŁ
PRZYRODNICZY

Gady i Płazy.

W WARSZAWIE,

W Drukarni Łatkiewicza przy Ulicy Senatorskiej Nr. 467.

1822.



76

56. A.

Terribilia sunt opera TUA, o DOMINE!

In multitudine virtutis TUAE TE mentientur inimici Tui.

David *Psalm.* LXV. v. 3.

DO CZYTELNIKA.

Lubo przy ogłoszeniu prenumeraty na to dzieło nie omieszkalem uprzedzić o tém Czytelników, że z *przyczyny nierównéy wielkości gromád tomy jego nie mogą mieć grubości jednakiéy*: mimo to poczytuie sobie za obowiązek podanie przyczyny, dla którój ten tom musiał wyśdź tak cienki. Tych dwóch w nim zawartych gromád nie móglem złączyć z gromadą następującą; gdyż ta jest tak wielką, jż sama jedna da tom (między témi pięcioma) náywiększy. Rozerwanie więc tak pięknéy gromady dla powiększenia tomu trzeciego, wiem, że każdy byłby mi za złe poczytał.

DALSZY POCZET ALFABETYCZNY,

JO. JW. WW. JMci PANÓW PRENUMERATORÓW.

<i>Abitz August</i> , Uczeń z Wydziału Lékarskiego w Król. Warszawsko Uniwersytecie	-	I.
<i>Andrzejowski Antoni</i> , Adjunkt przy katedrze Zo- ologii i Botaniki Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu	- - - - -	I.
<i>Aubry Ignacy</i> , Nauczyciel w Domu JW. Po- tockich	- - - - -	I.
<i>Baszyński Mikołaj Józef</i> , Członek Kommissyi Hi- poteczney w Płocku	- - - - -	I.
<i>Besser</i> , Medycyny Doktor, Professor Historji Na- turalney przy Liceum Wołyńskiem w Krze- miencu	- " - - - - -	I.
Biblioteka Szkoły w Lubomlu	- - - - -	I.
<i>Dulnicki Szymon</i> , Uczeń z Wydziału Lékarskiego w Król. Warszawskim Uniwersytecie	-	I.
<i>Falkowski Jakób</i> , X. Rektór Instytutu Głuchonie- mych w Warszawie, etc.	- - - - -	I.
<i>Grodecki Wincenty</i> , Uczeń w Konwikcie XX. PP. w Warszawie	- - - - -	I.
<i>Hildebrand Stanisław</i> , Uczeń z Wydziału Lékar- skiego w Królewsko Warszawskim Uni- wersytecie	- - - - -	I.
<i>Janicki Stanisław</i> , Professor przy Szkole Woie- wódzkiej w Płocku	- - - - -	I.

<i>Kadłubowski Damazy</i> , Uczeń z Wydziału Lékar- skiego w Król. Warszawskim Uniwersytecie	1.
<i>Kowalski</i> , X. Rektór Szkoły Podwydziałowéy w Pińczowie - - - - -	1.
<i>Krieger Józef</i> , Uczeń w Konwikcie XX. Piiarów w Warszawie - - - - -	1.
<i>K. H. P. T. 1. J. w W. K.</i> - - - - -	1.
<i>Kubeszewski</i> , Rektór Szkoły Wydziałowéy w San- domierzu - - - - -	1.
<i>Kurowski Xawery</i> , SS. PP. w Warszawie - - - - -	1.
<i>Leszkiewicz Józef</i> , Uczeń w Lyceum Warszawskiem	1.
<i>Łytkowski Stanisław</i> , Uczeń z Wydziału Prawa w Królewsko Warszawskim Uniwersytecie	1.
<i>Marewicz</i> , Urzędnik Stanu Cywilnego - - - - -	1.
<i>Niezabitowski Stefan</i> , Uczeń w Konwikcie XX. PP. w Warszawie - - - - -	1.
<i>Ogrodowicz (Józef i Antoni)</i> Uczniowie w Lyce- um Warszawskiem - - - - -	1.
<i>Orłowski Ján i Jasiński Józef</i> , Uczniowie w Lyce- um Warszawskiem - - - - -	1.
<i>Pinko Józef</i> - - - - -	1.
<i>Reindl Jakób</i> , Uczeń z Wydziału Lécarskiego Król. Warszaw. Uniwersytetu - - - - -	1.
<i>Rydecki Julian</i> , Uczeń w Lyceum Warszawskiem	1.
<i>Skierkowski Hilary</i> , Uczeń w Lyceum Warszaw- skiem - - - - -	1.
<i>Sikorski Antoni</i> , Uczeń z Wydziału Lécarskiego Królewsko Warszawskiego Uniwersytetu -	1.
<i>Soiecki Józef</i> , Uczeń z Wydziałów Prawa i Filo- zofii w Królewsko Warszawskim Uniwer- sytecie - - - - -	1.

<i>Suchecki Stanisław</i> , Uczeń z Wydziału Lékar- skiego w Królewsko Warszawskim Uni- wersytecie	- - - - -	I.
<i>Szulce Stanisław</i> , Uczeń w Lyceum Warszawskiem		I.
<i>Wagner Tadeusz</i> , Rektór Szkoły w Lubomlu	-	I.
<i>Wołłowicz Michał</i> , Uczeń w Konwikcie XX. PP. w Warszawie	- - - - -	I.
<i>Zieliński Antoni</i> , Uczeń z Wydziału Lécarskiego w Król. Warszawskim Uniwersytecie	-	I.

Prenumerata będzie jescze przyymowaną; a jmiona
w tym czasie Prenumeruiących umieszczone będą na cze-
le Tomu czwartego.



Upraszám Czytelników, ażeby następujące uchybie-
nia druku w tym tomie sprostować raczyli.

Strona	7. w.	2. od góry jest ściegu	<i>czytáy</i>	ściegn
—	15. — 17.	— — jednym	—	jednym
—	27. — 8.	— — w kiku	—	w kilku
—	32. — 4. od dołu	— Dzioboszczek	—	Dzioboszczek.
—	49. — 17. od góry	— podług	—	podług
—	52. — 6. od dołu	— urządzenie	—	urządzenie
—	58. — 9.	— — po cytował	—	pocytował
—	79. — 2. od góry	— Przodonog	—	Przodonóg
—	112. — 12. od dołu	— dwunastu	—	dwánastu
—	150. — 1.	— — jadowite	—	jadowite.
—	146. — 3. od góry	— krzywá	—	krzyżowá
—	148. — 1. od dołu	— nieoznaczono	—	nie oznaczoná
—	151. — 13. od góry	— Grzebiatoroda	—	Grzbiatoroda
—	158. — 10. od dołu	— des-jones	—	des-joncs
—	166. — 1. od góry	— Zaba	—	Żaba
w kilku miejscach		— Rodzay	—	Rodzáy



W TOMIE DRUGIM

Uszły sprostowania następujące uchy-
bienia druku:

Strona.	14. w.	7. od góry	<i>jest</i>	mieysce	<i>czytáy</i>	mieysca
—	26. —	2. —	—	maculirostrix	—	maculirostris
—	186. —	6. —	—	Parqua	—	Parraqua

DO JNTROLIGATORA.

Proszę przy oprawianiu Ryciny przełożyć czy-
stym papierem; boby się popłamiły.

G A D Y.

R E P T I L I A.

Multa hoc primum cognovimus seculo, et multa venientis ævi populus ignota nobis sciet.

SENECA. *Lib. 7. quæst. nat. 31.*

Tablica I. (98.)

G R O M A D A C Z W Á R T Ą
G A D Y. R E P T I L I A.

Zwierzęta Grzbietne bez cyców, bez włosów i bez piór: mającą czerwoną zimną krew, płuca do oddychania, serce o dwóch uszkach a o jednej komórce: nie podlegające w młodości przemianom.

	Rzędy.	ORDINES.
Zwierzęta Złoty	wyraźne; ciało pokryte { pancérzem kościanym . . . 1. Żółwie	<i>Chelonii.</i>
	{ skórą łuskowatą . . . 2. Jaszczurki.	<i>Saurii.</i>
	{ żądne; ciało długie, wysmukłe . . . 3. Węże.	<i>Serpentes.</i>

UWĄGI DO TABLICY I. (98.)

Gromadę *Gadów* zaczynamy *dział drugi* Zwierząt Grzbietnych: t. j. zaczynamy uwagi nad takimi zwierzętami, które mają krew czerwoną zimną.

Mówiąc w ogólności o gromadach zwierząt, zastanawialiśmy się dość obszernie nad *Gadami* (*): nie wiele przeto pozostało nam takich punktów, któreby się do wszystkich rozciągały. Następujące jednakże postrzeżenia godne są uwagi naszej.

(*) Patrz w Tomie *Pierwszym* na stronie 31 i na następnych.

Wszystkie prawie *Gady* nie mają błony podpiersiowej (*diaphragma*): wszystkie zatem ich wnętrzności znajdują się w jednéj i téj saméj klatce czyli komórce brzuchowej. Od téj ogólnej reguły pokrewieństwo *Krokodyłów* czyni poniekąd wyjątek, o którym na swoim miejscu mówić niezaniedbamy.

Wszystkie niemal mają głos słaby, syczący; gdwż tylko niektóre w rzędzie *Zółwiów* wydają czasami prosty, nieprzyjemny ton gwizdzący.

Zwróciwszy uwagę naszą na dopiero odczytaną tablicę, widzimy w niéj *Gady* podzielone na trzy tak od siebie odznaczone rzędy, iż w całym Królestwie Zwierząt trudno drugiego dobrać gromady, w którejby się tak uderzające różnice (równie w zewnętrzną jak w wewnętrzną budowę ciała) między rzędami postrzegać dały. Z tego względu gromada ta zasługuje na szczególniejszą uwagę; każdy albowiem jej rząd здаie się stanowić osobną gromadę. Zastanówmy się więc bliżej nad każdym z nich w szczególności.



Tablica II. (99.)

R z z d P i é r w s z y. (27.) Ż Ó Ł W I E. C H E L O N I I.

Gady mające nogi wyraźnych czterech palce zakończone pazurami: ciało obszerne, owalowe, pancierzem kościanym z dwóch tarcz złożonym pokryte.

RODZAJE. GENERA.

1. Szykret. *Chelonia.*

2. Żółw. *Testudo.*

3. Wodnożółw. *Emys.*

4. Żółwiak. *Trionyx.*

5. Żmionożółw. *Ophichelone.*

6. Żółwiozwierz. *Chelys.*

Z u c h w y

ostre, rogowe; nogi

pleciowate, spłaszczone; przednie dłuższe niż tylne

pochodowe; puklerz

przyzwyczajony; palce

wolne, krótkie

spięte; wargi

zamały; ogon długości ciała

plaskie, bez rogowej obwódki; paszcz obszerne, puklerz za mały

UWĄGI DO TABLICY II. (99.)

Zwierzęta rzędu tego, które dotąd pod ogólnym nazwiskiem *Żółwi* są znane, różnią się zaraz na pierwszy rzut oka od wszystkich jnnych zwierząt dwiema obszernemi tarczami, między którymi ciało jch jak w pancerzu jest zawarte; a z pomiędzy których większą jch liczba tylko w czasie ruchu głowę z szyją, nogi i ogon wysuwają. Jedna z tych tarcz znajduje się na wierzchu, a drugą pod spodem jch ciała. —

Dla krótszego wyrażenia, *tarcz wierzchnią* nazywać będziemy u nich *Puklérzem* (Carapace albo Bouclier); zaś *spodnią* bez przydawania przymiotnika zowiemy *Tarczą* (Plastron). *Puklérz* uważany wraz z *tarczą* mieć będzie nazwisko *Pancérza* (Cuirasse, Lorica). Nakoniec *głowę z szyją, nogi i ogon* oznaczać będziemy ogólnym nazwiskiem *Członki*.

Puklérz Żółwia złożony jest z kości pściérza grzbietowego i z żeber, których zwykle liczymy *ośm par*. Wszystkie te kości są z wierzchu spłaszczone, niezmiernie rozszerzone i z sobą pospajane w ten sposób, że tworzą z siebie jednostayną, mniéj więcéy wypukłą, owalowatą skorupę, którą wierzch ciała jch pokrywają.

Tarcz jch składa się z *dziwięciu* kości piersiowych, które podobnie jak przeszłe spłaszczone i niezmiernie rozszerzone, tworzą drugą skorupę pod całym spodem ciała. *Tarcz* jest prawie zupełnie płaską. Na przodzie i na tyle jéy znajdujemy po trzy wycięcia, które służą do ułatwienia potrzebnych zwrotów i poruszeń głowy, nóg i ogona.

Puklérz złączony jest na bokach z *tarczą* u jednych za pomocą części kościanych, u drugich za

pomocą mnieý wiécý twardych chrząstek, u jnnych nakoniec tylko za pomocą ścięgu i skóry. Tym sposobem zwierzęta rzędu tego pokryte są w większèy części kośćciami swoiemi.

U jednych *puklérz* jest tak obszérny, że zwierze w czasie niebezpieczeństwa wszystkie członki swoje wygodnie pod niego schować może. Taki puklérz nazywamy puklérzem *przyzwoitym*; a ten znáydujemy u wielu tak mocno zbudowany, że nawet znaczne ciężary bez szkody zwierzęcia wytrzymać może. U jnnych przeciwnie widzimy puklérz tak urządzony, że pod nim ani głowy, ani nóg ukryć nie mogą. Taki puklérz zowiemy *zamałym*.

Pancérz (puklérz i tarcz) pokryty jest albo listkami rogowémi, albo skórą jednostayną. Liczba ostatnich jest dotąd niewielká. Wspomnianych listków rogowych na pancérzu piérwszych liczymy zwykle *czwórdzieści dziewięć* różnéy wielkości, z których na puklérzu mieści się *trzydzieści siedm*, a na tarczy *dwanaście*. Znáydujemy jednakże między niemi takie gatunki, na których liczba listków rogowych różni się cokolwiek od powyższèy.

Szyję, nogi i ogon postrzegamy u nich pokryte nagą, grubą, chropowatą i nieprzyjemnie upstrzoną skórą. Na głowie u jednych znáydujemy skórę podobną jak na jnnych członkach, u drugich zaś duże, gładko leżące listki rogowe. Wszystkie mają wyraźne otwory słuchowe na bokach początku szyi przy głowie; ale nie mają konch uchwowych.

Zwierzęta rzędu tego nie mają zębów właściwych. Szczęki jch mają poniekąd podobieństwo z szczękami dzioba ptasiego; otoczone są bowiem listwami rogowémi; a te listwy mają krawędzie czyli brzegi mnieý wiécý wyraźnie w ząbki powycinane. Szczeka jch

wierzchnią jest obszerniejsza i głębsza niż spodnia: wsuwając się więc na spodnią (jak wieczko pudełka) pokrywa ją przy zamkniętęj pasczy. Mała tylko liczba ma odmiennie ukształcone szczęki; o tych zaś wkrótce się dowiemy.

Jakkolwiek zadziwiająca jest zewnętrzna budowa zwierząt tu należących: niemniéj godne jest za-stanowienia wewnętrzne jch ukształcenie.

Tylko w szyi i w ogonie znáydujemy u nich pácierze kościane wolne i dowolnie ruchome; wszystkie zaś pácierze grzbietowe, wchodząc do składu puklérza, są z sobą zupełnie zrosłe, i tylko na wewnętrznyj jego stronie można liczbę jch rozpoznać.

Oprócz zwykłych poruszeń na wszystkie strony, postrzegamy w jch szyi to szczególne, prawie wyłącznie temu tylko rzędowni zwierząt właściwe usposobienie, że ją mogą wraz z głową wciągać i wysuwać. Mówimy prawie wyłącznie; gdyż *Ptáki* mogą także skurczać i przedłużać szyję; lecz to nie może jśdź w porównanie z kurczeniem szyi *Zółwia*. Stósownie do tego nowego usposobienia, znáydujemy u zwierząt tego rzędu na każdéj stronie szyi po *pięć* przybyszowych muszkułów, których w jnych zwierzętach nie postrzegamy.

Wszystkie główniejsze muszkuły, które służą do poruszania szyi, nóg i ogona, poprzyczépiane są u jnych zwierząt grzbietnych na zewnętrznyj stronie częścią do pácierza grzbietowego, a częścią do boków ciała: stanowią przeto pierwsze i náyważniejsze pokrycie jch kości, i nadają to zachwycające zaokrąglenie jch kibici. Przeciwnie zwierzęta tego rzędu mają wszystkie te muszkuły przytwierdzone do wewnętrznyj strony puklérza i tarczy.

U jnnych zwierząt grzbietnych łopatki wiszą albo na plecach, albo na bokach ciała nad żebrami; w tych zaś łopatki wraz z oboyczkami są przekrecone i do kości piersiowych czyli do wewnętrznej strony tarczy przytwierdzone. Podobnie przekreconą pod spód ciała napotykamy w nich miednicę. Z przyczyny tak wielkiej zmiany w porządku kośćsokładu w Żółwiach, niektórzy Naturaliści nazywają je *zwierzętami wspacznymi* (animal retourné).

Oprócz dwóch oboyczków właściwych, natrafiamy w zwierzętach tego rzędu na przodzie przy tarczy trzeci widelkowaty oboczyk podobnie jak w *Nibyssących* i w *Ptākach*.

Otóż to są punkta w jch kośćsokładzie, które za godniejsze uwagi poczytuemy. Przejdźmy teraz do jnych wnętrzości. —

Język znaydujemy u zwierząt tego rzędu krótki, najęzony strzępkami mięsistymi lub kończystymi w tył podanymi brodawkami. Ostatnie mają także gardło czyli wewnętrzną stronę kanału pokarmowego, podobnymi brodawkami wstecznie szorstkie.

Nie mając tu należące zwierzęta błony podpiersiowej, wszystkie jch wnętrzości mieszczą się w jednej klatce. Jch płuca są bardzo obszerne. A że przez zrośnięcie się jch żeber z kośćmi piersiowymi pozbawione zostały dowolnego ruchu piersi: oddychanie jch odbywa się szczególniejszym sposobem, bo za pomocą poruszeń języka i kości podjęzykowej. Zwierze tego rzędu trzymając głowę ścielnie zamkniętą, wciąga do niej powietrze nosdrzami. Po czem zatkawszy językiem na podniebieniu otwory nosdrzowe, wypycha (że tak powiem) łykającym sposobem toż powietrze do płuc; przez opuszczenie zaś języka, opuszczają się jego płuca, i wypychają z siebie na powrót powietrze. Chcąc Żółwia udusić,

potrzeba mu tylko pysk otworzyć, i tak kilka minut potrzymać; bo on przy otwartych ustach oddychać nie może.

Żołądek znáydujemy w tych zwierzętach pojedynczy, silny, trzewia miernéj długości bez kiszki grubéj, a pęcherz urynowy bardzo obszérny. Jch nérki są znaczney wielkości, wiszą pospolicie między ostatnim páciérzem grzbietu a piérwszym ogona, mają kształt mniéj więcéj płasko-trójkątny, i zdają się być z mnóstwa mniejszych podobnego kształtu nérek poskładane.

Uryna w jch pęcherzu znáyduje się pospolicie bez smaku, pomieszana z biáłym kléiowatym gąszczem, między którym postrzegámy częstokroć złocisto żółte bardzo cienkie nitki: to wszystko oddzielaia z krwi jch nérki. Szyia jch pęcherza jest krótká, i kończy się w kanale odchodowym.

Otwór kanału odchodowego, znáydujemy wysuniony u jednych daleko pod ogonem, a u drugich na samym końcu ogona.

Członek płodny samca w tym rzędzie zwierząt znáyduje się ukryty w końcu kanału odchodowego. Jest on pojedynczy, nie przebity, w stosunku do ciała nadzwyczaj wielki, z wierzchu zaokrąglony, a na spodzie naksztált rynny wydrążony. To wydrążenie służy do spływu nasienia. Otwór urynowy znáyduje się na szrodku téj rynny, otwory zaś kanałów nasiennych są bardziéj ku tyłowi posunione i na bokach jéy umieszczone. Żołądz (*gland*) natężonego jch korzenia pokazuje po sobie brodawkowate nierówności, których nieznac na opadłym. Cynadry jch mieszczą się wewnątrz ciała w bliskości nérek, są one złocisto żółte, czarną błoną powleczone, okrągławe i niby z mnóstwa drobnych gruzełków złożo-

ne. Od każdej cynadry ciągnie się do korzenia kanał nasienny bardzo długi i rozmaicie (podobnie jak w Ptakach) pozwiiany.

Samice mają podwójny jajnik i podwójny jaiowód. Jaiowody łączą się w kanale odchodowym. Jeden jch jajnik leży przy prawej a drugi przy lewej słabiznie (*hypochondrion* lub *hypochondrium*): obadwa w czasie jch párzenia się mają podobieństwo z jajnikami Kury, t. j: większe czyli bardziej ukształcone jaia znáydują się w nich przy brzegach, a mniejsze coraż bliżej jch szrodka. Niesienie jáy odbywają pojedynczo, i to w znacznych przerwach czasu. Jaia wychodzą pokryte dość twardą łupiną, i zostają znaczny przeciąg czasu wystawione ciepłu słońca na suchym piasku, nim się z nich młode wyklują. Młode lęgną się z nich zupełnie podobne rodzicom swoim.

Ponieważ samice zwierząt tego rzędu dopóty są nieodstępniemi prawie strózkami zniesionych jáy swoich, dopóki się z nich dzieci nie wylęgną: to dało powód do śmiesznego a razem niedorzecznego twierdzenia, które się dotąd między pospółstwem utrzymuje, że samice tych zwierząt dla tego się ustawicznie w bliskości jáy swoich znáydują, bo oczami swemi podobnie jak zwierciadłami promienie słońca na jaia zwracają, i tym sposobem wyklucie się z nich dzieci przyspieszają. Podanie to (powtarzám jeszcze raz) nie má najmniejszego związku z prawdą.

Zwierzęta tu należące mają odbywać párzenie się tak leniwo, iż niektóre przez cały miesiąc zostają ciągle w połączeniu. To twierdzenie CUVIERA zda się mi się cokolwiek przesadzoném.

Jedne z pomiędzy nich żywią się Owadami i Robakami: drugie obok Owadów i Robaków pożerają także jkrę Ryb i jnszych zwierząt: jnne jadają

rośliny wodne: jenne nakoniec pożeraia młode Gady jnnych rzędów tudzież drobne Płazy, Ryby, młode Ptaki pływające i Mięczaki. W niewoli prawie wszystkie są wszystkożernymi. Niewiele potrzebują jadła i napoju, a nawet parę miesięcy zupełnie bezżywienia obéysdź się mogą. Życie mają one podobno náytrwalsze między dotąd znanými zwierzętami: wszakże podług twierdzenia *Cuviera*, po utracie głowy, przez kilka tygodni ruszać się będą.

Jedne z pomiędzy nich obdarzone są zdrowém i smaczném mięsem: z drugich wytapiaia wyborny tran: jenne dają nám z pancérzów swoich listki rogowe, z których zrobione różne przedmioty zbytkowe (*luxé*) wysoko są cenione w handlu. Słowem zwierzęta tego rzędu należą do liczby jstót wielce użytecznych.

Wszystkie opatrzone są cztériema nogami; lecz kształt tych nóg jest różny w różnych rodzajach. U jednych nogi przednie widzimy znacznie dłuższe niż tylne, spłaszczone na kształt wiosel, z palcami spiętými niewyraźnými: takie jch nogi nazywamy *nogami pletwowatými* (*pes pinniformis*). — U drugich wszystkie cztery nogi są prawie równo długie, przy końcach na kształt nóg Słonia zaokrąglone i bárdzo krótkými wolnými palcami opatrzone. Palce jch (mianowicie u nóg przednich) ledwie znaczne, w pół kole ustawione, zakończone są długými prostými pazurami. Tak ukształcone nogi zowiemy *stłuphowatými* (*pes subdigitatus*). — Jenne mają nogi tylne cokolwiek dłuższe niż przednie, a palce u wszystkich wyraźne, mierne, bloną spięte; taki gatunek nóg oznaczamy nazwiskiem *spiętopalczastych* (*pes palmatus*). — U jnnych nakoniec postrzegamy także tylne nogi dłuższe niż przednie; lecz palce jch mierne są wolne: takie nogi zwać będziemy *wolnopalczastými* (*pes fissus* lub *digitatus*). —

Trzy ostatnie gatunki nóg oznaczamy także ogólném nazwiskiem *nogi pochodowe*; gdyż pierwsze są niezdatne do chodzenia po ziemi.

Stósownie do tak rozmaitego ukształcenia ich nóg, postrzegamy w nich także bardzo różny sposób życia. Jakoż pierwsze żyją prawie ustawicznie w morzach, i tylko czasem wylazą na brzegi; drugie bawią stale na lądzie, trzecie przepędzają większą część życia swego w wodach słodkich, czwarte nakoniec przebywają częścią w wodach, a częścią na suchéj ziemi. To wszystko w dalszych uwagach dobitniey okážemy.

Miedzy zwierzętami rzędu tego, po tém pospolicie poznaemy pleć na pierwszy rzut oka, że samce mają tarcz wklęsłą a puklérz wypuklejszy; przeciwnie u samic tarcz jest płaską a puklérz mniéj wypukły.

Po tych ogólnych uwagach, przystąpmy do wyżej zapowiedzianych rodzajów w szczególności.

R O D Z A Y I.

S Z Y L K R E T. C H E L O N I A.

Chélonée. albo Tortue-de-Mer. Fran.

Meerschildkröte. Niem.

Pysk z przodu spadzisty. Szczęka wierzchnia w kształcie dzioba kurzego zakrzywioną, pokrywą spodnią. Zuchwy obu szczęk rogowe, ostre, z brzegami głęboko ząbkowanemi. Wargi żadne. Głowa wypukłą sucho kościstą, u wielu listkami rogowemi pokrytą. Puklérz słabo wypukły, zamaty, na

bokach za pomocą chrząstek z tarczą złączony. Ogon krótki. Nogi długie, płaskie, pletwowate; przednie znacznie dłuższe niż tylne, pięć palczaste; tylne cztery palczaste. Palce długie, niewyraźne, błoną spięte. U każdej nogi na zewnętrznym brzegu po jednym lub po dwa pazury ostre.

Do tego rodzaju liczą przeszło sześć gatunków, które w dziele LINNEUSZA stanowią pierwszy oddział jego rodzaju *Testudo*, pod napisem *Marinae*. Wszystkie żyją w morzach w bliskości lądu; mianowicie w morzach południowych znayduie się jch bardzo wiele. Z wszystkich tego rzędu dorastają one náyogromniejszy wielkości; gdyż często łowią między niemi takie, które po sześćset i po więcéy funtów wąża. Łowią je zaś náywięcéy w ten czas, gdy dla grzania się do słońca na brzegi powylazą.

Szyłkrety żywią się Rybami drobnými, jkrą Ryb, Mięczakami, Robakami i Roślinami morskimi. Są bardzo mnożne; jedna albowiem samica z tego rodzaju, znosi rocznie blisko tysiąc jaj, które składają na piasku, a z których się za pomocą ciepła słonecznego dzieci wylęgają. Dzieci jch udają się zaraz na morze, i same dla siebie pożywienia szukają. Jaja wszystkich mają smak wyborny. U wszystkich wewnątrzna strona gardła najęzoną jest kończystymi w tył podaniami brodówkami. Względnie do jakości pokrycia pancerza, dzielimy je na dwa następujące oddziały.

a. *Pancerz owalowaty, listkami rogowými pokryty.* n. p. *Testudo imbricata.* GL.

Takich znamy z pewnością pięć gatunków z powyższej liczby. Z tych gatunków za przykład wymieniony, mieszkający w morzach pod strefą gorącą, mają mięso niesmaczne i niezdrowe; ale za to listki rogowce z jego pancerza náybardziej są cenione w han-

dlu. Od tych to kosztownych listków rogowych, które zwykle *szylkretem* nazywamy, pochodzi nazwisko tego rodzaju. Najpospolitsze zaś w południowych morzach Europejskich, dorastające náyokazalszëy wielkości, a mające náywyborniejsze mięso, są te dwa gatunki, które GMELIN pod jednëm nazwiskiem *Testudo Mydas* jako odmiany gatunkowe opisał. Listki rogowe na puklérzu *szylkretów* nie przystają do siebie szczerbie brzegami; lecz na jednych zstają na siebie jak dachówki; na drugich zaś zostawiają między sobą znaczne ustępy, które błoną chrząstkowatą są wypełnione.

b. *Pancérz podłużny, miękka jednostayną skórą pokryty, na nieżywych marszczący się.* n. p. *Testudo coriacea.* GL.

Do tego oddziału wiemy z pewnością tylko o *jednym* gatunku, który się polawia w morzu Szródziemnym. Dorasta on ogromnëy wielkości; lecz dosyć jest rzádkim. Podług świadectwa PENNANTA má mięso tak niezdrowe, żeby go trucizną nazwać można. Maytek pewien, który kawałek mięsa z tego zwierzęcia ugotowawszy zjadł: dostał tak gwałtowny biegunki i wymiotów, iż mimo wszelkich lekarstw, wkrótce w nich życie zakończył. Ten oddział będzie podobno z czasem stanowić osobny rodzaj.

R O D Z À Y II.

Ż Ó Ł W. T E S T U D O

Tortue. albo Tortue-de-Terre. Fran.

Landschildkröte. Niem.

Pysk prosty, na przodzie pod kątem zakończony. Szęka wierzchnią prostą, pokrywającą spódną.

Głowa mniey wiecę płaską. Nosdrza nieprzedłużone. Wargi żadne. Zuchwy rogowe, ostre, z brzegami drobno ząbkowanemi. Puklérz przyzwoity, mocno wypukły, na bokach za pomocą kościanych części z tarczą silnie złączony. Tarcz nieruchomą. Pancérz listkami rogowemi szczelnie stykającemi się pokryty. Ogon krótki. Nogi pochodowe, prawie równe, przykrótkie, słupkowate: przednie pięcio, tylne czworo palczaste. Pazury u wszystkich palców długie, proste. n. p. Testudo graeca. GL.

Do rodzaju *Gadów*, które wyłącznie nazwiskiem *Żółwiów* oznaczamy, liczymy dobrze znanych *dziesięć* gatunków. — Z tych dwa znaydują się w Europie; reszta zamieszkuje inne części świata. Wszystkie lubią nizkie, wilgotne, lecz wodą nie zalane miejsca. Żywią się Owadami, Robakami i roślinami; w niewoli zaś jedzą wszystko. Dorastają pomiernéj wielkości; gdyż rzadko który waży sześć funtów. W jesieni grzebią sobie nory w ziemi, w których przez całą zimę odbywają letargiczny sen zimowy. Na początku wiosny wychodzą z nór, pąrzają się; a samica wygrzebawszy w piasku mały dołek, znosi w niego swe jaja, których liczba nie przechodzi dziesięciu. Z jch jay dopiero w połowie lata zaczynają się młode wykluwać. Jaja i mięso *Żółwiów* mają smak wyborny. *Żółwie* mają pancérz náy mocniejszy; bo jch puklérz złączony jest na bokach w znaczney części z tarczą za pomocą grubych części kościanych. Listki rogowe na jch pancérzu poukładane są szczelnie przy sobie; lecz ponieważ są małe i cienkie: mały przeto mają użytek. Jch puklérz przyzwoicie obszérny, daje bezpieczne schronienie jch członkom.

R O D Z Á Y III.

W O D O Ż Ó Ł W. E M Y S.

Emyde. albo Tortue-d'eau-douce. *Fran.*Fluss-Schildkröte. *Niem.*

Pysk prosty. Szczęka wierzchnią na końcu tępo przyciętą, pokrywą spodnią. Głowa mniej więcej płaska. Nosdrza nieprzedłużone. Zuchwy rogowe, ostre, na brzegach bardzo drobno ząbkowane lub gładkie. Wargi żadne. Puklérz przywołicie obszerny, miernie wypukły, na bokach z tarczą tylko za pomocą skóry i dwóch kościanych wypustekłączony. Ogon krótki. Nogi pochodowe, spięto palczaste: tylne od przednich dłuższe, czteropalczaste; przednie pięciopalczaste. Palce wyraźne, mierne, aż do pazurów błoną spięte. Pazury u wszystkich palców łukowate, długie, kończyste.

Wodożółwie są mieszkańcami różnych części świata. W saméj Europie znamy jch dwa gatunki. Wszystkie żyją w wodach słodkich, jakimi są powoli płynące rzeki, tudzież wielkie ziołami zarosłe stawy i jeziora. Żywią się Rybami drobnymi, jkrą Ryb, Plazami młodeimi, Owadami i Robakami. W Rybach czynią wielkie szkody przez zjadanie jkry i narybku. Mięso mają wyborne: słusnie więc na stołach majątnych Ludzi policzone zostały pomiędzy przysmaczki. Są one w prawdzie mniej mnożne niż Szyłkrety, ale nierównie mnożniejsze niż Żółwie. Zaraz na pierwszy rzut oka różnią się Wodożółwie od Żółwiów ukształceniem nóg i znacznie płasciejszym puklérzem. Puklérz jednakże mają tak obszerny, iż w potrzebie mogą pod niego wygodnie schować członki swoje. Dorastają podobnie jak

Żółwie tylko pomiernéj wielkości.— Podług ukształcenia tarczy i jakości pokrycia, dzielimy je na trzy następujące oddziały.

a. *Pancérz listkami rogowémi pokryty. Tarcz całą nieruchomą.* n. p. *Testudo Europæa.* SCHN.

Takich znamy siedmnaście gatunków, które zamieszkują różne części świata. Z tych gatunków za przykład wymieniony jest najpospolitszy w wszystkich ciepłych i w umiarkowanych krajach Europy. Dorasta on dziesięciu cali długości.— U wszystkich prawda tego oddziału całą tarcz jest nieruchomą, lecz zdarszy z niéj listki rogo-we: znájdziemy na kościach jéj poprzeczny głęboki rowek, który daje nieznaczny przechód do oddziału następującego. *Wodożółwie* tego oddziału nazywają francuzcy *Naturaliści les Emydes proprement dits.*

b. *Pancérz listkami rogowémi pokryty. Tarcz w poprzek na dwie części przedzieloną. Przednią kłapa tarczy ruchomą.* n. p. *Testudo clausa.* SCHÖ.

Do tego oddziału wiemy o dwóch gatunkach. Obadwa są mieszkańcami juncych części świata.

c. *Pancérz listkami rogowémi pokryty. Tarcz w poprzek na dwie części podzieloną. Obie kłapy tarczy ruchome.* n. p. *Testudo tricarinata.* SCHÖ.

W tym oddziale mieścimy trzy gatunki. Żaden z nich nie mieszka w Europie. Francuzcy Badacze pod ogólném nazwiskiem *les Emydes-à-boite*, albo *les Tortues à boite* opisują *Wodożółwie* do drugiego i do trzeciego oddziału należące.

Podług powyższego wykazu, liczymy w rodzaju *Wodożółwia* ogółem dwadzieścia dwa gatunki.

R O D Z À Y IV.

Ż Ó Ł W I Ą K. T R I O N Y X.

Tyrsé. albo Tortue-molle. Fran. Leder-
schildkröte. Niem.

Pysk z przodu zesczuplony, ku głowie coraż szerszy. Szczęka wierzchnią pokrywa spodnią. Zuchwy rogowe, ostre, skórzanemi wargami pokryte. Nosdrza u wielu na kształt trąby przedłużone, ruchome, miękkie. Głowa lekko spłaszczona. Szyja gruba, długa. Pancierz jednostayną miękką skórą pokryty. Puklérz przyzwoicie obszérny, miernie wypukły, tylko w szrodku tęgi, przy brzegach giętki, u nieżywych kurczący się, na bokach z tarczą za pomocą chrząstek złączony. Tarcz giętką, zamałą. całego spodu ciała niepokrywa. Ogon bardzo krótki. Otwór odchodowy na samym końcu ogona. Nogi pochodowe, przykrótkie, prawie równe, spiętopalczaste: przednie pięcio, tylne cztero palczaste. Palce mierne, wyraźne, błoną aż do pazurów spięte. Pazurów łukowatych, kończystych u każdéj nogi tylko po trzy.

Do tego rodzaju liczymy blisko *dziesięć* gatunków, które podług jakości nosdrzy na dwa następujące oddziały dzielimy:

a. *Nosdrza nie przedłużone.* n. p. *Testudo membranacea.* BLUM.

b. *Nosdrza w kształcie trąby znacznie przedłużone.* n. p. *Testudo ferox.* GL.

Wszystkie Żółwiaki w ogólności mieszkają pod strefą gorącą w Afryce, w Azji i w Ameryce. Żyją

w wodach słodkich rzék i jeziór. Żywią się młodemi Ptakami pływającemi, Rybami, Gadami i Płazami. Náyulubieńszém jednakże dla nich pokarmem są młode świerzó z jáy lęgnące się Krokodyle i Kaimany: z téy przyczyny czatują one prawie ustawicznie w bliskości jáy tychże Gadów. Z tego powodu *Zółwiaki* są tamtejszym mieszkańcom równie użyteczne jak *Jchneumony* (*); lecz tę użyteczność swoją przypłacają częstokroć życiem; bo je stare Krokodyle przy jaiach chwytają i pożeraią.

Niektóre gátunki *Zółwiaków* dorastają tak okazały wielkości, iż wążą po siedmdziesiąt funtów. Wszystkie prawie mają mięso wyborne.

Zółwiaki różnią się od wszystkich jnnych zwierząt do tego rzędu należących tak budową ciała jak obyczajami. Zastanówmy się więc bliżey nad temi dwiema punktami.

Pomiiając nawet miękkie skórzane pokrycie jch pancérza, piérwszą wázną w nich różnicą są wyraźne skórzane wargi, którými jch zuchwy są otoczone, a których u zwierząt trzech piérwszych rodzajów tego rzędu ani śladu niewidać. — W wszystkich jnnych rodzajach tego rzędu sięgają żebra aż do brzegów puklérza, i ciągle są rozszérzone i z sobą spoione; — na *Zółwiakach* przeciwnie żebra zstają tylko do pewnéy części puklérza, są tylko przy grzbiecie rozszérzone i z sobą spoione, daléy zaś odsuwają się od siebie, i stają się podobnie wąskie jak w jnszych zwierzętach grzbietnych. Te ustępy między jch żebrami, równie jak cały brzég jch puklérza, wypelnione są miękką chrząstką. Z tad puklérz *Zółwiaków* za życia jch jest giętki i tak obszérny,

(*) Patrz w Tomie I. na stronie 193.

że pod niego wszystkie członki swoje schować mogą; lecz na nieżywych ssychając się, kurczy i marszczy się coraz bardziej. — U jnnych tego rzędu tarcz złożoną jest z kości twardych; — przeciwnie tarcz *Zółwiaka* składa się po większój części z chrząstek, a przy tém jest tak mała, że całego spodu ciała nie pokrywa.

Z káždego jnnego rodzaju tego rzędu złapane zwierze, całą obronę swoją pokłada w schowaniu (jeżeli może) członków pod puklérz, i w zataieniu się, czyli w zupełnej nieruchawości. Przeciwnie schwyty *Zółwiak* broni się zapalczywie kąsaniem i drapaniem.

RODZAY V.

ŻMIIOŻÓŁW. *OPHICHELONE*.

Serpentine. albo Tortue-á-longue-queue. Fran.

Głowa podobna głowie Węża. Pysk z przodu tpy. Nosdrza nieprzedłużone. Wargi żadne. Szczeka wierzchnia pokrywa spodnią. Zuchwy rogowe, ostre. Puklérz owalowy, za mały; w tyle szerszy w zęby powycinany. Pancérz listkami rogowymi pokryty. Listki rogowe na puklérzu w górę podniesione. Ogon długości ciała. Nogi pochodowe, duże, wolnopalczaste: przednie pięcio palczaste; tylne cztero palczaste, od przednich dłuższe. Palce mierne, wyraźne, prawie nic nie spięte. Pazury u wszystkich palców długie, kończyste. n. p. Testudo serpentina. GL.

Wiemy dotąd tylko o jedném gatunku. Mieszká on w ciepłych krajach Ameryki północnej. Przebywá w wodach słodkich i na suchym lądzie. Żywi się

młodemi Ptakami pływającemi, Rybami, Plazami, Owadami i Robakami. Dorosły wazy przeszło dwadzieścia funtów. W stosunku do ciała, má nogi większe niż inne zwierzęta tego rzędu. W tarczy jego zwykłe wycięcia są bardzo głębokie. Ogon jego najęzony kończystemi ząbkowanemi łuskami wyrównywa długości ciała czyli pancérza. Pancérz má tak ciasny, że w niego członków swoich wciągnąć nie może.

RODZAY VI.

ŻOŁWIOZWIERZ. CHELYS.

Chelide. albo Tortue-á Gueule. Fran. Chelys. Niem.


Głowa płaska, trójkątna, grubą skórą pokrytą. Tył głowy nabrzmiały, trójdzielny. Zuchwy płytkie, tępe, bez rogowey obwódki. Paszcz obszerna. Nosdrza na kształt trąby przedłużone, miękkie. Szyja długa, bardzo pozmarszczana i strzębkowatą skórą pokrytą. Pancérz listkami rogowemi pokryty. Puklérz mocno wypukły, jaiowato podtężny, zamąty: listki na nim rowkowane, podniesione, a u samców kolcami najęzone. Ogon krótki, szponem rogowym zakończony. Nogi grube, pochodowe, spięto palczaste: przednie pięcio palczaste; tylne od przednich dłuższe, czéto palczaste. Palce mierne, wyraźne, błoną aż do pazurów spięte. Pazury łukowate, kończyste u wszystkich palców; rzádko palec tylny skrajny bez pazura. n. p. Testudo limbria. GL.

Względnie do liczby zgodnych opisów, które w różnych Autorach czytamy, náleżą do tego rodzaju dwa gatunki. Obadwa są mieszkańcami wód słodkich w południowey Ameryce i na wyspach jéy

przyległych. Żywią się Robákami, Owadami wodnemi, jkrą Ryb i nárybkiem. Kształtem pyska wielce są podobne *Grzbietorodom*, o których późniéj mówić będziemy.

Lubo w jnnych rodzajach tego rzędu znáyduią się takie gatunki, których ogon kończy się szponem rogowym; gdy jednakże u żadnego nie jest tak wyraźny, przeto tu kładziemy go do liczby cech rodzajowych.

W dwóch ostatnich rodzajach widzimy puklérz *zamały*, czyli członków niepokrywaiący. — Na tém kończymy uwagi nad rzędem Gadów zwanych *Zółwiami*.



Tablica III. (100.)

R z e d D r u g i. (28.) J A S Z C Z U R K I. S A U R I I.

Gady mające po cztery lub po dwie nogi: palce zakończone pazurami: ciało długie, skórą łuskowatą lub drobnemi tarczami pokryte, długim ogonem zakończone: szczęki zębami uzbrojone.

POKREWIEŃSTWA. FAMILIA E.

=	{	ściśniony lub płaski; język	{	do szczęki spodniej przyrośły, nieruchomy	1. Przyrostojęzykie. <i>Amecilingues.</i>
					2. Wolnojęzykie. <i>Solutilingues.</i>
o	{	wolny, u wielu wysuwalny	{	wyrażne na bokach ciała	3. Skrzydlate. <i>Alati.</i>
o					4. Klęczonogie. <i>Scandentes.</i>
o	{	cztery; błony łożne	{	żądne; palce	5. Zwykłonogie. <i>Agiles.</i>
					6. Dwunożne. <i>Bipedes.</i>
o	{	okrągły; nóg	{	nie przeciwległe	
o	{	dwie; ciało bardzo długie, wysmukłe	{	nie przeciwległe	

UWĄGI DO TABLICY III. (100.)

Zwierzęta tego rzędu składały w systemacie LINNEUSZA tylko dwa rodzaje *Draco* i *Lacerta*. Zbyt oczywiste a ważne różnice w budowie jch ciała zniewoliły tegoczesnych Badaczy do podzielenia jch na te sześć pokrewieństw, które w dopiero odczytaney tablicy są umieszczone. Ściśle albowiem biorąc mało znaydziemy takich punktów w jch budowie ciała, któreby bez wyjątku do wszystkich zastosować można.

Jedne z pomiędzy nich pokryte są drobnemi, w rzędy poukładanemi tarczami kościanemi: drugie mają na ciele skórę łuskowatą: na jnych postizęgamy ostro kończyste łuski: u jnych znaydujemy skórę tak chropowatą, jak gdyby piaskiem była posianą.

U jednych ciało jest wysmukłe i nieznacznie w długi ogon przechodzące; u drugich przeciwnie płaskie, pękate, a ogon nagle zeszuplony. Ogon jednych jest z boków ściśniony, drugich płaski, jnych zaokrąglony. U tych podgardle przedłuża się w mnięcy więcy długi worek; u owych nieznaydujemy żadnego nadrostu na podgardlu.

Większą jch liczba má nóg cztery; lecz znaydują się i takie, które mają tylko po dwie nogi. Między piérwszemi u jednych znaydujemy na bokach ciała wyraźne błony do látania, drugie ani śladu takich błon nie mają. Palce jednych są wolne, drugich błoną spięte: już na kępki podzielone i sobie przeciwległe, już w jednę płaszczyznę ustawione: u tych szupłe, u owych spłaszczone i rozszerzone. Słowem, tyle tylko można powiedzieć ogólnego o jch zewnętrznęj budowie, że wszystkie mają u wszy-

stkich lub przynajmniej u niektórych palców ostre łukowate pazury.

O jch wnętrznościach to tylko można wyrzec w ogólności, że wszystkie mają płuca bardzo obszerne, i że ruchome jch żebra dozwalaia jm takiego sposobu oddychania jak w trzech pierwszych gromadach. Lecz u jednych znaydujemy jeszcze szczatki błony podpiersiowey, które jch płuca od reszty wnętrzności oddzielaia; u drugich zaś wszystkie wnętrzności znayduia się w jedney klatce pomieszczone. Język jednych jest nieruchomy, bo do spodniy szczatki w caly swy długiści przyrosly; drugich język jest przyzwoicie ruchomy, ale nie bez różnicy; bo jedne mają go miernie długi, mięsisty; drugie przeciwnie okazuią język przedłużony, wysuwalny, bardzo szczupły i prawie rogowo chrząstkowy. Tych samce mają po dwa członki płodne; owych zaś tylko po jednym.

Te to więc, i wiele tém podobnych różnic tak w zewnetrznay jak w wewnetrznay jch budowie ciała, o których się późniy dowiemy, były powodem słusznym do powyższego podziału zwierząt tu należących.

Nim przystapiemy w szczególności do uwag nad każdym z powyżey zapowiedzianych pokrewieństw: przydadź tu jeszcze musimy, że wszystkie zwierzęta rzędu tego mają głos słaby, syczący.

U wielu znaydujemy na pewnych miejscach ciała okrągłe otwory w skórze, przez które się sączy czasami osobny rodzaj płynu. Te otwory nazywać będziemy *Dziurkami potowemi* (pore, *Schweissloch*).

Są także niektóre między tu należącemi Gadamimi, które posiadaią moc zmieniania maści ubarwie-

nią swego, lecz to nie w tak romansowym sposobie, jak nam niektórzy Autorowie opisali. Szczerze mówiąc, zmiana maści na nich jest oznaką stanu zdrowia lub słabości, wesołości lub smutku, obojętności lub namiętności jakiegó; ale w tém niestosują się nigdy do maści przedmiotów, na których są posadzone. Przypadek zapewne jakiś nadzwyczajny spłodził to błędne mniemanie, które później w kilku mieyscach wytknąć niezaniebąmy.

Wszystkie nie mają konch uchowych, a otwory sluchowe są u nich różnie ukształcone.

Większą część tu należących zwierząt, ztąd mają największą wartość dla Człowieka, że żywiąc się Owadami, bardzo wiele jch wytepią. Bardzo mało znamy między Jaszczurkami takich, któreby miały mięso jadalne. Przypisują wprawdzie niektórym gatunkom skutki lékarskie: lecz te albo są jeszcze wątpliwe, albo zupełnie mylne. Obszérniejsze wyłożenie użyteczności lub szkodliwości tych zwierząt, znajdziemy w dalszych uwągach.

Wszystkie rozmnażają się przez jaja, które po zniesieniu, znaczny przeciąg czasu zostają wystawione na działanie ciepła promieni słonecznych, nim się z nich dzieci wykuia. Dzieci wszystkich wydobywają się z jaj zupełnie podobne rodzicom swoim.



Tablica IV. (101.)

POKREWIEŃSTWO I.

PRZYROSŁOJĘZYKIE. *ANNEXILINGVES.*

Jaszczurki czworonożne, mające nogi przednie pięcio, tylne cztery palczaste: palce tylne spięte, przednie wolne: ogon ściśniony, widelkowatym z łusek grzebieniem najęzony: pysk długi: język przyrosły.

	RODZAJE.	GENERA.
J a s z c z u r k i	prawie jednostajnie bardzo szczupły	1. Dzióboszczek. <i>Gavial.</i>
	gruby { prawie stożkowaty . . .	2. Krokodyl. <i>Crocodylus.</i>
	{ tępy, w górę zadarty . . .	3. Kaiman. <i>Alligator.</i>

UWĄGI DO TABLICY IV. (101.)

Zwierzęta do tego pokrewieństwa należące, są największemi w rzędzie *Jaszczurek*. Rosnąc one podobnie (jak inne Gady) przez całe życie, przerastają niekiedy trzydzieści stóp długości. Wszystkie są mieszkańcami wód słodkich pod strefą gorącą. — Wszystkie są bardzo żarłoczne i drapieżne. Pożerają Gady, Płazy, Ryby, Ptaki pływające; a niektóre nawet i Ludzi nieoszczędzają. Niektórzy Naturaliści twierdzą, że one każdą zdobycz swoją wynoszą nad powierzchnię wody; gdyż nic pod wodą połknąć nie mogą. Wszystkie *Przyrosłojęzykie* pływają i nurzają się wybornie. Po suchyć ziemi w kierunku prostym biegną bardzo szybko; ale wężyko-

watych zwrotów w biegu czynić nieumieią. Niektóre z pomiędzy nich mają mięso jadalne i dosyć smaczne. Budowa jch ciała godną jest bliższéj uwagi naszéj.

Wszystkie mają pysk bardzo długi, a otwór pasczy bardzo szeroki; spodnią albowiem jch szczęką zastaiąc końcami zuchw aż za tył głowy: przedłuża więc otwór jch pasczy aż za otwory słuchowe. To, jm tylko właściwe, zakończenie i długość szczęki spodniéj, dały powód do mylnego mniemania, że wiérzchnią jch szczęką jest ruchomą, a dolną nieruchomą. Podobnie utrzymuią niektórzy mylnie, że te zwierzęta nie mają języka. To błędne mniemanie pochodzi z tąd; bo język tych zwierząt będąc bardzo szeroki wyścielá spodnią jch szczękę, i tak do niéj jest przyrosły, że tylko brzegi má wolne; w głębi pasczy przy języku spostrzegamy u nich dużą klapę błonową, którą otwór gardzieli w ten czas zatykaia, gdy pod wodą dla złapania jakiéj zdobyczy paszczę otwieraia. Bez téj klapy wkradłaby się jm w ten czas woda przez gardziel do płuc, i pozabawiłaby jch życia. Gdyż jak wiadomo, wszystkie zwierzęta oddychaiące płucami, żyia tylko dopóty w wodzie, dopóki do płuc wody nie wpuszczą: w razie przeciwnym giną natychmiast śmiercią, którą *utonięciem* lub *zalanieniem się* nazywamy.

Każdą jch zuchwa, uzbroioną jest jednym rzędem zębów. Zęby jch są stożkowate, mniéj więcéj ostro kończyste, i tak rzadkie, że między niemi znáyduia się w zuchwach dolki kością uszkloną wysłane, do których się zęby zuchwy przeciwnéj chowaią. Ztąd widzimy, że zęby jch przy zamkniętém pasczy miiaią się naprzemián, i że u nich ścięcie się szczęk musi być bardzo mocne. Liczba jch zębów jest różną w różnych gatunkach, i w jednéj szczęce przechodzi od *trzydziestu ośmiu* do *sześćdziesięciu*.

Pod gardłem znáydujemy u nich po dwie *dziurki potowe*, przez które się sączy z osobnych pod skórą będących gruzłów tłusty, mocno woniejący plyn.

Na końcu szczeki górnéj napotykamy u nich otwory nosdrzy. Są one małe, mają kształt półksiężyca, i mogą się dowolnie zamykać i otwierać. Kanały zaś nosdrzowe ciągną się u nich wzdłuż szczeki górnéj, i kończą się w pysku drugimi otworami nad samą prawie krtanią.

Na jch oczach postrzegamy po trzy powieki; lecz ta trzecią w poprzék pod dwiema zwyczajnemi znáydującą się u nich powieka (zdaniem moiém) nie jest nic jnnego, jak *migoblon* (*) mocno zgrubiała.

Jch otwory słuchowe umieszczone są na bokach tyłu głowy. Káždy ten otwór opatrzony jest dwiema grubémi mięsistemi wargami, które go podług woli zwierzęcia otwierają i zamykają.

Ciało zwierząt tu należących jest długie, wysmukłe, pokryte drobnemi, kościanemi w rzędy poukładanemi tarczami, i przechodzi nieznacznie w ogon długi. Ogon jch jest z boków ściśniony, u spodu zaokrąglony, a na wierzchu ostry, grzebieniem z łusek najęzony. Grzebień na jch ogonie jest widlasty; bo łuski, które go tworzą, jdąc od nasady ogona dwiema od siebie odsunionemi rzędami, schodzą się przy końcu jego w rząd jeden.

(*) Patrz w Tomie I. na stronie 195. — Migoblon przyzwolicie cienki i przezroczysty znáydujemy niemal u wszystkich tych zwierząt *Ślących*, które żyją w wodzie i na lądzie; tudzież u wszystkich prawie *Płaków*.

Na spodzie ogona blisko jch nóg tylnych napotykamy otwór odchodowy, który będąc podłużny, czyli w linii ogona umieszczony, różni je od wszystkich jnnych zwierząt tego rzędu; ponieważ w wszystkich jnnych jego pokrewieństwach, znaydujemy otwór ten w poprzék ogona położony. Nie mniey ważną różnicą jest i to, że samce *Przyrostojęzykich* mają w otworze odchodowym tylko po jednym członku płodnym; w wszystkich albowiem jnnych pokrewieństwach rzędu tego, znaydziemy jch po dwa u káždego samca.

Gady tego pokrewieństwa mają po cztery nogi, które w stósunku do długości jch ciał, słusnie krótkiemi nazwać można. U przednich nóg mają po pięć palców, a te są zupełnie wolne; u tylnych zaś nóg widzimy po cztery palce, które mniey więcéy są błoną pospinane. Nie wiele znamy między niemi takich, które mają wszystkie palce uzbrojone pazurami, lecz większą jch liczba má u káždey nogi tylko po trzy pazury. Palce jch nie wiele się różnią w długości.

Tyle o jch zewnętrznosci. Zobączmy teraz wewnętrzną jch budowę.

Páciérze kościane w jch karku, mają tak długie *wystawy* naboczne (*processus, apophyses* albo *petites-fausses-cotes*), że się te na sobie wspieraia. Są one więc wrodzoną przyczyną sztywności jch szyi; bo jéy niedozwalaia zgiąć przyzwoitych. W poznaniu takiéy budowy kości w jch szyi, wyiaśnia się nám także powód, dla którego te zwierzęta nie mogą w biegu nagłych czynić zwrotów.

W tém tylko jedném pokrewieństwie *Jaszczurek* nieznaydujemy kości oboczykowych: ztąd wystawa

wronodzioba łopatki (apophyse coracoïde) stykają się u nich wprost z kośćmi mostku.

Oprócz żeber właściwych i wielu przybyszowych, które początek swój biorą z kości pąciérza grzbiotowego, znáydujemy w nich osobne żebra pod brzuchem, które mają kształt łuków mocno zgiętych, a które końcami swými ani do jnnych żeber nie dotykają, ani téż do kości pącierzowych nie dochodzą. Te osobliwsze jch żebra podbrzuchowe, zdują się bydź skośnieniem promieni muszkułu *prostego*.

Jch obszérne płuca, oddzielone są od wątroby i od reszty wnętrzości mnóztwem nitek ścięgnowatych. Te nitki stanowią ostatni ślad błony podpiersiowéy, który w tém tylko jedném pokrewieństwie téy gromady napotykámy; bo w wszystkich jnnych *Gadach* nie znáydujemy żadnego przedziału między wnętrzościami.

Samice jch niosą jaia co rok w dość znaczney liczbie. Jaia jch pokryte są twardą skorupą, i wyrównywią w wielkości jajom Gęsi, i muszą znaczny przeciąg czasu leżeć na słońcu, nim się z nich młode wykuiają. Przez ten czas samice krążą zawsze w bliskości jaj swoich; a dzieci wylęgłych stają się dopóty nieodstępnyemi strózkami, dopóki znacznie nie podrosną. Po tych ogólnych uwągach przejdźmy do rodzajów.

RODZÁY I. (7.)

DZIOBOSCZEK. *GAVIAL*.

Gavial. Fran.

Pysk bardzo długi i bardzo szczupły, okrągławy, prawie jednostayny, na końcu nagłe ostro zakoń-

kończony. Czoło nagle wzniesione. Oczy wielkie, wypukłe, wystające, na przodzie czoła umieszczone. Za każdym okiem na głowie długi i znacznie głęboki dołek. Zęby w zuchwach bardzo liczne, wszystkie prawie równe. Naprzeciw czwartego dolnego zęba zuchwy górne wyszczerbane: obie bez dołka dla tegoż zęba. Na tylnym brzegu nóg grzebień z łusek dużych. U nóg tylnych tylko trzy skrajne palce więcéy niż do połowy błoną spięte, czwarty wolny (Pazury u wszystkich palców?) n. p. *Lacerta gangetica*. GL.

Liczymy do tego rodzaju *dwa* gatunki. Są one mieszkańcami rzek w gorących krajach Azji i Afryki. Żywią się prawie wyłącznie Rybami. Ludzi nie napadają. Dorastają ogromnéy wielkości. Na pierwszy rzut oka pysk jch má wiele podobieństwa z dzióbem *Tráca* (*). W szczęce górnej liczymy u nich *pięćdziesiąt ośm*, a w dolnej *pięćdziesiąt* zębów.

RODZĄY II. (8.)

KROKODYL. *CROCODILUS*.

Crocodile. *Fran.* Krokodill. *Niem.*

Pysk długi, gruby, ku końcowi nieznacznie coraz szupleyszy, prawie stożkowaty, lekko spłaszczone. Czoło nie wywyższone, nieznacznie w szczyt pyska przechodzi. Oczy niewystające, prawie mier-

(*) *Trácz* Pták pływający, Patrz w Tomie II. na stronie 289.

ne. Zęby ostrokończyste nierówne. Na przeciw
czwärtęgo dolnego zęba, zuchwy górne wyszczerbane
obie bez dołka dla tegoż zęba. Palce przednie
wolne. Palce u nóg tylnych wszystkie cztery aż
do pazurów błoną spięte. Przy każdej nodze tyl-
ko trzy przyszkodkowe palce pazurami uzbroione, a
skrayne bez pazurów. n. p. *Lacerta Crocodilus*. GL.

W tym rodzaju mieścimy dobrze rozróżnionych
sześć gatunków, które w dawniejszych systematach
pod jedno gatunkowe nazwisko były podciągnięte.
A przecież kształt tarcz i liczba rzędów tychże na
jch grzbietach, są bardzo wyraźną i niemylną cechą
gatunków w tym rodzaju.

Krokodyle dorastają ogromnej wielkości. Są
najdrapieżniejszymi i najszybciej rozwijającymi się
zwierzętami w tym rzędzie. Silne, żarłoczne, w biegu
prosto kierunkowym mimo krótkość nóg bardzo
szybkie; napadają i pożerają zwierzęta wszelkiego ro-
dzaju. Ludzi odważnie postępujących unikają, ucie-
kających z zaciętością ścigają, na śpiących dybiąco
czaiącym się sposobem napadają. Mieszkają w wo-
dach słodkich pod strefą gorącą. Azja, Afryka i
Ameryka mają między niemi sobie właściwe gatun-
ki. *Krokodyle* mieszkające w Ameryce są odwa-
żniejsze i drapieżniejsze niż Afrykańskie, mają także
zęby bardziej kończyste. — Wszystkie lubią się
grzać na słońcu: leżąc w ten czas na piasku bez
przytomności, trzymają paszczę tak rozwartą, że szczęki
ich tworzą kąt *dziewięćdziesiąt pięć* stopni mający.
Całą wewnętrzną powierzchnię ich paszczy, jest pię-
knie cytrynowo żółtą, i tylko obwód krztani mają
krwawo czerwony.

R O D Z Ä Y III. (9.)

K A I M A N. A L L I G A T O R.

Caïman. *Fran.* Kaiman. *Niem.*

Pysk długi, gruby, prawie jednostaynie széroki, na szrodku wklęsły, na końcu tępy. Czoto i koniec szczęki wierzchnięy wzniesione. Oczy duże, lekko wystające. Zęby grube nie równe, wszystkie w dołkach przeciwnę szczęki chowaiące się. Zuchwy szczęki górny na przeciw czwártęgo dolnego zęba nie wyszczerbane. Palce przednie wolne. Palce u nóg tylnych wszystkie cztery do połowy błoną spięte. Przy káżdęj nodze tylko trzy przyszrodkowe palce pazurami uzbroione; skrayne zaś bez pazurów. n. p. *Crocodilus Sclerops.* SCHN.

Kaimanów znány dotąd cztery gatunki. Wszystkie mieszkaią wyłącznie w ciepłych kraiach Ameryki. Dorástaią ogromný wielkości. O jch obyčiaiach nic dotąd pewnego niewiemy; bo w opisywaniu jch niezgádzaia się Autorowie. Jedni utrzymuią, że *Kaimany* są drapieźniejsze i niebezpieczniejsze niż *Krokodyle*; drudzy twierdzą przeciwnie, że *Kaimany* bynáymnięj ludzi nie napádaia, i że się żywia tylko Rybami i jnnými Gadami: jnni nakoniec opisuią nám te zwierzęta tak łagodnými, że ludzie kąpiący się w rzekach, swawolą z dzikiemi *Kaimanami* niemal jak z Psami. Do tak przeciwnych sobie zdań, możnáby podadź te dwie przyczy ny: naprzód, że w jednych i tych samych rzekach Ameryki żyia *Krokodyle* i *Kaimany*: trudno więc częstokroć poznać, który się z nich dopuścił gwałtu na ludziach. Drugą zaś przyczyną téy niepewności jest to, że po większey części Po-

dróźopisarze albo nie mają przyzwoitych wiadomości zoologicznych, i mieszają jedno z drugim; albo też są zbyt łatwowierni, i bez przekonania się donoszą nam wieści ludu bardziéy upowszechnione, na których wierzytelności náyczęściéy zawieźdź się można. Wszakże i u nas krążą o naszych zwierzętach tysiączne podania, których prawdziwość nie jeden przysięga nawet śmie popierać, a które w jstocie szkaradném są kłamstwem.

Więcý jednakże Pisarzów zgadzają się na to, że *Kaimany* właściwe Ludzi nie napastują.



Tablica V. (102.)

POKREWIEŃSTWO II. WOLNOJĘZYKIE. *SOLUTILINGRES.*

Jaszczurki czworonożne, mające nogi pięcio palczaste, prawie wszystkie pazurami uzbroione,
wolne; rzadko błoną spiętą: pysk prawie mierny: język wolny, u wielu wysuwalny; ogon
albo z boków ściśniony, albo poziomo płaski.

RODZAJE. GENERA.

u o sp O ściśniony; na plecach tarcze kościane w rzędy poukładane; palce wolne 1. Jaszczur. <i>Dracoena.</i>	skóra łusko. żaden 2. Ostrzegacz. <i>Monitor.</i>	walą; grzebień wyraźny, z kolców wolnych 3. Grzebieniak. <i>Lophyrus.</i>	4. Bazyliżek. <i>Basiliscus.</i>	5. Płaskogon. <i>Uroplatus.</i>

UWĄGI DO TABLICY V. (102.)

Gady tém pokrewieństwem objęte, mają po cztery nogi, z których każdą opatrzoną jest pięcioma palcami. Palce jch (mianowicie u nóg tylnych) są bardzo nierówne, w jednę płaszczyznę ustawione, u większej liczby wolne i pazurami uzbroione.

Większa jch liczba má ogon ściśniony; bo tylko w jednym rodzaju znaydujemy go poziomo spleciony. U większej liczby ciało pokryte jest skórą łuskowatą; bo także tylko jeden rodzaj znany między niemi taki, którego plecy pokryte są drobnymi tarczami kościanymi.

Wszystkie mają blisko nóg na spodzie ogona w poprzek umieszczony otwór odchodowy. Samce wszystkich mają w otworze odchodowym po dwa członki płodne, które się chowają w osobnych pochewkach za skórą na spodzie ogona. U wszystkich znaydujemy język wolny, a u wielu nawet wysuwalny. W wszystkich tu należących napotykamy wyraźne kości obojczykowe; ale nieznaydujemy w nich owych żeber podbrzuchowych, które nas zastanawiały w pokrewieństwie *Przyrosło-językich*. Te ostatnie, dopiero wyrażone uwagi, ściągają się do wszystkich następnych pokrewieństw tego rzędu; w wszystkich albowiem znaydziemy te części ciała podobnie ukształcone.

Zwierzęta tego pokrewieństwa okazują pysk albo miernie długi albo krótki. Zuchwy jch dolne są zwyczajnym sposobem zbudowane, i niezastają za tył głowy. W jch zuchwach znaydujemy po jednym rzędzie zębów, których kształt różny jest w różnych rodzajach: u wszystkich są one przyzwoicie gęsto ustawione i nie mają między sobą w zuchwach dołków dla zębów szczęki przeciwny. U wszystkich dotąd

znanych podniebienie jest bez zębów. Oczy jch mają tylko po dwie powieki. Otwory słuchowe są u nich bez warg mięsistych.

To pokrewieństwo składa się z samych prawie niewinnych zwierząt, które nawet na jmię użytecznych zasługują; gdyż żywią się po większej części innemi Gadami, tudzież Płazami, Owadami i Robakami. Niektórych mięso i jaja są jadalne. Większą jch liczba dorasta dość okazałej wielkości; lecz tą z przeszłemi mierzyć się nie mogą. Co wszystko w dalszych uwagach nad rodzajami dokładniej wyjaśnione zostanie.

R O D Z A Y I. (10.)

J A S C Z U R. D R A C O E N A.

Dragonne. Fran. Dragone. Niem.

Pysk długi, czworo graniasto ostrosłupny. Każdą zuchwa jednym rzędem zębów uzbroioną. Zęby liczne, przyzwoicie gęsto ustawione: przednie drobne, ostrokończyste; tylne grube, tępo przycięte. Język szupty, długi, wysuwalny, na końcu rozdwójony. Oczy duże, bystre. Otwory słuchowe w tyle na bokach głowy duże, łuskami otoczone. Głowa szupleysza niż szyja. Na ciele małe, kościane, w rzędy poukładane tarcze: z tych grzbietowe mają szrodki wywyższone, ostre. Ogon dłuższy niż ciało, przy nasadzie okrągławy, na końcu ściśniony. Grzebień na ogonie jak w przeszłym Pokrewieństwie. Nogł pięciopalczaste. Palce okrągławe, pazurami uzbroione, bardzo nierówne: trzeci od brzegu náydluższy. n. p. la Dragonne. LACÉP.

Z pewnością wiemy dotąd o *jednym* gatunku *Jaszura*. Żyje on w Guianie na miejscach bagnistych i wodą zalanych. Pływá i nurzá się wybornie. Po suchéy ziemi biega szybko i zwinnie. Na lądzie więcéy zabawiá niż w wodzie. Przed ludźmi ucieká na wodę. Doróstá sześciu stóp długości. Mięso má jadalne, smaczne; a jaja wybornego smaku. Na piérwszy rzut oka má cokolwiek podobieństwa z *Krokodylami*. W biegu nosi ogon wysoko w górę podniesiony.

Ostrzedz tu muszę, że *Lacerta dracoena* LINNEUSZA nie do tego, lecz do następującego rodzaju należy. —

RODZAY II. (II.)

OSTRZÉGACZ. MONITOR.

Monitor. albo Tupinambis. Fran. Wach-eidechse. albo Tupinambis. Niem.

Pysk mierny, tępy. Zęby w zuchwach gęste, kończysto klinowate, na brzegach albo gładkie albo ząbkowane. Język szczupły, długi, wysuwalny, na końcu rozdwojony. Oczy mierne. Otwory słuchowe mierne. Ciało drobno tuskowatą skórą pokryte. Ogon dłuższy niż ciało, cały ściśniony: na wierzchu ostry, rzádko grzebieniasty: na spodzie zaokrąglony. Nogi przyzwoite pięcio palczaste. Palce okrągłe, wolne, pazurami uzbroione: tylne bardzo nie równe: drugi od brzęgu náydluższy.

Do tego Rodzaju liczymy przeszło trzynáście gatunków. Wszystkie żyją w bliskości wód słodkich

w kraich pod strefą gorącą; a tém samém w towarzystwie *Krokodyłów*, *Dzióboszczków* i *Kaimanów*. Krokodyle są jch náywiększemi nieprzyjaciółmi, i często je pożeraią. Uciekając więc ustawicznie przed niemi z syczeniem z wody na brzegi, dały powód do mniemania, że na to od Przyrodzenia są przeznaczone, ażeby na brzegu będących Ludzi o wychodzeniu na ląd *Krokodyla* ostrzegały. Stósownie do tego mniemania, nadano jm prawie w wszystkich językach jedno znaczące nazwiska rodzajowe. Nazwisko zaś *Tupinambis*, które jm DAUDIN, nadął, pochodzi z mylnego zrozumienia łacińskiego tekstu w dziele MARGRAVA - DE - LIEBSTAD, który pisząc o zwierzętach tego rodzaju, a mianowicie o gatunku *Temapara*, mówi między jnnemi: »*Vulgo dicta Teyu-Guazu, et Temapara Tupinambis.*» Co znaczy: »*Nazywają go pospolicie Teiugazu, w naszym rodzie zaś Tupinambów zowią go Temapara.*»

Ostrzegacze nálezają do liczby większych zwierząt w tym rzędzie. Niektóre z pomiędzy nich przechodzą sześć stóp długości. W bieganiu i w pływaniu są bardzo szybkie i zwinne. Żywią się Owadami, Robakami, Rybami i jajami Krokodyłów. Pożeraią także drobniejsze Gady i Plazy, za którými się bardzo często aż na strzechy mieszkań Murzyńskich zapędzają. Są niędzy niemi i takie, które się zakradaią do domów tamtejszych mieszkańców dla wypiiania jáy i dławienia młodego ptastwa domowego. Wielu mięso jest jadalne i z smakowitości zachwalane.

Podług jakości zębów, dzielimy je na dwa następujące podrodzaie:

a. W A R T N I K. le S A U V E G A R D E.

Zęby na bokach pilasto ząbkowane. U niektórych ogon widlastym grzebieniem naiężony. n. p. Lacerta bicarinata. GL.

Z powyższéj ogólnéj liczby należą tu dwa gatunki. Z tych za przykład podany dań widlastym grzebieniem na ogonie piękny przechód z przeszlego rodzaju do tego. Obadwa tu należące gatunki żyją wyłącznie w Ameryce.

b. OSTRZĘGACZ. *le* MONITOR.

Zęby kończyste, z brzegami gładko ostrémi. Ogon bez grzebienia. n. p. Tupinambis stellatus. DAN.

Ten oddział zawiera w sobie resztę z powyższéj ogólnéj liczby gatunków, które żyją rozprószone w Azji, w Afryce i w Ameryce tak jednakże, iż każdą z tych części świata chowają sobie właściwe gatunki.

R O D Z A Y III. (12.)

G R Z E B I E N I A K. L O P H Y R U S.

Lophyre. *Fran.* Lophyr. *Niem.*

Pysk krótki. Zęby w zuchwach kończyste. Język mięsisty, gruby, mierny, niewysuwalny, na końcu wycięty. Kości brwiowe wystające. Oczy wielkie, wypukłe. Otwory słuchowe obszerne. Podgardle słabo workowate. Ciało pokryte skórą łuskowatą. Od karku aż do końca ogona rząd krótkich, błoną nie spiętych, w górę sterczących kolców tworzy ich grzebień. Ogon długi, ściśniony. Nogi bardzo szczupłe, pięć palczaste. Uda bez dziurek potowych. Palce szczupłe, nierówne, wolne, pazurami uzbrojone. U nóg tylnych palec drugi od brzegu najdłuższy.

Dotąd wiemy tylko o *dwóch* gatunkach, które tu należą; a temi są: *Lacerta scutata* i *Lacerta superciliosa*. GL. — Pierwszy gatunek mający koniec pyska dziwacznie wzdęty, a tył głowy kolcami uzbroiony, żyje w Azji południowey. Drugi przeciwnie má pysk kończysty, a tył głowy bez kolców: ten jest mieszkańcem Ameryki południowey i wysp jéy przyległych. Te osobliwsze zwierzęta są jeszcze mało znane: przeto o jch obyczajach nic stanowczego powiedzieć nie możemy. SEBA pisze o nich, że się zwabiają często donośnym głosem: co jeżeli jest prawdą, jest oraz ważnym wyjątkiem między Gadami rzędu tego.

R O D Z A Y IV. (13.)

B A Z Y L I S Z E K. B A S I L I S C U S.

Basilic. *Fran.* Basilisk. *Niem.*

Pysk mierny, tępo stożkowaty, na wierzchu lekko spłaszczony. Zęby w zuchwach gładkie, silne, ściśnione. Język mięsisty, gruby, mierny, niewysuwalny, na końcu wycięty. Oczy mierne, bystre. Podgardle wietkie, lecz nie workowate. U niektórych tył głowy workowaty. Na plecach i na ogonie wysoki, błonowy, promieniami kościanemi podparty grzebień. Ciało całe i grzebień pokryte drobnemi łuskami. Ogon ściśniony, bardzo przedłużony. Nogi szczupłe, pięć palczaste. Na udach dziurki potowe rzędem ustawione. Palce szczupłe, wolne, nierówne, pazurami uzbroione. U tylnych nóg palec drugi od brzegu najdłuższy. n. p. Lacerta Basiliscus. GL.

Niemasz podobno Człowieka, który się nie nasłuchał licznych, strachem i zgrozą przerażających powieści o Bazyliżkach. Z tego powodu poczytu-

iemy sobie za obowiązek ostrzeżenie Czytelników, że takie i tём podobne poczwary, nigdy słońce na ziemi nie oświecało; a tём samém, że wszystkie okropnością przesadzone podania o *Bazyliżkach* bezczelnémi są baśniami. To prawda, że nam za graniczni kuglarze i oszusty przywożą częstokroć w dziwacznych kształtach suszone potwory, które pokazując pód nazwiskiem owych straszliwych *Bazyliżków* łatwowiernemu i mniéy oświeconemu ludowi, rozsiéwiaią i wkorzeniaią między nim náydziksze wyobrażenia. Te potwory nie mające żadnego podobieństwa z *Bazyliżkami* prawdziwémi robią oni z *Ryb*, które *Raiami* nazywamy; a szczególniéy z *Rai sękatéy* (*Raia clavata*) i z *Rai kolczastéy* (*Raia aculeata*). Gabinet Zoologiczny Król. Warszaw. Uniwersytetu posiadá jeden exemplarz takiego dziwotwora zrobionego.

Práwdziwie jstnące *Bazyliżki*, są zwierzęta łagodne, boiażliwe, powabnie ubarwione, a Człowiekowi nie tylko nie szkodliwe, ale nawet pożyteczne; bo żywiąc się po większéy części Robákami i Owadami, wytępiaią wiele takich jstót, które gospodarzom w lasach i w ogrodach szkody zrzádziaią. Náywięcéy przebywiaią one w bliskości wód. Pływaią i nurzaią się wybornie. Po ziemi biegaią szybko i zwinnie. Na drzewa włazią zręcznie. Známy jch dwa gatunki, z których gatunek za przykład podany, mieszkaiący w południowéy Ameryce, z przyczyny wysmukléy kibici i powabnie mieniącego ubarwienia swojego, słuszenie pomiędzy ozdobiensze zwierzęta tamtych okolic liczyć się może. Na tyle głowy má on wyrost workowaty, kończysty naksztált szlafmicy. Drugi zaś (*Lacerta amboinensis*. GL.) znáyduie się w Jndyach wschodnich i na wyspach jéy przyległych. Miewaią one niekiedy trzy stopy długości; lecz z tego sám ogon záymuie przeszło dwie trzecie części.

R O D Z A Y V. (14.)

P Ł A S K O G O N. U R O P L A T U S.

Uroplate. *albo* Tête-plate. *Fran.* Plattschwanz.*albo* Uroplat. *Niem.*

Pysk długi, płaski, szeroki, tępo klinowaty. Głowa duża, płaska. Kości brwiowe mocno łukowato wzniesione. Oczy bardzo wielkie, wypukłe. Żrenica pionowa, wązka, ściągalna. Powieki krótkie. Otwory słuchowe małe. Paszcz bardzo obszerna, aż poza oczy застаie. Zęby w zuchwach liczne, drobne. Język mięsisty, gruby, niewysuwalny. Ciało pokryte skórą drobno ziarnkowato chropowatą. U niektórych od końca szczeki spodnię aż do nóg tylnych listwa błony strzępkowatę oddziela na bokach wierzch ciała od spodu. Nogi pięcio palczaste, mierne: tylne dłuższe niż przednie. Palce prawie równe, przy nasadzie spięte; dalej wolne, błoną rozszerzone. Każdy palec pod spodem rowkiem oznaczony, dwiema rzędami łusek pokryty i pazurem w rowku ukrywalnym uzbroiony. Ogon krótszy niż ciało, spłaszczony, na bokach błoną rozszerzony.

Zwierzęta tego rodzaju różnią się kształtem ogona od wszystkich dotąd znanych Gadów tego rzędu. CUVIER dzieli je na dwa następujące oddziały:

a. *Listwa błony strzępkowatę na bokach ciała wyraźna.* n. p. *Stellio limbriatus.* SCHN.


Do tego oddziału wiemy tylko o *jednym* gatunku, który żyje na wyspie Madagaskar. Jest zwierzęciem nocnym: ztąd tylko w dni pochmurne widzieć się daie. Zamieszkuje dziuple drzew wypru-

chniałych. Łazi zręcznie po drzewach. Skacze po gałązkach szybko i zwinnie. Po ziemi ma chód po-
 wolny i pełzający. Idąc po ziemi trzyma pospoli-
 cie pascz otwartą: co dało powód, że się go tam-
 téysi mieszkańcy bardzo boją, poczytuiać go náy-
 niestuszniey za zwierze jadowite. W jstocie zaś jest
 on stworzeniem niewinném i nieszkodliwém. Żywi
 się prawie wyłącznie Owadami. Dorasta pół dzie-
 więta cała długości: z czego ogon blisko pół trze-
 cia cała zajmuie. Długość głowy jego wraz z py-
 skiem wyrównywa połowie długości tułowu. Masę
 wierzchu ciała może on dowolnie zmieniać w czer-
 woną, w zieloną i w błękitną; lecz na spodzie cia-
 ła jest stale pięknie żółty, połyskuiały. Francuzi
 nazywają go albo *Tête-plate*, albo *Gecko frangé*,
 albo *Famo Cantrata de Madagascar*.

b. *Boki ciała bez blony strzepiastéy. Palce*
mało co rozszerzone. n. p. *Stellio phyllurus.* SCHN.

Tu náleżą dwa gatunki, z których właśnie za
 przykład podany żyje na Nowéy Hollandyi. Oby-
 czaie jch są nám jeszcze nieznaioime. Francuzcy
 Autorowie nazywają je *les Phyllures*.

Zwierzęta tego rodzaju, a mianowicie do pier-
 wszego oddziału náležące, dają błonę naboczną pię-
 kny przechód do pokrewieństwa następuiącego.



Tablica VI. (103.)

P O K R E W I E Ń S T W O III.

S K R Z Y D L A T E. A L A T I.

Jaszczurki czworonożne, okrągło ogoniaste, mające na bokach ciała między nogami skrzydła błonowe: nogi pięciopalczaste, palce wolne, nie równe, w jednę płaszczyznę ustawione, pazurami uzbroione: język wolny.

R O D Z A Y.

G E N U S.

Smok.

Draco.

UWĄGI DO TABLICY VI. (103.)

Ponieważ do tego pokrewieństwa tylko jeden rodzaj należy: zaczniemy więc wprost od uwąg nad tymże rodzajem.

R O D Z A Y I. (15.)

S M O K. D R A C O.

Dragon. *Fran.* Drache. *Niem.*

Pysk mierny, lekko spłaszczony. Głowa w czole wypukła, zaokrąglona. Oczy mierne, podługne. Otwory słuchowe błoną pokryte. U podgardla worek długi, mnięty więcej kończysty. Pyszcz obszerna. Zęby w zuchwach troiste jednym rzędem:

przednie drobne w obu szczękach po cztery: kły ~~tr~~
 jedyne, od przednich dłuższe, ostrokończyste: tr
 nowe grube, tróyrniane i tróyrniane, w każ
 zuchwie po dwanaście. Język gruby, mięsisty, w
 wysuwalny, na końcu wycięty. Ciało szczupłe, sk
 ra drobno łuskowatą pokryte. Na bokach cia
 skrzydła błonowe, od nóg oddzielone. Ogon ba
 dzo długi, szczupły, okrągły. Uda bez dziurek p
 towych. Nóg cztery pięcio palczastych. Pal
 szczupłe, wolne, nierówne, pazurami uzbroione, w
 dnę płaszczyźnie ustawione. Palec wielki od j
 nych odsunięty. n. p. *Draco lineatus*. Dau.


Zwierzęta tego rodzaju tak są osławione, iż s
 mo jch nazwisko przywołując nam okropne (ale u
 roione) potwory na pamięć: mimowolny nawet d
 nich wstręt w nas obudzi. Tym czasem *Smoki*,
 których mówimy, powinny na wzgląd i na poszano
 wanie zasługiwać. Są to bowiem drobne, dość po
 wabnie ubarwione, zupełnie niewinne, a oraz użyte
 czne stworzenia; bo się żywią prawie wyłącznie O
 wadami; a szczególniej Owadami takimi, które drze
 wom są szkodliwe. Wiemy dotąd o trzech gatu
 kach: Wszystkie zamieszkują w Indiach wscho
 dnych i na wyspach jm przyległych. Żyją prawie u
 stawicznie na drzewach; a uganiając się za Owada
 mi: skaczą szybko i zwinnie po gałązkach. Náywie
 kszy z dotąd widzianych, miał od końca pyska do
 końca ogona dwanaście cali długości; lecz z tego
 sam ogon zajmował blisko ośm cali. Budowa jch
 ciała godną jest bliższego zastanowienia.

Otwory jch nosdrzy małe, okrągłe, rozsunione
 na boki końca pyska i umieszczone w małych wy
 niosłościach, nadają jch pyskowi postać mopsikowa
 tą. One jedne w całym gromadzie Gadów mają
 zęby przyzwoicie rozróżnione i zębom zwierząt Ssa
 cych náybardziej podobne. Jch okrągłe otwory
 słu-

śluchowe powleczone są na wierzchu cienką błoną. Jch kark przyozdobiony jest niskim ząbkowanym grzebykiem. Skrzydła jch są po części podobne skrzydłom latających zwierząt Ssących; lecz różnią się od tamtych naprzód tém, że jch nagie błony lotne są od nóg oddzielone; a powtórę, że każda jch błona podpartą jest sześcioma promieniami kościanemi. Te promienie kościane w jch błonach lotnych są to pierwsze jch żebra przybyszowe, które zamiast w łukowatym zgięciu otaczać boki jch ciała, są zaraz od grzbietu wyprostowane i w błony lotne pod postacią promieni powplątane. Tak urządzone jch skrzydełka, służą jm tylko do zabezpieczenia jch od upadku w czasie skakania po gałęzkach; ale latać za pomocą nich dowolnie po powietrzu tak jak Ptaki nie mogą; bo nawet poruszać niemi podług woli niezdolają. Resztę kościskładu, tudzież urządzenie wnętrzości i części płodnych, znaydujemy w nich podobne jak w pokrewieństwie *Wolnojęzykich*. Samice *Smoków* znoszą pospolicie tylko po pięć jaj, które składają w takich dziuplach drzew, do których promienie słońca wolny przystęp mają.

Takich *Smoków*, jakiemi nas báieczná starożytność w podaniach swoich przestrasza, dzięki Niebu! nigdy ziemia nasza nie mieściła na swém łonie. To prawda, że się około połowy przeszłego wieku zjawił w Hamburgu ogromnie wielki wypchany Smok o siedmiu głowach, którego kupcy tamteysi DREYERN i HEMPEL jako wielką osobliwość ogłosili, żądając za ustapienie jego dziesięciu tysięcy złotych réńskich, czyli *czterdziestu tysięcy złotych polskich*. Łatwowierny SEBA kazał go natychmiast odsztychować, i umieścić ten obraz obok opisu téy poczwary w dziele swoim. Lecz gdy dla widzenia tego potworu przybył umyślnie z Szwecyi wiekopomny Ba-

dacz LINNEUSZ: còż znalazł? — Oto *Położa* (*), któr
 mu wypychacz sześć głów jnnych Położów zręczni
 przyprawił. Odkrycie tego oszukaństwa niwecza
 nadzieie ogromnego zysku, okryło słuszném pośmie
 wiskiem oszustów; a tém samém obaliło ten now
 pozorny dowód o jstnieniu owych uroionych strasli
 wych poczwár, które w starożytnych powieściach
 Smokami są nazwane.



(*) Położ, *Boa*, o którym w trzecim rzędzie téy gromady obszérniéy
 mówić będziemy.

Tablica VII. (104.)

P O K R E W I E Ń S T W O IV.

K L Ę S C Z O N O G I E. S C A N D E N T E S.

Jaszczurki czworonożne, okrągło ogoniaste, bez skrzydłne, mające nogi pięcio palczaste: palce prawie równe, pazurami uzbroione, u każdéj nogi na dwie przeciwległe kępki przedzielone: język wolny.

R O D Z Á Y.

G E N U S.

Kameleon.

Chamaeleo.

UWĄGI DO TABLICY VII. (104.)

Gdy podług odczytanéj dopiéro tablicy, jeden tylko rodzaj mieści się w tém pokrewieństwie: przystąpmy więc od razu do uwąg rodzaowych.

R O D Z Á Y I. (16.)

KAMELEON. *CHAMAELEO.*

Caméléon. *Fran.* Chameleon. *Niem.*

Pysk mierny, wraz z głową z boków ściśniony, czworoboczno klinowaty. Głowa w tyle podwyższona. Oczy wielkie, wypukłe, skórą ciała pokryte, i tylko przez mały otwór przeglądające. Otwory słuchowe żadne. Pyszcz obszerna. Żęby w zuchwach

jednym rzędem, drobne, trójdzielne. Język mięsisty, ogrubny, walcowaty, długi, wysuwalny. Podgardle nie workowate. — Ciało ściśnione, drobnoziarnkowato chropowatą skórą pokryte. Grzbiet ostry, u wielu grzebykowato ząbkowany. Ogon długi, okrągły, chwytny. Nóg cztery pięcio palczastych. Palce prawie równe, małemi pazurami uzbroione: u każdej nogi tak na dwie przeciwległe kępki rozdzielone, że w jednej są dwa, w drugiej trzy palce; w obudwóch kępkach są one przy nasadzie z sobą zroste. n. p. Lacerta Chamaeleo. GL.

Liczymy do tego rodzaju cztery dobrze rozróżnione gatunki, których większą część żyje w Afryce. Wszystkie należą do pomniejszych zwierząt w tym rzędzie. Bawią prawie zawsze na drzewach. Łażą bardzo powoli. Żywią się wyłącznie Owadami, które na swój długi, bardzo lępką wilgocią obłany język zrećźnie chwytają. Są bardzo łagodne i tak niewinne zwierzęta, że dzikiemu nawet palec do gęby bez obawy włożyć można; bo go pewnie ani nieściśnie. Budowa ich ciała zasługuje na szczególniejszą uwagę; tyle albowiem mają w niej ważnych różnic, że nawet za osobny rząd w téj gromadzie mogły by być uważane.

Kameleony nie mają widocznych otworów słuchowych; a narzędzia słuchu ukryte są u nich pod skórą. Ich bardzo wielkie, wypukłe, zlocisto połyskujące, bystre oczy, nie mają zwyczajnych powiek, ale powleczone są skórą taką jak całe ciało: mały tylko okrągły otwór w téj skórze dozwala jch żręnicy wolnej działalności. Nadto oczy jch są zwrotne na wszystkie strony; a przy tém tak urządzone, że w jednym czasie mogą każdym okiem w inną patrzeć stronę; bo zwroty jednego jch oka nie zawisły bynajmniej od zwrotów drugiego. Takiego oczów urządzenia nieznajdujemy w żadnym innym rodzaju zwierząt Grzbietnych.

Kameleon opatrzony jest cztériema nogami; a palce u nóg ma podobnie ustawione, jak w rzędzie *Ptaków Łazących*. Te jednakże zachodzą tu różnice: naprzód że *Kameleon* mając u każdéj nogi po pięć palców; więc téż u każdéj trzy palce zwrócone są na jedną, a dwa na drugą stronę: powtóre, że w obudwóch tych sobie przeciwległych kępkach, palce jch po większéj części są z sobą zrosłe i tylko na końcach wolne; a że przy tém palce jch są prawie równe: z tąd każdá jch noga má postać obcęgow. Podobnych nóg w całéj gromadzie Gadów niespostrzeżemy.

Jch ogon wyrównywa długości ciała, jest przytém tak chwytny jak w niektórych rodzajach zwierząt *Ssących Czwororęcznych*. Takiego ogona nieznaydziemy w żadnym jnnym rodzaju tego rzędu.

W jch kościoskładzie postrzegamy tę osobliwość, że właściwe jch żebra stykają się (jak zwykle) z kośćciami mostku; większą zaś ilość żeber przybyzowych połączoną jest w pary przez osobne kościaste łuki podbrzuchowe. Jch czaszka jest w tyle piramidalnie wywyższoną.

Jch płuca są tak wielkie, że jm przez całą prawie kłatkę brzuchową przestają; a oraz tak cienkie, że gdy je nadmą, całe jch ciało staje się w półprzezroczyste. Ta okoliczność dała powód do mylnéj, ale pociesznój powieści, że *Kameleony* żyją samém tylko powietrzem.

Części płodne znaydujemy u nich podobnie urządzone jak u wszystkich *Wolnojęzykich*. Samice znoszą rocznie náywięcéj po dwanaście jaj, które składają albo w płytkich dziuplach drzew albo na skalach.

W całéj gromadzie Gadów, *Kameleony* posiadają náywiększą zdolność zmieniania maści skóry

swoiędzy; lecz nie tak przecie, jak nam to niektórzy przysadni Autorowie opisują. Zmiany w maści ich ubarwienia są stale, od okoliczności zdrowia i namiętności zawisłe. *Kameleony* zdrowe, syte, na świeżem powietrzu i w stanie obojętności będące, są pospolicie pięknie *błękitnawo zielone*: w wielkiej wesołości przybierają maść *zielonawo błękitną*; gdy są głodne lub słabe, stają się *żółtawo zielone*, i im bardziéj ich słabość się wzmaga, tém więcéj żółtość bierze nad zielonością przewagę. W gniewie i w niepokojności, pierwsze trzy zasadowe maści przemieniają na swę skórę z náywiększą skwapliwością. Po śmierci stają się tak *żółtawo rude* jak zgniły liść drzewa. Przyczyną takiego zmieniania maści na skórze jest to, że mają krew prawie zupełnie ciemno błękitną, a weny i arteryie żółte. Do tego przyczynia się także urządzenie i wielkość ich płuc.

Kameleony tak są powolne w wszystkich poruszeniach swoich, że nam mimowolnie nawet przypominają *Leniwców* w gromadzie Ssących. Jedne tylko ich oczy są w ustawicznych prawie, a bardzo szybkich zwrotach na wszystkie strony.

Drobno ziarnkowatą łuska, którą skóra ich jak piaskiem gęsto jest posiana, mając słabo mieniący szarawy połysk, przyczynia się niepomału do przyozdobienia ich pięknie zielonęj skóry w stanie zdrowia.

Nazwisko *Chamaeleo* pochodzi od greckiego wyrazu *Χαμαιλέον*, które temu rodzajowi nadał ARYSTOTELES, a które tłómacząc dosłownie znaczy: *Lelek* albo *Mały-Lew*. To nazwisko maluje ponieważ obyczajem tego zwierzęcia; bo idący po ziemi *Kameleon*, trzymając pospolicie ogon w górę podniesiony i mniéj więcéj zwiniony; a z przyczyny swęj powolności, postępuje z náywiększą powagą.

Tablica VIII. (105.)

POKREWIEŃSTWO V. ZWYKŁONOŚCI. *AGILES.*

Jaszczurki czworonożne, okrągło ogoniaste, bezkrzydłone, wolnojęzykie, mające palce u nóg wolne, w jedney płaszczyźnie ustawione, pazurami uzbroione.

RODZAJE.	GENERA.
splaszczone, grube, pękate; ogon nągie zeschupiony; głowa wypukła . . .	1. Żabojaszczur. <i>Lacertus.</i>
miernie; pokryte łuskami { drobniemi, miejscami w górę popodnoszonemi . . .	2. Stęrczółuska. <i>Agama.</i>
skorą łuskowatą; ogon { dłużemi, kończystemi, położystemi . . .	3. Łusczalka. <i>Cordylus.</i>
obraczkowaty; najężony . . .	4. Kolcogon. <i>Stellio.</i>
splaszczone; oczy { wielkie . . .	5. Gekon. <i>Gekko.</i>
okrągłe; podgarbione { miernie . . .	6. Pęcherzowiec. <i>Anolis.</i>
workowate; grzbiet { bez grzebień 7. Legwan. <i>Iguana.</i>	
bez kolanierza 8. Marmółka. <i>Polydorus.</i>	
z kolanierzem 9. Ameiwa. <i>Ameiva.</i>	
z kolanierzem 10. Jaszczurka. <i>Lacerta.</i>	
11. Elada. <i>Scincus.</i>	
12. Jaszczurówka. <i>Chalcides.</i>	

UWĄGI DO TABLICY VIII. (105.)

Gady do tego pokrewieństwa należące wszystkie mają to wspólne, że opatrzone są czterema nogami, że palce u ich nóg są wolne, pazurami uzbroione w jedną płaszczyznę ustawione. Wszystkie mają język wolny. W wszystkich znajdziemy wewnątrz wszystkie w jednej komorze czyli w klatce brzuchowej. U wszystkich kości obojczykowe są wyraźne. W wszystkich spostrzegamy pod ogonem poprzeczny otwór odchodowy; a w nim u samców po dwa członki płodne. W żadnym ich gatunku nie dostrzeżemy owych osobliwszych żeber podbrzuchowych, o których w pierwszym, lub w czwartym pokrewieństwie rzędu tego była mowa. Oczy wszystkich opatrzone są powiekami zwyczajnymi. Otwory słuchowe u większej liczby są wyraźne i otwarte. Między innymi postrzeżemy po raz pierwszy w niektórych rodzajach na podniebieniu po dwa rzędy zębów drobnych.

Skórę łuskowatą nazywamy na Gadach taką skórę, na której łuski są zupełnie wrosłe, czyli wszystkimi brzegami swoimi do niej przytwierdzone. Używamy tego nazwiska dla rozróżnienia przedkiego *łusek właściwych*, które na niektórych między innymi postrzegamy, a które jednym tylko końcem do skóry są przyrosłe, podobnie jak na Rybach. *Kołnierzem* zwiemy rząd dużych odstających łusek, który widzimy pod szyją w rodzaju *Jaszczurek właściwych*.

R O D Z Á Y I. (17.)

Ż A B O J A S C Z U R. L A C E R T U S.

Tapaye. Fran. Froscheidechse. Niem.

Głowa mała, prawie kulista lub trójkątna. Pysk bardzo krótki, z boków ściśniony, kątowato zakończony. Szczęka wierzchnia w pół haczykowata. Oczy mierne. (Otwory słuchowe wyraźne?) Zęby w zuchwach drobne, jednym rzędem. Podniebienie bez zębów. Język wolny, gruby, mięsisty, nie wysuwalny. Podgardle lekko rozdymalne, lecz nie workowate. Ciało płasko pękate, prawie tak szerokie jak długie, drobnymi kończysto najęzonymi łuskami pokryte. Ogon nagle zeszuplony, podobnie najęzony, krótszy niż ciało. Nogi cztery szupłe, pięcio palczaste. Palce wolne, szupłe, nierówne, pazurami łukowatymi zakończone: szredni nąydłuższy. n. p. *Lacerta orbicularis*. GL.

Wiemy o dwóch gatunkach Żabojaszczurów. Obadwa żyją w Ameryce pod strefą gorącą. Należą do liczby pomniejszych Gadów w tym rzędzie. Żywią się Owadami i Robákami. Są bardzo łagodne. Mianowicie gatunek za przykład wymieniony jest bardzo pieszcotliwy; ale oraz tak tkliwy w nosdrzach i przy oczach, że cokolwiek mocniejsze przyciśnienie palcem w tych miejscach zaraz mu krwotok zrzadza. Więcéy o jch obyczajach nic nie mamy pewnego.

Żabojaszczury tak są płasko pękate, że na pierwszy rzut oka mają wielkie podobieństwo z nadętymi Ropuchami. W tym jednym rodzaju widzimy ogon zaraz przy tylnych nogach nagle zeszuplony.

R O D Z A Y II. (18.)

S T É R C Z O Ł U S K. A G A M A.

Agame. *Fran.* Agama. *albo* Agam-Eidechse. *Nier-*

Głowa sercowato wypukła. Pysk krótki, n końcu ściśniony. Szczęki proste. Oczy duże, wyp kłe. Otwory słuchowe wyraźne. Na podgardl skóra w poprzek pozmarszczaná, rozdymalna. Zęb w zuchwach jednym rzędem kończyste. Podniebie nie bez zębów. Język wolny, gruby, mięsisty, n końcu wycięty, nie wysuwalny. Ciało wysmukłe miernie długie, drobnými łuskami pokryte. Łuski w różnych mieyscach na ciełe popodnoszone, w gó rę sterczące, i drobnými kolcami najężone (rzadko zupełnie gładkie). Ogon przedłużony, nieznacznie ku końcowi coraz szuplejszy. Nogi pięcio palczaste. Palce szupłe, okrągławe, nierówne, pazurami uzbroione.

Zaráz na wstępie do uwág nad tym rodzaiem ostrzedz musimy, że w zwierzętach tu należących, Autorowie GMELIN, DAUDIN, SHAW i SLOANE wielkiego narobili zamieszania. Mianowicie piérwszy do opisów swoich po cytował takie obrazy z jnych Autorów, które są zupełnie przeciwne opisom.

Sterczołuski dzieli CUVIER na dwa następujące podrodzaie.

a. S T É R C Z O Ł U S K. A G A M A.

Agame. Fran.

Łuski w różnych mieyscach, a mianowicie na bokach głowy i w zdłuż grzbietu popodnoszone, drobnými kolcami najężone. n. p. Lacerta muricata. SH.

Do tego oddziału należy dobrze rozróżnionych sześć gatunków. Wszystkie mieszkają w krajach gorących. Żywią się powiększcy części Owadami. Należą do drobnych zwierząt w tym rzędzie. Z przyczyny miejscami najęzonych, kończystych łusk mają postać dziwną.

b. Z M I E N I A C Z. T R A P E L U S.

Changeant. *Fran.*

Ciało pokryte gładko łuskami drobnymi. Reszta cech zgodną z cechami rodzaju. n. p. le Changeant d' Egypte. GEOFF.

Ten oddział mieści w sobie tylko jeden gatunek. Jest to małe zwierzątko, które odkrył GEOFFROY S. H. w Egipcie pod czas ostatniéj wojennéj wyprawy Francuzów do tegoż kraju. To zwierzątko może jeszcze przedzwy zmienić maść ubarwienia swego niż Kameleon.

R O D Z A Y III. (19.)

Ł U S C Z A T K A. C O R D Y L U S.

Cordyle. *Fran.* Stachel-Eidechse. *Niem.*

Głowa płaska, w tyle bardzo szeroka, niezna-
cznie w długi pysk przechodzi, i z nim tępy tró-
ką tworzy. Głowa i pysk pokryte dużemi listkami
rogowemi. Oczy duże. Otwory słuchowe obszerne.
Podgardle nierozdymalne. Zęby w zuchwach koń-
czyste jednym rzędem. Podniebienie bez zębów.
Język wolny, gruby, mięsisty, nie wysuwalny, na
końcu wycięty. Ciało wysmukłe, całe dużemi łus-

skami pokryte. Nogi pięcio palczaste. Palce wolne, szupłe, nierówne, pazurami uzbroione.

Tegocześni Naturaliści dzielą ten rodzaj na dwa następujące podrodzaje:

a. ŁUSCZATKA. CORDYLUS.

Cordyle. Fran.

Ciało lekko spłaszczone, całe odstaiącemi, długiem i, kończystemi łuskami pokryte. Ogon długi, ogrubny, obrączkami z długich, kończystych łusk najężony. Grzbiet bez grzebienia. Palce u nóg zbliżone. Na udzie rząd dużych dziurek potowych. n. p. Lacerta Cordylus. GL.

Łusczatki są mieszkańcami Azji, Afryki i południowych krajów Europy. Zbyt oszczędne i niedokładne opisy są przyczyną, że wszystkie za jeden gatunek są dotąd uważane. Należą one do pomniejszych Gadów w tym rzędzie; gdyż náywiększy z dotąd widzianych, nie przechodził dwánastu calów długości. Płaskością głowy i długością kończystych łusek na całym cieie, różnią się one zaraz na pierwszy rzut oka od wszystkich jnych dotąd znanych zwierząt w tym rzędzie. Ich ogon nie wiele dłuższym jest niż ciało.

b. ZAWADYIASZ. CALOTES.

Galéote. Fran.

Ciało zaokrąglone, całe gładko leżącemi łuskami pokryte. Łuski daszkowate z szrodkami ostrémi. Wzdłuż grzbietu rząd łusek kończystych na kształt grzebienia podniesionych. Ogon bardzo przedłużony, i bardzo szupły. Uda bez dziurek potowych. Palec skrajny u nóg tylnych od jnych usunięty. n. p. Lacerta Calotes. GL.

Z pewnością liczymy do tego oddziału *dwa* gatunki, które mieszkają na wyspach południowej półkuli ziemi. Gatunek za przykład podany żyje na wyspach Moluckich. Piękny jego exemplarz, który widziałem w Gabinecie Zoologicznym w Paryżu, miał od końca pyska do końca ogona blisko ośmnáście calów długości; lecz z tego sám ogon záymował czternáście calów. Tak niestosunkowá długość ogona, była zapewne powodem do nazwiska *Zawadyiasz*, które od X. KŁUKA w języku naszym te zwierzęta dostały: jakoż tak przedłużony a szczupły ogon, musi jím w biegu zawádzac.

Ostrzedz tu musimy, że obrazy tych zwierząt w dziele *Seby* są dalekie od rzeczywistości. Pomiiám jinne punkta; ale to niegodne przebaczenia, że jím podawał (w brew prawdzie) długie, szczupłe, wysuwalne języki.

R O D Z Á Y IV. (20.)

K O L C O G O N. S T E L L I O.

Stellion. *Fran.* Dorneidechse. *albo* Stellion. *Niem.*

Głowa na bokach wzniesioná, w szrodku wklęsłá, drobnými łuskami pokrytá. Pysk mierny, tępy. Oczy mierne. Otwory słuchowe obszérne. Żęby w zuchwach jednym rzędem kończyste. Podniebienie bez zębów. Język wolny, gruby mięsisty nie wysuwalny, na końcu wycięty. Ciało wysmukłe, drobnými, kończystými łuskami pokryte. Na ogonie łuski długie, ostrokończyste. Nogi pięcio palczaste. Palce szczupłe, pazurami uzbroione, zbliżone, nierówne: sredni náydłuższy.

Dawniέy poczytywano *Kolcogony* za zwierzęta náychtrzeysze i bardzo niebezpieczne dla Ludzi. Ta ich uroioná hytrość przeszła nawet w przysłowie prawników; gdyż podstęp czyli oszukaństwo kontraktowe w języku łacińskim nazywają *stellionatus*. W istocie atoli, zwierzęta do tego rodzaju należące są zupełnie niewinne, i żywią się prawie wyłącznie Owadami i Robákami. Do tak niesprawiedliwego posądzenia ich było zapewne to powodem, że *Kolcogony* nosząc głowę ku ziemi pochyloną, mają przy tém wzrok bystry, uboczny: co wszystko nadaie im wyráz chytrości. To pochyłe noszenie głowy jest także przyczyną, że ich Turcy mściwie zabijają; trzymając albowiem Muzułmani pod czas modlitwy głowę na dół schyloną, poczytują *Kolcogonów* za istoty náygrawiające się z ich sposobu odprawiania modłów.

Liczymy ich pięć gatunków. Wszystkie są dość powabnie ubarwione. Południowe kraie Europy i Azji, tudzież Afryka i południowá Ameryka są ich Ojczyzną. CUVIER dzieli je na dwa następujące oddziały.

a. *Mieyscami na ciele łuski w górę sterczące. Uda bez dziurek potowych. Ogon dłuższy niż ciało, na końcu mocno zeszuplony.* n. p. *Lacerta Stellio.* GL.

Tu należy tylko ten gatunek, który właśnie za przykład został wymieniony. Żyje on w Grecyi, w Azji mniejszey i w Egipcie. Gnóy jego był dawniέy zbierany i w aptékach pod nazwiskami: *cordylea*, albo *crocodylea*, albo *stercus Lacerti* jako piekrydło (*remedium cosmeticum*) czyli jako środek dopomagający do gładkości i delikatności skóry dla Płci piękney wielce zachwáłany; lecz teraz upadł on w niezasłużonym kredycie. — Teraźniejsi Grecy nazywają ten gatunek *Koskordylos*.

b. Łuski na ciele gładko leżące. Ogon krótszy niż ciało, ogrubny. Na udach dziurki potowe wyraźne. n. p. *Stellio spinipes*. DAU.

Do tego oddziału przypada reszta z powyższej liczby gatunków. Gatunek za przykład podany, mieszkający w Egipcie jest z wszystkich największy. — Dorasta on czasem trzech stóp długości. Inne gatunki są znacznie mniejsze.

R O D Z A Y V. (21.)

G E K O N. G E C K O.

Gecko. Fran. Gecko. Niem.

Głowa duża, lekko spłaszczona. Pysk długi, gruby, niezgrabny. Oczy wielkie, wypukłe, odkryte z żrenicami ściągalnemi. Powieki krótkie, oczów niepokrywają. Otwory słuchowe wyraźne. Pącz obszerna. Żęby w zuchwach gęste, kończyste jednym rzędem. Podniebienie bez żębów. Język gruby, mięsisty, niewysuwalny. Nogi pięciopalczaste. Palce wolne, prawie równe, całe lub w części rozszerzone. Pazury łukowate, wysuwalne, ostro kończyste u wszystkich lub tylko u niektórych palców. Cały wierzch ciała pokryty skórą ziarnkowato chropowatą, cały zaś spód skórą łuskowatą. Ciało lekko spłaszczone. Ogon długości ciała, ogrubny, obrączkowato pozmarszczaną skórą pokryty.

Gekonów liczymy teraz dobrze rozróżnionych przeszło siedmnaście gatunków. Są one mieszkańcami ciepłych krajów w wszystkich częściach świata. Każdą atoli część ziemi ma sobie właściwe gatunki. Wszystkie należą do liczby drobniejszych

zwierząt w tym rzędzie. Wszystkie żywią się Owadami i Robákami. Niektóre między niemi mają ubarwienie powabnie różno maścisto upstrzone. Mimo to, jch wielką niezgrabną głową, jch ponure smutne oko, jch ciało spłaszczone, jch powolność w poruszeniach: wszystko to przypominając w nich postać *Ropuch* i *Salamander* jest przyczyną, że *Gekony* prawie wszędzie są nienawidzone, i niewinnie o jadowitość posądzane.

Wiérzchnie pokrycie ciała mają podobne jak *Kameleony*. Kształtem żrenic i pazurów przywodzą nam na pamięć rodzaj *Zbików* z gromady *Ssących*. Wszystkie *Gekony* są gadami nocnymi. Pomimo jch powolność, są w łażeniu po náygladszych nawet ciałach aż do podziwienią zręczne. Co większą? Wisząc na dół grzbietem, łażą często w domach po powale. Do téj zręczności w łażeniu dopomagaia jm jch spłaszczone i rozszerzone palce, które pod spodem pokryte są skórą łuskowatą pozmarszczaną. CUVIER nazywá ten rodzaj *Ascalabotes* i dzieli go na cztery następujące oddziały.

a. *Palce całe spłaszczone i rozszerzone, pod spodem w poprzek łuskowato pokryte. Większa liczba palców bez wyraźnych pazurów.* n. p. *Lacerta Mauritanica*. GL.

Ten oddział mieści w sobie dobrze znanych sześć gatunków. CUVIER nazywá je w dziele swoim *Les Geckos Platydictyles*. Gatunek za przykład wymieniony jest náypospolitszym w wszystkich nabrzeżnych kraiach morza Szródziemnego.

b. *Palce całe spłaszczone i rozszerzone: na jch spodzie poprzeczne łuskowate zmarszczki przedzielone rowkiem podłużnym, w którym się pazur ukrywa. Tylko wielki palec bez pazura.* n. p. *Gecko laevis*. DAU.

Tu należy z powyższyć ogólny liczby trzy gatunki, z których dopiero wymieniony znayduie się w Surynam. CUVIER nazywá ten oddział *les Geckos Thecadactyles*.

c. *Palce tylko przy nasadzie rozszerzone; na końcach szczuple. Pazury u wszystkich palców. Na spodzie ogona łuski duże tak rzędami poukładane jak pod brzuchem Węża.* n. p. *Gecko tuberculatus.* DAUD.

Ten oddział zawiera w sobie cztery gatunki, z pomiędzy których tu za przykład położony, mający dwanaście calów długości, żyje na wyspach Malajskich jnaczyéy Sondzkiemi zwanych. Gady tu należące pomieścił CUVIER pod napisem *Les Geckos Hemidactyles*.

d. *Palce przy nasadzie szczuple; na końcach krążkowato rozszerzone. Krążek każdego palca pod spodem przedzielony rowkiem, w którym się pazur ukrywá. Pazury u wszystkich palców wyraźne.* n. p. *Stellio Hasselquisti.* SCHN.

Z pewnością mieścimy tu cztery gatunki. Z tych za wzór podany mieszka w domach ludzkich na porbrzeżach morza szródziemnego, a szczególniéy w okolicach Kairu gdzie go *Abubiurs* (*) nazywają. W tym oddziale zawarte zwierzęta nazywá CUVIER *les Geckos Ptyodactyles*.

Wszystkie prawie *Gekony* mają dość mocny, rechący głos. Wszystkich ogon jest bardzo kruchy;

(*) Wyráz *Abu-Biurs* w języku Kairskim znaczy *Rodzie żółtaczki*; bo tamteysze pospólstwo przypisuje mylnie wyziewom jego początek téy choroby.

lecz gdy się któremu kawałek! jego odkruszy: to mu znowu odrasta, ale na dorosłej części ogona niedostają owych zmarszczkowatych obrączek skóry, o których w cesze rodzajowej była mowa. Ta okoliczność dawniej nie znana, była powodem, że podobnie skaleczale *Gekony* za osobne gatunki poczytywano.

R O D Z Á Y VI. (22.)

PECHERZOWIEC. *ANOLIUS*.

Anolis. Fran. Anolis. albo Blaseneidechse. Niem.

Głowa mierna. Pysk podłużny. Oczy mierne, zwyczajnemi powiekami opatrzone. U podgardla duży, pecherzowaty, zmienno maścisty worek. Zęby w zuchwach jednym rzędem ostro klinowate z brzegami ząbkowanemi. Na podniebieniu dwa rzędy ząbków drobnych. Język mięsisty, niewysuwalny, na końcu wycięty. Ciało wysmukłe, okrągławe, całe skórą ziarnkowato chropowatą pokryte. Ogon przedłużony, u niektórych grzebieniem opatrzone. Grzbiet bez grzebienia. Nogi pięcio palczaste. Palce nierówne, długie, szczupłe: tylko przedostatni członek każdego rozszerzony. Pazury ostre u wszystkich palców.

Nazwisko tego rodzaju wzięte jest od pecherzowatego worka, który postrzegamy pod gardłem u zwierząt tu należących, a który one podług upodobania rozdymać i maść jego zmieniać mogą. Co szczególniej zwykły czynić w namiętnościach gniewu i miłości. *Pecherzowców liczymy ośm gatun-*

ków. Jedne z tych żyją w Ameryce, drugie na wyspach jéy przyległych. Wszystkie łązą wybornie po ciałach gładkich. Żywią się Owadami, Robákami i jagodami roślin. Skóra na jch ciele tak má ziarnkowate łuski jak na *Kameleonach*. Mogą także podobnie zmieniać maści ubarwienia swego. Żebra przybyszowe znáydujemy w nich podobne jak w rodzaju *Kameleona*. Bardzo długi ogon *Pęcherzowców* pokryty jest skórą łuskowatą, która na nim pozmarszczana jest słabo w obrączki. Każdą taką obrączką skóry składá się z kilku rzędów łusek drobnych. *Pęcherzowce* dzielimy na dwa następujące oddziały:

a. *Ogon zupełnie okrągły bez grzebienia.*
n. p. *Lacerta bullaris*. GL.

Do tego oddziału należy pięć gatunków z powyższej liczby.

b. *Na części ogona grzebień błonowy wyraźny, promieniami kościanými podparty.* n. p. *Le grand Anolis à crête*. Cuv.

Ten oddział obéymuie trzy gatunki. Gady do niego należące czynią grzebieniem na ogonie piękny przechód do rodzaju następującego.

Wszystkie *Pęcherzowce* w ogólności należą do liczby drobniejszych Gadów w tym rzędzie: wszakże náywiększy między dotąd znanými nieprzerasta dwanaśtu calów długości. U zwierząt tego rodzaju postrzegamy po raz pierwszy na podniebieniu dwa rzędy drobnych ostrokończystych zębów.



R O D Z Á Y VII. (23.)

L E G W A N. J G U A N A.

Jguane. Fran. Leguan. Niem.

Pysk mierny, tepo kończysty. Głowa mierná, ściśnioná, dużými listkami rogowými pokrytá. Oczy mierne. U podgardla duży ściśniony worek. Zęby w zuchwach jednym rzędem tróyrzaniasto klinowate z szczytem ostrym ząbkowanym. W tyle na podniebieniu dwa rzędy zębów drobnych. Język gruby, mięsisty, na końcu wycięty, nie wysuwalny. Ciało wysmukłe. Na grzbiecie grzebień z niskich w górę sterczących kolców. Ogon okrągły, szczupły, przedłużony. Ciało i ogon pokryte skórą łuskowatą. Nogę pięcio palczaste. Na udach dziurki potowe rzędem poustawiane. Palce szczupłe, nierówne, wszystkie pazurami uzbroione. Palec skrajny u nóg tylnych odsunięty od jnych. n. p. Jguana tuberculata. LAUR.

Do tego rodzaju liczymy z pewnością pięć gatunków. Z tych iedne żyją w Ameryce południowej i na wyspach jęj przyległych, drugie w Indiach wschodnich. Wszystkie są dość powabnie ubarwione. Biegają po ziemi szybko i zwinnie. Włażą na drzewa i na skały bardzo zręcznie. Pływają dość dobrze. Żywią się Owadami, Robákami, miękkimi owocami drzew, jagodami i liśćmi niektórych roślin. Mięso mają wyborne, ale dla wenerycznych bardzo nie zdrowe; gdyż po zjedzeniu jego, choroba się jm odnawia. Dorastają dość znaczney wielkości: i tak gatunek za przykład wymieniony, który żyje prawie w wszystkich krajach pod strelą gorącą w Ameryce, miéwa po cztery i po pięć stóp długości. Żaden *Legwan* nie umie zmieniać

maści ubarwienia swego. Jch żebra przybyszowe są zwyczajnego kształtu, i nie łączą się z sobą w łuki pod brzuchem. Jch samice składają swe jaja na piasku w dość znaczney liczbie. Jaja niektórych wyrównywiają w wielkości jajom Gołębia, są prawie zupełnie bez białka, a mają smak wyborny.

R O D Z Á Y VIII. (24.)

M A R M Ó R K A. P O L Y C H R U S.

Marbré. *Fran.* Marmoreidechse. *Niem.*

Pysk miernie długi, tępo klinowaty. Głowa mierną, dużemi listkami rogowemi pokrytą, lekko ściśnioną. Oczy duże. Otwory nosdrzy i otwory słuchowe okrągłe. Pod gardłem skóra miernie owisła, rozdymalna. Żeby w zuchwach jednym rzędem małe, klinowate. Na podniebieniu dwa rzędy zębów drobnych. Język gruby, mięsisty, na końcu wycięty, w pół wysuwalny. Ciało wysmukłe, pokryte łuskami drobnymi. Grzbiet i ogon bez grzebienia. Ogon szczupły, bardzo przedłużony. Nogi pięcio palczaste. Na każdym udzie rząd dziurek potowych. Palce szczupłe, nierówne, pazurami uzbrojone. Palec skrajny u nóg tylnych od jnnych odsunięty. n. p. Lacerta marmorata. GL.

CUVIER liczy do tego rodzaju tylko ten jeden gatunek, który się znayduje w Guianie; lecz LESKE twierdzi, że posiada w zbiorze swoim tak różniące się sześć sztuk *Marmórek*, iż te za osobne gatunki poczytać wypada. *Marmórki* należą do liczby pomniejszych zwierząt w tym rzędzie. Za życia zmieniają one dowolnie maść ubarwienia swego podobnie jak *Kameleony*. Zgodnie z tém usposobieniem

znaydujemy w nich płuca bardzo wielkie, na kilka oddziałów podzielone, a żebra przybyszowe tak w łuki pod brzuchem połączone jak w *Kameleonach* i w *Pęcherzowcach*: czém te trzy rodzaje czynią ważny wyjątek. Ogon *Marmórek* jest kilka razy dłuższy niż ciało. O ich obyczajach nic pewnego nie wiemy.

R O D Z Á Y IX. (25.)

A M E I W A. A M E I V A.

*Ameiva. Fran. Marmel. albo Mermelei-
d'echse. Niem.*

Pysk miernie długi, czworo kątno ostro słupny, kończysty. Głowa mierna, nieznacznie w pysk przechodząca, cała dużemi listkami rogowemi pokryta. Oczy mierne. Uszy słuchowe duże. Podgardle nie workowate i nie rozdymalne, bez kołnierza z łusek. Zęby w zuchwach jednym rzędem kończyste. Podniebienie bez zębów. Język chrząstkowaty, szczupły, długi, wysuwalny, na końcu rozdwojony. Ciało wysmukłe, całe pokryte skórą łuskowatą. Ogon przedłużony. Nogi pięcio palczaste. Palce szczupłe, nie równe, pazurami uzbroione: palec skrajny u nóg tylnych od jnnych usunięty. n. p. Lacerta Ameiva. GL.

Pięć gatunków składaia ten rodzaj. Wszystkie mieszkają w Ameryce i na wyspach jęj przyległych. Na pierwszy rzut oka mają one wiele podobieństwa z Jaszczurkami właściwemi; kończystością jednakże pyska i niedostatkiem kołnierza z łusek pod gardłem są dostatecznie rozróżnione. Ameiwy nie mo-

gą na sobie zmieniać maści ubarwień. Jch żebra przybyszowe są zwyczajnego kształtu, i nie łączą się w łuki pod brzuchem. Jch płuca mają pomierną wielkość. Náywiększe z dotąd znanych *Ameiw* nie przerastaiają dwóch stóp długości. Wszystkie żywią się Owadami i Robákami, i są dość łagodne, a w biegu po ziemi szybkie i zwinne. Podobnie jak w wszystkich następnych rodzajach, nie mają na grzbiecie grzebienia.

R O D Z Á Y X. (26.)

J A S Z C Z U R K A. L A C E R T A.

Lézard. *Fran.* Eidechse. *Niem.*

Pysk mierny, tępy. Głowa mierna, dużemi listkami rogowemi pokryta, nad oczami rozszerzoną. Oczy mierne. Otwory słuchowe wyraźne. Podgardle nie workowate, kołnierzem czyli rzędem dużych odstających łusek ozdobione. Zęby w zuchwach jednym rzędem kończyste. Na podniebieniu dwa rzędy zębów drobnych. Język chrząstkowaty, szczupły, długi, wysuwalny, na końcu rozdwojony. Ciało wysmukłe, miernie długie, skórą łuskowatą pokryte. Ogon długi. Nogi pięć palczaste. Na udzie rząd dziurek potowych. Palce szczupłe nie równe, pazurami uzbroione. n. p. Lacerta ocellata. DAU.

Liczymy teraz przeszło trzynąście gatunków takich Gadów, które się wyłącznie *Jaszczurkami* nazywać powinny, a z których większa połowa zamieszkuje Europę. Wszystkie te dostatecznie rozróżnione gatunki zmieszane były w systemacie LINNEUSZA, i stanowiły jeden tylko gatunek pod nazwiskiem

Lacerta agilis. Przyzwoitém rozgatunkowaniem *Jaszczurek* uczynił DAUDIN (*) ważną przysługę w Zoologii.

Jaszczurki zamieszkują pospolicie miejsca ciemne; jakeimi są: gęste krzaki i zarośla, kupy kamieni, mury spustoszone i rozpadłości skał. Wśród największych upałów lata, lubią się grzać na słońcu. Biegają po ziemi szybko i zwinnie. Na drzewa nie wylazają, chyba że są bardzo pochyłe. W wodzie się nie nurzają. Żywią się najwięcej Owadami i Robakami. Zimą spędzają w śnie letargicznym w norach podziemnych. Niektóre pomiędzy niemi przyozdobione są bardzo powabnym ubarwieniem; lecz żadna maści ubarwienia swego dowolnie zmieniać nie może. Wszystkie należą do drobniejszych jstót w tym rzędzie. Są zwierzętami łagodnymi i niewinnymi: wszystkie więc powieści które krążą między pospółstwem o mściwości i jadowitości *Jaszczurek*, odnieść potrzeba do zbioru baśni urojonych. Świeże surowe mięso *Jaszczurek* zachwalane jest od niektórych dawniejszych pisarzy jako lekarstwo dla ludzi bardzo wenerycznych.

R O D Z Á Y XI. (27.)

E L A D A. S C I N C U S.

Scinque. *Fran.* Scinkeidechse. *Niem.*

Pysk mierny, klinowato spłaszczony. Głowa nieznacznie w ciato przechodzi. Oczy bardzo małe.

(*) Patrz dzieło jego: *Histoire Naturelle des Reptiles. etc.* Paris. 1802 i 1803, in 8vo. Ośm Tomów.

Otwory słuchowe wyraźne. Zeby w'zuchwach drobne; gęste jednym rzędem. Na podniebieniu dwa rzędy zębów bardzo drobnych. Język mięsisty, gruby, nie wysuwalny, na końcu wycięty. Podgardle bez worka i bez kołnierza. Ciało wysmukłe, przedłużone, nieznacznie w ogon przechodzi. Ogon albo mierny, albo długi. Od końca pyska aż do końca ogona całe ciało i nogi pokryte dużemi okrągławemi łuskami. Nogi krótkie, na boki rozsunione, pięcio palczaste. Palce mniey więcéy nie równe, szupłe, pazurami małemi zakończone. n. p. *Scincus officinalis*. SCHN.

Rodzaj *Elady* jest w tym rzędzie pewnie jeden z náybogatszych w gatunki; lecz zbyt ubogie, a po większey części tak dwóyznaczne opisy w dawniejszych dziełach, że jeden i ten sám opis z łatwością do wielu przedmiotów zastosować można: są przy czyną, że dotąd ledwie sześć gatunków zostało przy zwoicie rozróżnionych. Wszystkie żyją w ciepłych krajach trzech dawniey znanych części świata. Przebywają w okolicach piąsczystych. Przestraszone zagrzebują się w piasku z szybkością podziwienią godną; chód jednakże mają powolny, czołgający się. Według twierdzenia niektórych Pisarzów, *Elady* pływają i nurzają się dość zręcznie. Dawniey stanowiły one dość ważny przedmiot w sztuce lékarskiej, gdyż suszone zapisywano osłabionym za szrodek podniecający lubieżność (*remedium aphrodisiacum*); lecz w naszych czasach utraciły zupełnie tę niezasłużoną zaletę: i to tém słuszniéy; ponieważ się dawni Lékarze w opisach gatunku náyskuteczniejszego nie zgadzaia.

Gatunek za przykład podany, jest náypospolitszy. Arabcy nazywają go *El-Adda*. To jego Arabskie nazwisko (z małą odmianą) osądziłem za náystósowniejsze nazwisko w języku naszym dla całego rodzaju.

J A S G Z U R O W ą Ż. C H A L C I D E S.

Chalcide. *Fran.* Wurmeidechse. *albo* Gisteidechse
albo Schlangeneidechse. *Niem.*

Pysk mierny, tępy. Głowa mierną, od ciała nie odznaczoną. Oczy mierne. Zęby w zuchwaczkach drobne jednym rzędem. Na podniebieniu zęby drobne dwiema rzędami. Język mięsisty, gruby, w pół wysuwalny, na końcu wycięty. Ciało szczupłe, wysmukłe bardzo przedłużone, nieznacznie w ogon przechodzi. Ogon długi. Nogi cztery bardzo małe: tylne od przednich daleko odsunięte. Liczba palców różna w różnych gatunkach. Pazury u palców kończyste.

Zwierzęta tego rodzaju stanowią pierwszy krok przechodowy z rzędu *Jaszczurek* do rzędu *Węzów*. Jakoż na pierwszy rzut oka każdy poczyta je raczej za Węże czworonożne, niż za istoty do tego rzędu należące; bo ciało ich do tego stopnia jest zeschuplone, przedłużone i tak nieznacznie w ogon przechodzące, że odciawszy im ich bardzo małe nożki: nie pozostanie im nic w zewnętrznej postaci ciała, czémby się od Węzów różnić mogły.

Gady tego rodzaju są mieszkańcami ciepłych krajów. Każdą prawie część świata ma między siebie właściwe gatunki; lecz dotąd należą one w zbiorach Zoologicznych pomiędzy nąyrzadsze przedmioty. Tegocześni Badacze dzielą je na dwa następujące podrodzaje:

a. N I B Y W ą Ż. S E P S.

Seps. Fran.

Na całym ciele łuski duże, końcami na siebie zastające podobnie jak w rodzaju Elady. Otworki słuchowe wyraźne.

Do tego podrodzaju liczymy pięć gatunków. — Między temi *Angvis quadrupes*. LINN. czyli *Lacerta serpens*. GL. ma u każdéj nogi po pięć palców. — *Lacerta tetradactyla*. LACÉP. liczy u każdéj nogi po cztery palce. — *Lacerta Chalcides*. LINN. má u każdéj nogi po trzy palce. — Nakoniec *Lacerta angvina*. GL. i *Lacerta monodactyla*. LACÉP. okazują u każdéj nogi tylko po jednym palcu.

b. J A S C Z U R O W ą ż. C H A L C I D E S.


Chalcide. Fran.

Na całém ciele skóra łuskowatá. Otwory słuchowe żadne.

W tym podrodzaju mieścimy trzy gatunki. Po między temi gatunek *Chamaesaura abdominalis*. SCHN. má u każdéj nogi po pięć palców. Gatunek *Chamaesaura Cophias*. SCHN. liczy u każdéj nogi po trzy palce. Wreszcie *Chalcide monodactyle*. DAU. má u każdéj nogi tylko po jednym palcu.

Podług powyższego wykazu, rodzaj ten mieści w sobie ogółem ośm gatunków. Wszystkie są po-sądżane o wysoki stopień jadowitości, który szczególnie przeciw Bydłu wywierać zwykły. Przebywając albowiem na pastwiskach i na łąkach wilgotnych w trawie, kasaia pasące się Bydło i Konie po gębach. Ukąszenie jch má sprawić wielkie zapu-chnięcie głowy Bydłęcia, które go niekiedy i o życie przyprowadzić. Czy to podanie jest jstotne? za tém zaręczyć nie można.

Na tém kończymy uwagi nad pokrewieństwem czworonożnych Gadów Jaszczurkowatych.



Tablica IX. (106.)

P O K R E W I E Ń S T W O (VI.)

D W U N O Ż N E. *B I P E D E S.*

Jaszczurki okrągłogoniaste, wolnojęzykie, mające ciało szczupłe, długie, tylko dwiema małemi nożkami opatrzone.

	RODZAJE.	GENERA.
N o ż y	blizko otworu odchodowego 1. Tylonóg.	<i>Bipes.</i>
	blizko głowy 2. Przodonóg.	<i>Chirotes.</i>

UWĄGI DO TABLICY IX. (106.)

W zwierzętach tego pokrewieństwa mamy náypiękniejszy dowód stopniowego przechodu między dziełami Przyrodzenia z jednego kształtu w drugi. Gdyby nie dwie bardzo małe nożki, cała ich postać zewnętrzna jest postacią Wężów; a ta była przyczyną, że je wiekopomny Badacz LINNEUSZ w rodzaju *Anguis* pomieścił. Obecność jednakże jakkolwiek małych, lecz wyraźnych dwóch nóg, była w nich zbyt uderzającą, ażeby w tymże rodzaju na zawsze pozostać mogły. Z tego powodu GMELIN przeniósł je do rodzaju *Lacerta*. Późniéy SCHNEIDER zebrawszy zwierzęta, które my w tém pokrewieństwie mieścimy, i dodawszy do nich te, o których w ostatnim rodzaju poprzedzającego pokrewieństwa była mowa: utworzył z nich osobny, zupełnie nowy

rodzáy pod nazwiskiem *Chamaesaura*. Nakoniec nowsi bezstronni Systematycy biorąc rzeczy ściśle, widzieli się zniewolonymi nie tylko do utworzenia z tych Gadów trzech odrębnych rodzajów, ale nadto do rozdzielenia jch pomiędzy dwa osobne pokrewieństwa. Jeżeli porównamy uwagi nad ostatnim rodzajem pokrewieństwa poprzedzającego, z uwagami nad dwiema tu następującemi rodzajami: zdaie się, że powód takiego rozdrobnienia przyzwoicie usprawiedliwionym zostanie.

Wszystkie zwierzęta tego pokrewieństwa nie mają widocznych otworów słuchowych. Wszystkie mają chód podobnie pełzający jak Węże; gdyż bardzo małe jch nogi, nie wiele jm czynią przysługi. Żywią się one náywięcéy Owadami i Robakami; a mianowicie Dżdżownikami.

RODZÁY I. (29.)

TYŁONÓG. BIPES.

Bipide. *Fran.*

Pysk krótki. Głowa mała, od ciała nieodznaczona. Zęby w zuchwach drobne jednym rzędem. Na podniebieniu zęby dwiema rzędami. Język mięsisty, niewysuwalny, na końcu wycięty. Ciało szczupłe, okrągłe, bardzo przedłużone, nieznacznie w ogon przechodzące. Od końca pyska aż do końca ogona łuski końcami na siebie zastające. Nogi tylko dwie krótkie, blisko otworu odchodowego, bez palców wyraźnych.

Wiemy dotąd o trzech następujących gatunkach Tyłonogów.

1. Tyłonóg tróypalczasty. *Bipes tridactylus*.

Lacerta apus. GL. mieszkający w okolicach nad rzeką Wołgą, ma u każdéj nogi po trzy sęczki, które są szczytkami palców. Ogon jego równa się długości ciała. Oczy ma małe. U tamtejszych mieszkańców ma być znany pod nazwiskiem *Sietłopuzik*. —

2. Tyłonóg Amerykański. *Bipes Americanus*.

Lacerta bipes. GL. mieszka w tak nazwanym Czarnym Lesie w Ameryce południowéj. Oczy jego są małe, nogi zakończone krążkami, ogon krótszy niż ciało.

3. Tyłonóg długoogoniasty. *Bipes macrourus*.

Le Bipède lépidopode. LACÉP. mieszka w Nowéj Hollandyi na miejscach bagnistych. Oczy ma wielkie, ogon dwa razy dłuższy niż ciało, nogi zakończone dwiema sęczkami, a przy otworze odchodowym dwa rzędy dziurek potowych, które pod kątem są rozłożone.

Wszystkie te trzy gatunki nie mające zewnątrz ani śladu nóg przednich, mają jednakże pod skórą wyraźne łopatki i kości obojczykowe. Ich płuca są parzyste jak w wszystkich poprzedzających tego rzędu. Ich obyczaje są nam nie wiadome.

R O D Z Á Y II. (30.)

PRZODONOG. *CHIROTES*.Bimane. *Fran.*

*Pysk krótki, tępy. Głowa mała, od ciała nieodznaczona, listkami rogowymi pokryta. Oczy bardzo małe bez powiek. Zęby w zuchwach drobne. Język mięsisty, niewysuwalny, dwiema sęczkami rogowymi zakończony. Ciało okrągłe, szczupłe, bardzo przedłużone, nieznacznie w ogon przechodzące, skórą tuskowatą w pętobrecze odznaczoną pokryte. Końce pętobraczek wierzchnich miaią się na bokach na przemian z końcami spodnich. Nog^{gi} tylko dwie, czteropalczaste, bardzo krótkie, blisko głowy umieszczone. Palce pazurami łukowatymi zakończone. Przy otworze odchodowym dwa rzędy dziurek potowych. n. p. *Lacerta lumbricoides*. SHA.*

Znamy tylko jeden gatunek, który dorasta dzieściu cali długości przy grubości małego palca. Żyje on w Ameryce w okolicach Mexiku. Żywi się Owadami i Robakami. Nogi jego mają po cztery wyraźne palce i sęczek zamiast palca piątego. Przy rozczłonkowaniu znáydujemy w nim kości oboyczkowe, łopatki i kości mostku podobne jak w innych tego rzędu; lecz kości czaski i reszta kościostępu mają zupełnie taką budowę jak w rzędzie Wężów. Nadto ich płuca są pojedyncze, czyli składają się tylko z jednego dużego worka błonowego jak w większej liczbie Gadów rzędu następującego. Słowem, ten rodzaj daie náypiękniejszy przechód do rzędu następującego.

Na tém kończymy uwagi nad rzędem Gadów znanych pod ogólném nazwiskiem Jaszczurek.

Tablica X. (107.)

R Z Ę D T R Z E C I. (29.)

W Ę Ż Ł E. S E R P E N T E S.

Gady bez nóg i bez pletw: mające ciało okrągławe, wysmukłe, bardzo przedłużone, nieznacznie w ogos przechodzące: szczęki uzbroione zębami.

		POKREWIEŃSTWA.	FAMILIAE.
i n s k i	na spodzie ciała większe niż na wierzchu	1. Nierównoluskie.	<i>Heterodermes.</i>
	na całém ciele jednkie, drobne	2. Równoluskie.	<i>Homodermes.</i>
	żadne, tylko skóra gładką lub obrączkowatą	3. Nagie	<i>Esquamati.</i>

UWĄGI DO TABLICY X. (107.)

Gady tego rzędu, które pod ogólném nazwiskiem *Węzów* są znane, nie mają ani nóg, ani pletw; są przeto zniewolone do przenoszenia się z miejsca na miejsce jedynie za pomocą czołgania czyli pelzania: a tém samém zasługują szczególniey na to nazwisko, które w języku łacińskim cały tén gromadzie nadano. Lubo te zwierzęta (jak się już powiedziało) pozbawione są wszelkich członków zewnętrznych czyli narzędzi do ruchu: mimo to, ich szybkość z jaką się posuwają po ziemi, ich zgrabność

bność z jaką się wsuwaia na skały i na naygładsze nawet drzewa, jch zwinność z jaką niektóre pływają po wodzie: wszystko to wzbudza w widzu mimowolne a słusne podziwienie; gdyż dowodzi niepospolitą siłę muszkułów w jch ciele.

Podług zewnętrznego pokrycia ciała, dzielimy zwierzęta rzędu tego naprzód na trzy pokrewieństwa, jak nam to dopiero odczytana tablica okazuje.

Do *pięrszego* jch pokrewieństwa policzyliśmy takie, u których na wierzchu ciała postrzegamy drobne, mniéj więcéj w skórę wrosłe łuski; a na spodzie czyli pod brzuchem i pod ogonem łuski długie a wąskie. Te duże na spodzie jch ciała będące łuski z przyczyny jch kształtu, dla krótszego wysłowienia i dla zgodności w wyrażeniach z jnnymi Naturalistami nazywać będziemy *Listwami* (scutum) gdy leżą tylko jednym rzędem; a *Listewkami* (scutellum) gdy się znaydą dwiema rzędami ułożone. —

Do *drugiego* pokrewieństwa należą takie, których całe ciało pokryte jest jednostaynie drobnymi łuskami.

Na koniec *trzecie* pokrewieństwo składają takie, których ciało przyodziane jest skórą nagą. Między temi jednakże zachodzi ta różnica, że na jednych skóra jest zupełnie gładką; a na drugich obrączkowato pozmarszczaną; a że każda taka obrączka jch skóry podzielona jest płytkiemi rowkami na małe czworokąty: z tąd ostatnie na pierwszy rzut oka tak się wydają, jak gdyby czworokątnymi w obrączki poukładanymi łuskami pokryte były.

Jakkolwiek różne jest jch pokrycie, tak z drugiey strony mają one między sobą bardzo wiele podo-

bieństwa w postaci ciała; a w wewnętrznej budowie swojej tyle mają różnic, że nie tylko od wszystkich jennych gromad zwierząt grzbietnych, ale nawet i o wszystkich zwierząt tej gromady dostatecznie są odznaczone. Zastanówmy się więc bliżej nad budową ich ciała.

Wszystkie nie mają zewnątrz widocznych otworów słuchowych; a otwór ich oddechowy na spodzie ciała w poprzek umieszczony, odznacza właściwe ich ciało od ogona.

Oprócz dwóch rodzajów (*Padalca* i *Samotuska*) wszystkie inne nie mają w szkielecie ani obojczyków, ani mostka, ani łopatek, ani miednicy. W wszystkich znaydujemy bardzo wielką liczbę żeber, które końcami tak daleko na spód ciała sięgają, że je tylko wązkie muszkuł *prosty* przedziela.

U wszystkich jennych zwierząt grzbietnych, któreśmy dotąd poznali, szczęki składają się z sześciu osobnych kości; a mianowicie: z dwóch *zuchw górnych*, które są przyrośnięte do boków czaszki, a które na przodzie łączą się z sobą za pomocą dwóch kości, które od ich położenia nazywamy *kośćmi międzyzuchwowymi* (os intermaxillare). Te cztery kości mocno z sobą i z czaszką spoione, stanowią wierzchnią nieruchomą szczękę. Spodnią zaś ruchomą szczękę składa się z dwóch kości, które przedniemi końcami z sobą zrosłe tworzą brodę, tylniemi zaś opierają się o wyrosty czaszki, i tak do niej za pomocą muszkułów i ścięgn są przytwierdzone, że cała ta szczeka (nie mogąc zmieniać kształtu swego) może się dowolnie poruszać w pewnym kierunku.

Przeciwnie u większej liczby zwierząt *Węzowatych* znaydujemy szczęki zupełnie jnaczyj zbudowane. Rzecz ta jest godną bliższej uwagi naszej.

Szczęki większą liczbę zwierząt tego rzędu złożone są z *dziwięciu* osobnych ruchomych kości; a te są następujące:

a. Dwie *dolne* *zuchwy*, które jak zwykle stanowią szczękę *spodnią*; lecz które tu na przodzie są z sobą tylko związane za pomocą *muszkułów ścięgnowatych*.

b. Do tylnych końców *zuchw dolnych* dotykają się końcami *dwie kości przybyszowe*, które przy zamkniętym *pascy* mają do nich położenie prawie pionowe, i dla tego nazywać je będziemy *kościami pionowymi*.

c. Dwie drugie *kości przybyszowe* zawieszone poziomo po bokach tyłu głowy, stykają się tylnymi końcami swymi z końcami *wierzchniemi* *kości pionowych*; przednie zaś ich końce opierają się o *kości słuchowe* zwane *skatami*. Te dwie *kości przybyszowe* (stósownie do ich położenia) zowiemy *kościami poziomymi*.

d. Dwie *zuchwy górne*, które wisząc po bokach czaszki po niższym *kości poziomym*, opierają się szrodkami swymi o przedłużenia *kości skroniowych*, a tylnymi końcami o stronę przyszrodkową *kości pionowych*. *Zuchwy* przeto *górne* są między temi *kościami* najdłuższe, i sięgają tylnymi końcami swymi daleko za tył czaszki.

e. Nakoniec, *dziwiątą kością* w ich szczękach jest pojedynczą *kość międzyzuchwową*, która łączy przednie końce *zuchw górnych*.

Te *dziwięć kości*, które składają (jak się dopiero okazało) ich *szczęki*, są wszystkie *ruchome* i tak z sobą za pomocą *ścięgnowatych muszkułów*

połączone, że paszcz jch może prawie zupełnie kołysty przybrać otwór. Poznawszy takie urządzenie w jch pysku, nie mamy już przyczyny dziwienia się, że Gady tego rzędu mogą wygodnie połykać takie zwierzęta, które od nich znacznie są grubsze. — Cięższą są nawet i takie między niemi, których każda górna zuchwa przedzieloną jest jeszcze na dwie osobne kości; a przeto których szczęki składają z *jedną* oddzielnych kości. Takiemi są wszystkie *dwuzębne* jadowite gatunki, które wkrótce poznamy.

Są jednakże i takie rodzaje w tym rzędzie, których zwierzęta mając szczęki tylko z *pięciu* przywoicie przytwierdzonych kości złożone, nie mogą tak paszczy swojej rozszerzać. Liczba takich jest bardzo mała.

Wszystkie mają zuchwy uzbroione zębami; a większą jch liczba má także i na podniebieniu po dwa rzędy zębów. Ostatnie mają więc w paszczy sześcioma rzędami zęby ustawione. Zęby jch są po policie ostro kończyste i w tył pozginane.

W niektórych rodzajach tego rzędu znajdziemy poraż pierwszy zęby jadowite. O tych w swoim miejscu obszerniej mówić nie zaniedbamy.

U jednych znajdziemy język krótki, gruby, mięsisty, nie wysuwalny; drugie przeciwnie okazują bardzo długi, szczupły, chrząstkowaty, na końcu rozdwojony, i daleko z pyska wysuwalny. Ostatnie mają w paszczy na środku szczęki spódni osobny gatunek pochwy, do której w czasie spoczynku język swój chowają. Ten jch czarniawy wysuwalny język poczytuie pospólstwo za żądło, czyli za narzędzie, którym te zwierzęta jadowite rany zadają. To mniemanie jest zupełnie mylne; gdyż naprzód język

ten jest za wietki, ażeby nim ukłuć mogły; a powtóre Gady kalęczą ukąszeniem a nie ukłuciem.

Wszystkie nie mają błony podpiersiowéj: u wszystkich więc wnętrzości znaydują się w jednéj kłatce brzuchowéj. Płuca w nich możnaby nazwać nie parzystemi, bo jeden jch worek jest pospolicie bardzo duży, a drugi tak mały, że go w ostatnich rodzajach tego rzędu zaledwie dostrzedz można. Podobny stosunek zachodzi między jch uszkami sercowemi; a to było powodem do mylnego mniemania, że Węże mają serce tylko o jedném uszku i o jednéj komórce. Wierniejsze postrzeżenia anatomiczne przekonały dostatecznie, że serce w Gadach tego rzędu má jednę komórkę i dwa uszka; lecz jedno z tych uszek jest u nich znacznie większe niż drugie, a przedział między niemi nie bardzo odznaczony. Serce znaydujemy w nich daleko od głowy odsunione a do żołądka zbliżone.

Wątrobę mają wielką w kształcie dwóch długich wąskich listew, które leżą na bokach żołądka i trzewiów. Jch trzewia są proste i krótkie, a żołądek prawie niczem od nich nie odznaczony. Jeżeli słuszném było zastanowienie się nasze nad mocą żołądka w zwierzętach *Drapieżnych Ssących*, że mogą kości przyzwócić strawić: nierównie słuszniéj dziwić się potrzeba Gadom tego rzędu, że w tak krótkich, prostych i cienkich wnętrzościach mogą mieć tyle siły, że nie tylko kości, ale nawet rogi i włosy połkniętych zwierząt doskonale strawią. Wszystkie żywią się ciałami zwierzęcemi; a zdobycz całą naraz polykają. Wszystkie oddają bardzo mało gnoiu; a ten składa się z samych prawie wapiennoziemnych części.

Nérki jch mają kształt podobnie listwowaty jak wątroba. Podobnie jak w dwóch poprzedzających

rzędach cynadry samców tego rzędu umieszczone są w brzuchu blisko nerek. Ta jednakże zachodzi tu różnica, że cynadry w Wężach bywają pospolicie nie równé wielkości. Wszystkie samce tego rzędu mają po dwa członki płodne, które chowają w osobnych pochwach pod skórą na spodzie ogona. Członki te są walcowate, na wierzchu rynienkowato wydrążone końcami naprzód zwrócone, a w czasie obojętności zewnątrz nie widoczne. Natężone wysuwają się naprzód otworem kanału odchodowego, przez który pod czas jch pârzenia się płynie od cynader nasienie do jch rynienek; a po tych wchodzi w łono samicy. Podobne urządzenie części płodnych samców znaydziemy późniéj w gromadzie *Skorupiaków*.

W samicach Węzów znaydujemy jáynik pojedynczy; a ten będąc oraz jajowodem ciągnie się wzdłuż klátki brzuchowéj. Jaja zapłodnione w jch łonie, wychodzą z nich razem tak z sobą końcami połączone, że na piérwszy rzut oka podobne są paciorkom na nitkę nawdzianém. Liczba jch różna jest w różnych gatunkach. Wszystkich są one podługne i pokryte dość tęgą skórzaną łupiną.

Czas wylęgania się młodych z jch jáy jest różny w różnych gatunkach. Jednych jaja muszą po znieśieniu przez znaczny przeciąg czasu doyréwać w ciepłe słońca. Drugie zaś gatunki niosą tak doyrále jaja, iż te zaraz po wyściu z łona samicy pękają, i młode na świat wydaia. Ztąd poszło mniemanie, że niektóre gatunki tego rzędu rodzą dzieci żywe: co szczególniéj uważano na *Zmiiach* europejskich. Ta okoliczność zniewała nás do małego zboczenia od przedmiotu dla wyjaśnienia tego punktu: »jakie »to zwierzęta powinny nosić wyłącznie nazwisko »żyworodnych?»

Wszyscy prawie Badacze zgodzili się na to, że te tylko zwierzęta powinny się wyłącznie nazywać *żyworodnemi*, między którymi (po spärzeniu się) zawiązany płód w samicy w takim związku z łonem jęj aż do zupełnego ukształcenia się zostaje, że krew krążąca w żyłach matki, krąży także i w żyłach jego. Między dotąd znanemi zwierzętami, jedne tylko *Ssące* odpowiadają temu warunkowi. Wszakże tylko w jch samicach poczęte dzieci (od poczęcia się jch aż do wyścia na świat) tak są *kanatem pępkowym* (umbilicus) przytwierdzone do łona swych matek, że przez tenże kanał krew z arteryy matczynych wchodzi ustawicznie do dziecka; a obiegłszy po jego żyłach, wraca nim znowu do żył matczynych dla odświeżenia się w jęj płucach. Z téj przyczyny jedne tylko zwierzęta *Ssące* zasługują wyłącznie na nazwisko *żyworodnych*.

Wszystkich jnnych zwierząt zapłodnione jajo w łonie samicy, oddziela się zaraz od jęj naczyń krwistych, przechodzi do jajowoda, i staie się od téj chwili odrębnem i (że tak powiem) obcém ciałem w jęj ciele. Rośnie ono prawda jeszcze w nięj przez mnięj więcéy długi przeciąg czasu, i przyodziewa się stopniami (stósownie do gatunku) w coraż mocniejszą powłokę; lecz to rośnienie, to ukształcanie się jaja w samicy po zapłodnieniu jego, potrzeba uważać jedynie za skutki rozwijania się w niem zawartego nasienia. Łono bowiem samicy (między takiemi zwierzętami) dostarcza jaju tylko przyzwoitego ciepła i takich wilgoci, które jedynie na zewnętrzne ukształcenie jego wpływ mieć mogą; bo całe otoczone jest błoną jednostayną. Wszakże jaja większey liczby *Ryb* i *Płazów*, które zostają zapłodnione zewnątrz ciała samic, rosną po wyścia z samicy jeszcze przez znaczny przeciąg czasu pływając samopas po wodzie: a przecież te nie mają już żadnego związku z ciałem tych samic, które je

z siebie wypuściły. — Jeżeli więc w tym sposobie odosobnione jajo w wnętrznościach której samicy tak długo pozostaje, że się nie tylko samo, ale nawet i zawiązany w niem płód do tego stopnia ukształcić może, że toż jajo zaraz po wyjściu z samicy pęka, i żywe dziecko na świat wydaie: jajo takie uważać potrzeba za jajo w wnętrznościach samicy wysiedziane; a samice takie raczy za wewnętrznie wysiadujące swe jaja niż za żyworodne poczytać należy. — Ten to właśnie jest przypadek z niektórymi zwierzętami do rzędu Węzów policzonymi, o których wiemy, że żywe dzieci na świat wydaia; dla tego też mówiąc o nich, nie będziemy używać wyrazu *rodzą* lecz *wydaia*.

Dzieci wszystkich do tego rzędu należących zwierząt, legną się z jay zupełnie podobne rodzicom swoim: nieodbywają więc w młodości żadnych przemian. W jednym tylko rodzaju *Nagoscóra*, jako nąymniy znanego, pierwszy wiek dzieci zostaje jeszcze dla nas w niepewności.

Wszystkie zwierzęta znane pod ogólnym nazwiskiem *Węzów*, mają na ciele skórę obcisłą i wszędzie do ciała przystającą. Wszystkie *lenia się* co rocznie pod czas wiosny po odbytem pârzeniu się; czyli zrzucają z siebie całą skórę. Skóra ta *wylenia* zwaną, jest bardzo cienką i prawie przezroczystą, a schodzi z nich tak w całości, że w niektórych nawet błonki z powierzchni oczów są zachowane. Wyleni przypisywano dawniay cudowne skutki; lecz (jak się domysleć można) ta jey okrzyczaná skuteczność była daleką od sprawdzania się.

Po tych ogólnych uwagach nad całym rzędem, nim przystąpimy do bliższych zastanowień się nad pokrewieństwami i jch rodzajami: sądzimy za rzecz potrzebną uprzedzić Łaskawych Czytelników, ażeby

się może nad znaczną liczbą rodzajów rzędu tego nieunieśli, i nowszego systematu przedwcześnie potępiać niechcieli. Wszakże dla tém widoczniejszego wykazania potrzeby utworzenia tu większej liczby rodzajów, niż jch w dawniejszych systematach znaydujemy, przyymuiemy umyślnie za *piérwszą* zasadę, do podziału zwierząt tu należących też samą cechę, co LINNEUSZ; a tą jest *jakość pokrycia jch spodu ciała*. Jakość zębów i uderzające różnice w kształcie jch ciała, są u nas cechami drugiego rzędu; a przecież te nie mniéy są ważne od piérwszych. To prawda, że w dziełach LINNEUSZA wszystkie Gady tego rzędu podzielone są tylko na *sześć* rodzajów; lecz to nie Jego, ale wieku, w którym żył, jest winą; bo za Jego czasów mała tylko liczba tych zwierząt znana była Naturalistom Europejskim. Przyydzie może czas, że i ten teraz na pozór tak rozdrobiony podział, jeszcze za zbyt ogólny poczytanym zostanie, i że dla nowych odkryć, nowe rodzaje będą musieli utworzyć.

POKREWIEŃSTWO I. (?) NIERÓWNOŁUSKIE. HETERODERMES.

Węże mające wieńców ciała pokryty drobniemi łuskami, a spód listwami: żuchwy rozsuwalne; język szczupły, długi, wysuwający.


L i s t w y r o g o w e		Rodzaje.		Genera.	
dwieście rzędami pod całym ogonem; ogon	jednym rzędem pod osadą ogona, a pod końcem	pecherzykami nakaził pająków	1. Grzechotnik.	Crotalus.	
okrągły; żęby jadowite	listwy dwiema rzędami; żęby jadowite	bez pecherzyków; wyraźne	2. Korhacz.	Scytale.	
żądne; grzbiet	okrągły; otwór odchodowy	dwa odosobnione	3. Jadowiec.	Pseudoboa.	
żądne; ciało	dłaskowały z przyczyny większych łusek	dwa przy licznych	4. Poloz.	Boa.	
przy głowie mocno rozszerzone i splecione	z dwiema szponami	dwa przy licznych	5. Proca.	Erix.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	6. Mackowąż.	Erpeton.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	7. Jelonos.	Langaia.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	8. Szponogon.	Acanthophtis.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	9. Trytyrzed.	Trimeresurus.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	10. Huria.	Huria.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	11. Polozowąż.	Python.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	12. Wąż.	Coluber.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	13. Daszuk.	Bungarus.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	14. Zdradnica.	Eliaps.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	15. Zmiała.	Vipera.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	16. Okulmnik.	Naja.	
rozszerzoną	z dwiema szponami	dwa przy licznych	17. Szérokogon.	Platurus.	

UWĄGI DO TABLICY XI. (108.)

Wszystkie rodzaje tego pokrewieństwa mają szczęki mocno rozsuwalne: język szczupły, długi, wysuwalny, na końcu rozdwojony; a w pasczy zęby sześcioma rzędami: t. j. w każdą zuchwie po jednym rzędzie, a na podniebieniu dwa rzędy. Wszystkie jch zęby są ostro kończyste, łukowato w tył podane; liczba jch atoli i jakość są różne w różnych rodzajach. U jednych znaydujemy zęby wszystkie *prawie równe*, w wszystkich sześciu rzędach *liczne* i nieprzeziurawione. Takie rodzaje Wężów są niejadowite, i ukąszenie jch (oprócz ran małych) nie sprawia skutków niebezpiecznych. U drugich napotykamy zęby co do liczby podobne pierwszemu, lecz dwa pierwsze zęby w jch zuchwach górnych będąc znacznie dłuższe od następnych, są oraz wzdłuż przeziurawione i na osobnych gruzłach osadzone. U jnych nakoniec widzimy na podniebieniu i w zuchwach dolnych zęby liczne nieprzeziurawione i prawie równe; w zuchwach zaś górnych mają one tylko po jednym długim zębie, które dowolnie w dziąsłach chować mogą. Te dwa jch zęby są (podobnie jak u poprzedzających) wzdłuż przeziurawione, i na przodzie szczęki na osobnych gruzłach osadzone.

Tak przeziurawione zęby, o których właśnie była mowa, są zębami jadowitemi; bo gruzły na których są osadzone odosobniają z jch krwi ciecz osobliwszą, którą mianowicie dla zwierząt ciepłą krew mających, okropnym jest jadem. Gad tego rzędu, mający takie zęby, gryząc w gniewie przedmiot zemsty swojej, przyciská zębem gruzel pod nim będący, wygniata z niego ową ciecz jadowitą, którą przechodzi przez dziurkę w zębie wydrażoną i wpływa do téż rany, którą ów ząb zadaie. Tak bezpośrednio zmieszany jch jąd z krwią zwierzęcia uką-

szonę, zrzęda mu natychmiast gwałtowne zapalenie naczyń krwistych, i staie się przyczyną nágłéy pu chliny i następnie náyokropnieyszéy gorączki, a cz sto nawet i śmierci; jeżeli wczéśnie pomoc Lékarz użytą niebędzie. Rzecz jednakże dziwna, a mimo t doświadczeniami potwierdzoną, że tenże jąd zażyty z jakim pokarmem bynáymníey zdrowiu nie szkodzi. Ponieważ to punkt jest nader wáżny: poznámy więc także rodzaie tego pokrewieństwa ze względu na jakość jch zębów. Tablica następująca rzec tę wykáże nám w jednym rzucie oka.



Tablica XII. (109.)

Rozkład rodzaiów Pokrewieństwa *Nierówności*ch podług jakości zębów.

W zuchwach górnych

zoby liczne

wszystkie jednakie, niejadowite I.

pięwszy w obu zuchwach dłuższy, jadowity . . . II.

tylko po jednym zębem a te są jadowite III.

RODZAJE.

GENERA.

Poloz.

Boa.

Proca.

Eriz.

Mackowąż.

Erepton.

Hurja.

Hurria.

Polozowąż.

Python.

Wąż.

Coluber.

Dasznik.

Bungarus.

Jadowiec.

Pseudoboa.

Trójgryzł.

Trimeresurus.

Grzechotnik.

Crotalus.

Korbacz.

Scytale.

Jelonoś.

Langaita.

Szponogon.

Acanthophis.

Zdradnica.

Elops.

Zamia.

Vipera.

Okularnik.

Naja.

Szerokogon.

Platurus.

UWAGI DO TABLICY XII. (109.)

Stósownie do tego, co się wyżej powiedziało, i podług wykazu w dopiero odczytaney tablicy, rodzaje pokrewieństwa *Nierównoluskich* dzielą się na trzy oddziały, z których oddział pierwszy zawiera same *niejadowite*; dwa zaś następne same *jadowite* zwierzęta. Między ostatniemi mieszczące się w oddziale trzecim są nányniebezpieczniejsze. W jch to szczęce wierzchniey znáyduiemy zuchwy górne poprzedzielane na dwie nie równe części. Przednią krótszą część (obu zuchw górnych) jest u nich uzbroioną zębem jadowitym; tylną zaś jest zupełnie bez zębów. Nadto przydadź należy, że większą część Wężów *Nierównoluskich* trzecim oddziałem objętych, któreby *dwuzębnými jadowitémi* nazwać można, wydaie żywe dzieci na świat. W niektórych rodzajach tego pokrewieństwa znáyduiemy przy otworze odchodowym po dwa łukowate pazury, które *szyponami* nazywamy. W cechach więc rodzajowych tam o nich tylko wspomniemy, gdzie się znáydownać będą.

Dopiero odczytaną tablicę uważamy tylko za pomocniczą do poprzedzaiący.

R O D Z A Y I. (31.)

G R Z E C H O T N I K. *C R O T A L U S*.

Crotale. albo Serpent-á-Sonnettes. *Fran.*

Klapperschlange. *Niem.*

Głowa spłasczoná, w tyle rozszerzoná, serduszkowatá, listkami rogowými lub drobnými łuskami pokrytá. Za otworami nosdrzy rowki wyraźne.

Oczy duże jaskrawe. Paszcz obszerną, bardzo rozsuwalną. Język wysuwalny. Zęby w zuchwach dolnych i na podniebieniu liczne; w zuchwach górnych tylko po jednym jadowitym zębie. Pod brzuchem i pod całym ogonem listwy jednym rzędem. Na końcu ogona pęcherzyki rogowe, w pół przeźroczyste, paciorkowate, mnięj więcéy liczne, za siebie pozaczépiane. n. p. *Crotalus horridus*. GL.

Do tego rodzaju liczymy cztery gatunki. Wszystkie żyją w ciepłych krajach Ameryki; a náywiększe między niemi dorastaia sześciu stóp długości. Wszystkie są zwierzętami spokojnemi i ociężałemi; ale oráž náyjadowitszemi z wszystkich dotąd znanych zwierząt. Ukąszenie jch staie się tém niebezpieczniejsze, jm w gorętszey porze roku nastąpiło: w czasie upałów lata jest zawsze prawie śmierć przynoszącém. Gruźly pod jch zębami jadowitemi są tak wielkie, że aż popod oczy zastaia. Pomimo jch powolność i mimo to, że się nie w płożą na drzewa: *Grzechotniki* żywią się náywięcéy Ptákami, Wiewiórkami, pomniejszych gatunkami zwierząt Czwororęcznych. i tém podobnemi zwierzętami. Rzecz ta jest zaiste zadziwiaia; a jednakże opartą na świadectwie tylu wiary godnych Pisarzów. Przyrodzenie (mówia wszyscy) obdarzyło *Grzechotnika* tak okropnym i przerażaiącym wżrokiem, jż skoro któremu zwierzęciu spożyry w oczy: to zwierze wpadá w takie zaleknienie, że w niém prawie samóhcąc staiesie ofiarą żarłoczności téy poczwary. Że zaś wszędzie pospólstwo zwykło sądzić przewrotnie o takich rzeczach, które cokolwiek ściślejszey uwagi wymagaią: więc i między tamtejszym ludem urosła báyka, że Ptaki zarażone oddechem *Grzechotnika*, same wlatnia mu do paszczy. Tak jadowitych i strasznych Gadów náywiększemi nieprzyiaciołmi maią byđź *Swinie*; gdyż te (podług świadectwa Podróżopisarzów) zjadaia *Grzechotników* bez náymniejszego niebezpieczeństwa.

Grzechotnik lęgnie się z jednym pęcherzykiem na końcu ogona. W następnym roku przed wylezieniem się, wyrasta mu na końcu ogona drugi pęcherzyk w ten sposób, że krawędzią swoją przyrosły jest do nową skórę ogonową, a częścią wypukłości swojej wciskając się w wypukłość pęcherzyka poprzedzającego spycha go z końca ogona, i przybiera tak mrówkowato przegiętą postać, że ów przeszłoroczny pęcherzyk (mając na nowym ruch dowolny) spaść z niego nie może. Tak dzieje się corocznie przez całe życie *Grzechotnika*. Z tej liczba tych pęcherzyków na końcu ogona może poniekąd służyć do poznania ilości lat wieku Gadów tego rodzaju. Mówimy *poniekąd*; gdyż ściśle biorąc mętryka ta bywa u nich pospolicie bardzo mylna; bo náy dawniejsze, a tém samém náybardziej wyschłe pęcherzyki łatwo się jm odkruszają.

Niektórzy Pisarze malują nam grzechotanie tych pęcherzyków tak donośnem, że nawet w bardzo znacznej odległości plezającego się *Grzechotnika* słyszeć można. — Prawdę mówiąc, rzecz ta ma się wcale inaczej. Szelest tych pęcherzyków jest tak słaby, że za ledwie wyrównywa szelestowi w suchych strączkach zawartego grochu: a przeto ledwie o parę kroków może być słyszany.

Ten rodzaj nazwany jest w dziele X. KLUKA *Gadzią*, a X. JUNDZIEL opisał go pod nazwiskiem *Klekotacz*. Obadwa te nazwiska są niestósowne; gdyż pierwsze nie maluje rzeczy; a drugie daje mylne jej wyobrażenie. Zachowujemy więc dla nich to nazwisko, które jm nadął CZENPIŃSKI.

Ponieważ między dotąd znanymi Gadami ten tylko *jeden* rodzaj ma ogon zakończony tak szczególniejszymi pęcherzykami: przeto w następnych rodzajach wspominać o nich nie będziemy.

R O D Z Á Y II. (32.)

K O R B A C Z. S C Y T A L E.

Scytale. *Fran:* Scytale. *albo* Stockriesen-
schlange. *Niem:*

Pysk krótki, tępy, bez rowków za otworami nosdrzy. Głowa płaska, w tyle rozszerzoną, serduszkowatą, całą drobnemi łuskami pokrytą. Oczy mierne. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Cały wierzeh ciała pokryty jednakiemi drobnemi łuskami. Pod całym brzuchem i pod całym ogonem listwy jednym rzędem. Koniec ogona bezbronny. n. p. Boa horatta. SH.

Tu należą trzy gatunki. Wszystkie są bardzo jadowite. Dorastają znaczney długości. Oyczyzną ich są Indyje wschodnie. Więcey o nich nie pewnego nie mamy.

Pod wyrazem *ogon bezbronny* rozumiemy ogon niemający na końcu ani pęcherzyków, ani też pazura. —

R O D Z Á Y III. (33.)

J A D O W I E C. P S E U D O B O A.

Bongare. *Fran.*

Pysk tępy. Głowa krótką, w tyle mało co rozszerzoną, całą dużemi listkami rogowemi pokrytą. Paszcz obszerna. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne: dwa pierwsze w zuchwach górnych

Tom III.

sa od następnych dłuższe, przedziurawione, jadowite. Wzdłuż grzbietu rząd łusek większych czyni grzbiet daszkowatym. Pod całym brzuchem i pod całym ogonem listwy jednym rzędem. Koniec ogona bezbronny. n. p. *Boa fasciata*. SH.

Badacze Europejscy poznali dopiero niedawno ten osobliwszy rodzaj Gadów, których dwa pierwsze zęby w szczęce górnej są jadowite, mając za niemi wiele zębów niejadowitych. Żyją one w Indiach wschodnich, gdzie je nazywają *Gadami Skálnémi*. Należą do większych zwierząt tego rzędu: wszakże gatunek za przykład wymieniony dorasta ośmiu stóp długości. Jadowców liczymy dwa gatunki. O ich sposobie życia nic pewnego niemamy.

R O D Z Á Y IV. (34.)

P O Ł O Z. B O A.

Boa. Fran. Riessenschlange. Niem.

*Pysk mierny. Głowa podłużna, w tyle lekko rozszerzona, u większej liczby łuskami drobnymi pokryta. Paszcz bardzo rozsuwalna. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, niejadowite. Wargi rowkowane. Ciało wrzecionkowate, czyli w środku grubsze niż przy głowie i przy ogonie. Przy otworze odchodowym dwa haczykowate, rogowe, na bokach sterczące szpony. Pod całym brzuchem i pod całym ogonem listwy jednym rzędem. — Ogon prawie mierny, na końcu chwytny, bezbronny. n. p. *Boa Constrictor*. GL.*

Położów liczymy przeszło dziewięć gatunków. Wszystkie lepijy znane mieszkaia w bliskości wód

w Ameryce pod strefą gorącą; reszty opisanych Oryczyzna jest niepewną. U jednych cały wierzch głowy (podobnie jak reszta wierzchu ciała) pokryty jest drobnymi łuskami; inne mają na pysku listki rogowe, a na głowie łuski drobne. Wszystkie są niejadowite. Wielkość ich różną jest w różnych gatunkach. Jedne z pomiędzy nich zaledwie wyrównywały w wielkości *Wężom Europejskiem*; gdy tym czasem drugie są największemi zwierzętami w téj gromadzie, bo dorastaiały *trzydziestu* a czasem i *czterdziestu* stóp długości.

Wszystkie mają ogon na końcu chwytny, za pomocą którego uwiesiwszy się u gałęzi drzew (a mniejsze u krzaków) w bliskości wód: tak zawieszzone czekaia na zwierzęta przychodzące pić. Na te rzucaia się z góry, i otaczaia je sobą; a ściskaia je coraz mocniéj, łamia w nich wszystkie kości, i trzymaia dopóty sobą obwinione, dopóki też zwierzęta żyć nieprzestaną. W ten czas dopiero *Położ* połyka zdobycz swoją całkiem. — Połykanie mianowicie większych zwierząt, odbywa *Położ* tak powoli, iż dziwić się potrzeba, że się ta poczwara zdobyczą swoją niezadławi; bo podług świadectwa Podróżopisarzów często jeden koniec zwierzęcia już został strawiony, a drugi jeszcze sterczy mu przed pyskiem. Większe gatunki połykaia Owce, Kozy, Wigunie, a podług podań niektórych Pisarzów nawet Konie i Woły. Mniejsze zaś żywią się drobniejszemi zwierzętami. *Położ* połknawszy stósowną do swéj wielkości zdobycz, leży przez kilkanaście dni spokojnie, i grzeie się na słońcu; a gdy wszystko strawił: w ten czas dopiero szuka nowego posiłku.

U Gadów tego rodzaju postrzegamy po raz pierwszy przy otworze odnodowym dwa osobne, na bokach ustawione szpony czyli pazury łukowate. —

Do czego jm te szpony służą? To jest zagadką. Te szpony mogą one po części ukrywać pod łuskami.

Amerykanie łowią bardzo zręcznie *Połozy* w dzięgi z powrozów, które zastawiają na drzewach. Głowę *Połoz*a poczytują oni mylnie za jadowitą, i dla tego złowioném naprzód ją odcinają i odrzucają; resztę zaś mięsa jch jedzą, a skóry wyrabiają na odzienia i inne potrzeby domowe.

Powieści o *Połozach* mających się znáydować na Ukrainie, potrzeba będzie podobno zapisać w poczet baiek prowincjonalnych.

R O D Z A Y V. (35.)

P R O C A. E R I X.

Erix. *Fran.* Erix. *Niem.*

Głowa mała, cała drobnemi łuskami pokryta. Pysk krótki, tępy, bez wyrostów. Oczy małe. Paszcz obszerna, rozsuwalna. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, nie jadowite. Pod brzuchem i pod całym ogonem listwy krótkie jednym rzędem. Ciało jednako wszędzie wysmukłe. Ogon bardzo krótki, tępy, niechwytny, bezbronny. n. p. Boa turcica. OLIV. pl. XVI.

Z pewnością liczymy do tego rodzaju tylko ten jeden gatunek, który się znáyduje w małej Azji i w Egipcie. Na pierwszy rzut oka má on cokolwiek podobieństwa z *Padalcami*. Dorasta znaczney długości. Żywi się náywięcej drobniejszemi Gadami,

Plazami, Owadami i Robákami. Dawnieysi Systematycy przerzucali go dowolnie z jednego rodzaju do drugiego.

RODZÁY VI. (36.)

MACKOWAŻ. ERPETON.

Erpeton. *Fran.* Fühlhornschlange. *Niem.*

Głowa mierná, w tyle rozszerzoná, cała listkami rogowými pokrytá. Pysk tępy, spłaszczony. Szczęki prawie równe. Oczy mierne. Przed oczami na pysku dwa długie, okrągłe, mięsiste, łuskami drobnými pokryte macki czyli wyrosty. Pasz wielká. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, nie jadowite. Otwory nosdrzy na bokach pyska w rowkach. Pod brzuchem i pod ogonem listwy bardzo krótkie jednym rzędem; a pod końcem ogona łuski drobne. Otwór odchodowy bez háczyków. Ogon długi, kończysty, bezbronny, niechwytny. n. p. l'Erpeton tentaculé. LACÉP.

Ten rodzaj zawiera dotąd tylko jeden gatunek. To osobliwsze, świeżo od Badaczów Européyskich poznane zwierze mieszka na wyspach wschodnio Indyjskich. Jego sposób życia, równie jak i użycie tych dwóch macków, które má na pysku, są nám nie wiadome. Exemplarz Mackowęża, który widziałem w gabinecie Zoologicznym w Paryżu, wynosi blisko dwie stopy długości. Czyli dorasta okazałej długości? i to niewiadomo. Listwy pod jego ogonem są tak małe, że się nie wiele różnią od łusek na ciele będących.

R O D Z Á Y VII. (37.)

J G Ł O N O S. L A N G A I A.

Langaha. Fran.

Głowa mierną, dużemi listkami rogowemi pokrytą. Pysk bardzo długi, szczupły, kończysty, drobnemi łuskami pokryty. Szczęki nierówne: wierzchnią bardzo długą, zaokrągloną, ku końcowi coraz szupleyszą, kończystą; spodnią więcéy niż przez pół krótszą, słabo na spodzie wypukłą. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Oczy mierné. Ciało wysmukłe, szczupłe, przedłużone. Tylko pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Ogon miernie długi, szczupły, w znaczney części przy otworze odchodowym jednostaynemi obrączkami rogowemi pokryty; reszta zaś ogona pokrytą jest do koła drobnemi łuskami. Koniec ogona bezbronny. n. p. Langaia nasuta. SH.

Wiemy tylko o jednym gatunku; a ten został właśnie za przykład wymieniony. Kształtem pyska i obrączkowatém pokryciem znaczney części ogona przy otworze odchodowym, różni się on zaraz na pierwszy rzut oka od wszystkich jnnych do tego rzędu należących Gadów. *Igtonos* żyje na wyspie Madagaskar, dorasta znaczney długości, i należy do liczby najjadowitszych zwierząt w téj gromadzie. Według świadectwa Pana BRUGUIÉRES nazwisko *Langaha* albo raczéy *Langaia* jest nazwiskiem, pod którem *Igtonosa* znają Madagaskarczykowie.

R O D Z Á Y VIII. (38.)

SZPONOGON. *ACANTHOPHIS.**Acanthophis. Fran.*

Pysk mierny, tępy, listkami rogowými pokryty, bez rowków przy nosdrzach. Szczęki prawie równe. Głowa drobnými łuskami pokrytą, w tyle mocno rozszerzoną nabrzmiatkościami nabocznými. Płasz obszerna. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Pod brzuchem i pod większą częścią ogona listwy długie jednym rzędem; zaś pod końcem ogona, listewki dwiema rzędami. Ogon zakończony ostrokończystym szponem n. p. Acanthophis Brownii: LÉA.

Dwa gatunki składają ten rodzaj. Z tych gatunków za przykład podany jest mieszkańcem Nowej Hollandyi, drugi zaś znayduje się na wyspach wschodnio-Indyjskich. Obadwa są z liczby najjadowitszych i náyniebezpieczniejszych Gadów. O ich sposobie życia nie mamy jeszcze nic pewnego.

R O D Z Á Y IX. (39.)

TROYRZED. *TRIMERESURUS.**Trimérésure. Fran.*

Głowa w tyle nierozszerzoną, dużymi listkami rogowými pokrytą. Pysk tępy. Płasz obszerna. Zęby takie jak w rodzaju Jadowca. Na wierzchu ciała łuski drobne równé wielkości. Pod brzuchem i pod początkiem ogona za otworem odchodowym listwy długie jednym rzędem; zaś pod resztą ogona listewki dwiema rzędami. Koniec ogona bezbronny. n. p. le Trimérésure petite-tête. LACÉP.

W tym rodzaju mieścimy ten jeden gatunek któryśmy za przykład podali, *Trójrząd* mieszka w Jndyach. Dorasta dość znaczney długości. Należy do liczby jadowitych wielozębnych, niedawno odkrytych Gadów.

R O D Z Á Y X. (40.)

H U R Y I A. H U R R I A.

Hurria. albo Hurriah. Fran.

Głowa mierną, u większey liczby łuskami drobnyemi pokrytą, w tyle nierozszerzoną. Pysk tpey. Wargi mnięy więcéy wyraźnie rowkowane. Żęby w pasczy w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, nie jadowite. Pod bizuchem i pod początkiem ogona listwy długie jednym rzędem; zaś pod końcem ogona listewki dwiema rzędami. Końiec ogona bezbronny. n. p. Hurriah. DĀU. V. 66. 2.

Ten rodzaj obeymuie trzy niedawno odkryte gatunki. Bengal, Jndyie i inne pod strefą gorącą leżące kraie są jch Oyczyzną. Tylko tyle wiemy o nich pewnego, że wszystkie są nie jadowite.

R O D Z Á Y XI. (41.)

P O Ł O Z O W A Ż. P Y T H O N.

Python. Fran.

Pysk długi, tpey. Szczęki prawie równe. Wargi u niektórych rowkowane. Głowa mierną, w tyle

nierozszerzoną, drobnemi łuskami lub dużemi rogowemi listkami pokrytą. Paszcz bardzo obszerną. Żęby w paszczy i szpony przy otwrcze odchodowym takie jak w rodzaju Położa. Pod brzuchem listwy krótkie jednym rzędem. Pod całym ogonem listewki dwiema rzędami. Koniec ogona bezbronny. n. p. Coluber Javanicus. SH.

Dobrze rozróżnionych *Położowężów* liczymy sześć gatunków. Wszystkie są mieszkańcami strefy gorący w Azji, w Afryce i na wyspach jm przyległych. Dorastają tak ogromnej wielkości, że jm prawie żaden z dotąd znanych *Położów* nie wyrówna. J tak gatunek za przykład wymieniony dorasta przeszło trzydzieści stóp długości. Tenże gatunek znajduje się najobficiej na wyspie Jawie, gdzie go *Ular Sawa* (Gadziną rzeczną) nazywają. Przebywa on równie w suchych lasach jak w rzekach i na ryżowych wodą zalanych polach (*). Mniejsze *Położoweże* żywią się Rybami, Płazami i Gadami do jnnych rodzajów należącemi, większe zaś pożerają Ludzi i inne zwierzęta Ssące. Chociaż więc są niejadowite: z przyczyny jednakże swęj drapieżności, są wielce niebezpieczne.

R O D Z A Y XII. (42.)

W A Ż. C O L U B E R.

Couleuvre. Fran. Schlange. Niem.

Głowa mierną, w tyle mało co rozszerzoną, dużemi listkami rogowemi (u większej liczby) pokrytą.

(*) Na pola, na których Ryż sięia, obierają tak nizkie miejsca, żeby je po zasianiu tegoż można całkiem wodą zatopić.

Pysk mierny, tępy. Szczeki prawie równe. Wargi nie rowkowane. Pasaż obszerna. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, nie jadowite. Ciało okrągławe, wysmukłe. Na wierzchu ciała łuski drobne równy wielkości. Pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Pod całym ogonem listewki dwiema rzędami. Otwór odchodowy bez szponów. Koniec ogona bezbronny. n. p. Coluber Natrix. GL.

Rodzaj ten, dla którego wyłącznie nazwisko *Węza* zachowujemy, jest w tym rzędzie náybogatszy w gatunki. Samych bowiem dobrze znanych liczy on przeszło trzydzieści. Z tych sama Europa żywi dziesięć gatunków. Z pomiędzy bardzo licznych gatunków, które się na jnnych częściach ziemi znaydują, nie wciągamy jeszcze bardzo wiele do powyższej ogólnej liczby. Do tego kroku zniewala nas niepewność pochodząca z tak niedokładnych dotychczasowych opisów, że z nich nic pewnego wycisnąć nie można. Jeżeli więc między temi w niepewności przezemnie zostawionemi, wykażą się z czasem cechy zgodne z powyższemi cechami rodzajowemi: rodzaj *Węza* przynajmniej o drugie tyle z bogaci się w gatunki.

*Węze właściwe, dorastają pomierny wielkości. Są nie jadowite. Żywią się náywięcej Płazami i Gadami jnnemi. Zjadają także młode jeszcze w gniazdach będące Ptaki i świeżo porodzone dzieci drobnych zwierząt Ssących. Znaydziemy między nimi wiele powabnie ubarwionych. Niektóre mają mięso smaczne, jadalne. Gatunek za przykład podany, jest náypospolitszym w Europie; a náywięcej zabawia on w wodach słodkich: nazywają go u nas powszechnie *Wężem wodnym*.*

R O D Z Á Y XIII. (43.)

D A S Z N I K. B U N G A R U S.

Dipsas. Fran.

Pysk tępy. Głowa w tyle mocno rozszerzoną. Pieszcz obszerną i rozsuwalną. Zęby takie jak w rodzaju Węża. Ciało z boków ściśnione, znacznie szupleysze niż głowa. Grzbiet ostry, rzędem łusek większych daszkowato pokryty. Pod brzuchem listwy jednym rzędem. Pod całym ogonem listewki dwiema rzędami. Koniec ogona bezbronny. n. p. Coluber bucephalus. Sn.

Tu należą dwa gatunki, które żyją w Azji południowej. OPPEL był pierwszym, który dla nich osobny rodzaj pod nazwiskiem *Bungarus* utworzył. Nazwisko francuzkie *Dipsas*, jest zupełnie dla tych zwierząt niestosowne; bo *Daszniki* są niejadowite: przeciwnie Gady Wężowate, które dawniejsi Autorowie (LUCYAN, GESNER i t. p.) pod nazwiskiem $\Delta\iota\psi\alpha\varsigma$ (*Dipsas*) opisali, są Gadami bardzo jadowitymi, i należą teraz do rodzaju *Elaps*. Mianowicie ten gatunek, o którym LUCYAN pod nazwiskiem $\Delta\iota\psi\alpha\varsigma$ (*) rozprawia, jest *Vipera atrox*, LIN. w *Mus. Ad. Fred. tab. XXII. f. 2.* Ukąszony Człowiek od téj gadziny wpada w okropne pragnienie, które się tém bardziéj wzmaga, jm więcéj piie, i którego dokuczanie kończy się tylko wraz z życiem tegoż nieszczęśliwego. Żyje ona náywięcéj w piąsczystych pustyniach Zary i Etyiopii. Z tego powodu jeszcze raz powtarzam, że *Daszniki* są niejadowite, i że się francuzkiém jch nazwiskiem nie trzeba uwodzić.

(*) Wyráz grecki $\delta\iota\psi\alpha$ znaczy pragnienie.

W wszystkich rodzajach tego rzędu, któreśmy dotąd poznali, znáydujemy szczęki mocno rozsuwalne: a tém samém otwór pasczy stósownie do potrzeby bardzo rozszerzyć się mogący.

R O D Z Á Y XIV. (44.)

Z D R A D N I C A. E L A P S.

Elaps. Fran.

Pysk tepy. Głowa mała wraz z pyskiem jaiowatą, w tyle nierozszerzoną, od ciała nieodznaczoną, dużemi listkami rogowými pokrytą. Wargi równe. Otwór pasczy mierny. Szczęki bardzo mało rozsuwalne. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Ciało prawie jednolitego kształtu, okrągławe, na całym wierzchu jednakię wielkości, łuskami pokryte. Pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Pod ogonem listewki dwiema rzędami. Ogon na końcu bezbronny. n. p. Coluber lacteus. GL. —

Gady do tego rodzaju należące są tém niebezpieczniejsze, bo przy postaci niewinnę mają zęby bardzo jadowite. Wszakże jch mała i od ciała nieodznaczona głowa czyni je na pierwszy rzut oka Zwiłkom (o których późnię będzie mowa) podobnemi; gdy tym czasem jadowitość jch ukąszenia przechodzi jadowitość tych, które do rodzaju *Zmii* należą. *Zdradnic* liczymy ośm gatunków, między którymi znáyduie się także *Coluber atrox*. LIN. (*Δίψας* Luc.) októrym wyżę była wzmianka. Gorące kraie prawie wszystkich części świata mają pomiędzy niemi sobie właściwe gatunki. Z przyczyny ciasności pasczy (gdyż jch szczęki są nierozsuwalne) *Zdradnice*

żywią się náywięcéy Robákami, Owadami, tudzież bardzo młodémi Gadami i Płazami. Wszystkie náležą do liczby pomniejszych Gadów w tym rzedzie. Polskie nazwisko nadałemy jm takie, które ostrzégá, że te zwierzęta niewinną postacią swoją łatwo uwiéśdź czyli zdradzić mogą.

R O D Z A Y XV. (45.)

Ż M I I A. V I P E R A.

Vipère. Fran. Natter. Niem.

Pysk krótki, tepy, spleaszony. Głowa wraz z pyskiem uważaná serduszkowatá, w tyle mocno rozszerzoná, dużémi listkami lub łuskami zwyczajnémi lub łuskami ziarnkowatémi pokrytá. Paszcz bardzo obszérná. Szczéki prawie równe z zuchwami potężnie rozsuwalnémi. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Ciało wysmukłe, przy głowie zeszuplone, na całym wiérzchu równéy wielkości łuskami pokryte. Pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Pod ogonem listewki dwiema rzędami.

Łacińskie nazwisko tego rodzaju (*Vipera*) zdaie się, że powstało przez skrócenie i połączenie w jedno dwóch wyrazów *vivi para*; gdyż prawie wszystkie lepiéy znane, tu náležące gatunki, wydaia z siebie dzieci żywe. Lecz trudno zgadnąć przypadku, który był powodem do tak upowszechnionego a náy-niedorzeczniejszego mniemania między pospółstwem, że się dzieci *Zmii* z łona swych matek gwałtem wygryzaia, i rodzicielki o śmierć przyprawiaia. To błędne ciemnego ludu mniemanie znalazło u niektórych Pisarzów tak dobre przyięcie, że nám w pi-

smach swoich wystawili młode Żmije za obraz niewdzięcznych i niegodziwych dzieci.

Wszystkie gatunki tego rodzaju są bardzo jadowite. U wszystkich znajdziemy szczęki potężnie rozsuwalne. Wszystkie mają głowę w tyle mocno rozszerzoną. Wszystkie są w poruszeniach powolne i leniwe. Podług jakości nosdrzy i końca ogona, dzielimy je na dwa następujące podrodzaje.

a. SERCOGLÓW. TRIGONOCEPHALUS.

Trigonocéphale. *Fran.*

Głowa w tyle tak mocno rozszerzoną, że prawie trójkątną. Na pysku za otworami nosdrzy rowki głębokie. Ogon zakończony małym pazurem: n. p. Trigonocephalus lanceolatus. LACER.

Do tego oddziału liczymy blisko sześć gatunków, których opisy w dawniejszych systematach czytamy rozrzucone w rodzajach *Crotalus*, *Boa*, i *Coluber*. Są one mieszkańcami wysp i krajów pod strefą gorącą położonych. Dorastają pomierną wielkością. Należą do liczby najjadowitszych Gado-
w.

b. ŻMIIA. VIPERA.

Vipère. *Fran.*

Głowa w tyle rozszerzoną, serduszkowatą. Pysk bez rowków za otworami nosdrzy. Koniec ogona bezbronny. n. p. Coluber haemachates. GL.

Ten oddział mieści w sobie przeszło piętnaście gatunków; a ponieważ wszystkie z przyczyny swej jadowitości są wielce niebezpieczne: poznajmy więc bliżej przynajmniej te z pomiędzy nich gatunki, które się znajdują w niektórych okolicach Polski.

1. Żmija Zyzak. *Vipera Berus*.

Coluber Berus. GL.

Cecha. Na wierzchu popielato rudą; pod brzuchem popielato czarną. Wzdłuż grzbietu wąską, ostro wschodkową czyli w zyzak pociętą, czarną lub ciemno brunatną smugą. Na głowie drobne ziarnkowane łuski. Pysk tępy, nagle przycięty.

Żyje ona na miejscach cienistych. Jest u nas dość rzadką, i nie tak jadowitą jak następujące; bo jąd jęj nie tak nagle działa w krwi ukąszonego; zawsze jednakże ukąszenie jęj staie się przyczyną wielkięj puchlizny i niebezpiecznëj gorączki. Ta Żmija dorasta czasem półtoręj stopy długości. Samce bywają ciemniejsze i bardzięj w rudawe przebiegające niż samice. U niektórych po obu bokach wyżęj wspomnianęj zyzakowatęj smugi, jda rzędem drobne czarne plamy.

2. Żmija czwororzędną. *Vipera Redi*.

Coluber Redi. GL.

Cecha. Na wierzchu rudo szarą, czterema rzędami brunatnych lub czarnych plam upstrzoną. Pod brzuchem popielato czarną, ciemnięj i bledzięj przegowaną: pręgi te są krótkie, i pospolicie na przemian ległe. Na głowie drobne ziarnkowane łuski.

Ten gatunek jest w Polsce bardzo rzadki, i znayduie się tylko w kraiach jęj bardzięj ku południowi posunionych. W południowęj Austrii i we Włoszech jest on dość pospolitym. Jąd jego jest bardzo mocny i nagle działający. Roztwór Merkuryszu (*solutio mercurii gummosa*) i dekokt z Gen-

cyiany mają byćdź náyskuteczniejszém lékarstwém przeciw temu jadowi, gdy są wcześnie użyte.

3. Żmii zebrowaná. *Vipera Aspis.*

Coluber Aspis. GL.

Cecha. *Wierzch ciała rdzawy lub rudo czerwony, czárnemi, wazkiemi, na szrodku grzbietu zbiegającemi się prążkami ozdobiony. Pysk tępy, nágłe podniesioną brodawką na kształt rzyka zakończony. Na głowie łuski drobne, ziarnkowate.*

Ta Żmii znáyduie się w cienistych lasach i zaroślach prawie w wszystkich umiarkowanych krajach Europy. Jéy czárne, naksztált żeber od grzbietu na boki ciała rozchodzące się pręgi, umieszczone na tle czerwonym, tudzież na samym końcu jéy pyska w górę sterczącą brodawką, rozróżnia ją dostatecznie od innych tego rodzaju. Francuzi zowią ją *la Vipère á museau cornu*. Jád jéy jest bardzo mocny i nágłe działający. *Spiritus salis ammoniaci succinatus*, i *spiritus tartari foetidus*, uważają za náyskuteczniejsze szrodki przeciw jadowi téy Żmii. U nás jest ona dość rzádką. Doróstá dwunastu i więcéy calów długości.

4. Żmii rudá. *Vipera Chersaea.*

Coluber Chersaea. GL.

Cecha. *Wierzch ciała czerwono rudy albo rudo popielaty; spód zaś czarniawy lub popielato brunatny. Na szrodku grzbietu wazka, prostá, miejscami porządnie węzłkowato porozszerzaná, czárna smuga. Na szrodku głowy trzy duże łuski otoczone drobnemi.*

Ten gatunek jest nájjadowitszym a oráz náypospolitszym w całéy Europie. Jád téy Żmii, mia-
no-

nowicie pod czas upałów lata działa bardzo nagle, i jeżeli śpiesznie niezasiągnie się pomocy biegłego Lékarza, ukąszoną osoba musi umierać w náyokropnieyszey gorączce. Maść téy Żmii jest zmienną, i w jednych okolicach bywá ciemnieyszą niż w drugich; lecz zawsze prostá, niby z páciorków rzadko na sznurek nawdzianych złożoną, ciemno brunatną lub czárná smuga na grzbiecie daie ją poznać zaraz na piérwszy rzut oka. Niektóre mają także na wiérzchu głowy dużą czarniawą plamę w kształcie serca. *Zmiiá rudá* przebywá náywięcéy na mieyscach wywyższonych, które gestém ciérniem lub junémi krzákami są zarosłe, albo kupami kamieni zawalone. — Doróstá dziesięciu calów długości.

5. Żmiiá czarná. *Vipera Prester.*

Coluber Prester. GL.

Cecha. *Cale ciało jednostaynie ciemno czárne, łuskami lancetowatemi pokryte. Wargi tylko białémi kropkami upstrzone.*

Ten gatunek mieszká w pólnocnych kraiach Europy, a mianowicie w Anglii. W Polsce jest ta Żmiiá dość rzádká. Jád má dość mocny i niebezpieczny mianowicie pod czas upałów lata.

Żmiié tych pięciu gatunków náležą do liczby pomniejszych Gadów w tym rzedzie.

Opisywanie gatunków jest prawda przeciw zamierzonemu planowi dzieła mego; lecz tego nie móglbym przeniéść na sobie, ażebym z takiémi jstotami nieobeznát bliżéy Czytelnika, których się jak náyprzezornieý strzedz potrzeba.

Miedzy Żmiami w jnnych częściach świata znáydującemi się, na szczególniejszą uwagę zasługują gatunek *Żmia rogata* (*Vipera Cerastes*. LACÉP.) z postaci nąszkaradniejszą, nad każdym okiem, rogiem twardym, kończystym, na kości brwiowój wyrastającym uzbroioną. Żyje ona w Egipcie. Dorasta dwóch stóp długości. Każdy jéy róg jest dwie linij długi.

R O D Z Á Y XVI. (46.)

O K U L Á R N I K. N A J A.

Naja albo *Serpent-à-lunettes*. Fran.

Brillennatter. Niem.

Pysk tępy, szeroki, wraz z głową spłaszczony i dużemi listkami rogowemi pokryty. Głowa mierzna. Paszcz bardzo obszerna. Szczęki potężnie rozsuwalne. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Ciało przy głowie spłaszczone, w kształcie tarczy znacznie rozszerzone; dalej zaś jak zwykle wysmukłe. Pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Pod ogonem listewki dwiema rzędami. n. p. *Coluber Naja*. GL.

Jeżeli wszystkie dotąd opisane są osobnemi gatunkami, a nie odmianami, jak dawnieysi Systematycy utrzymują: więc rodzaj ten obéymuje siedm gatunków, które znáydują się rozrzucone pod strefą gorącą w Azji, w Afryce i w Ameryce. Náywięcéy jednakże żyje jch w Indyach wschodnich. Okulárníki nálezą do liczby nájjadowitszych i náy-

niebezpieczniejszych Gadów. Dorastaia pomiernéj wielkości; gdyż náywiększy z dotąd opisanych, nie przechodzi pięciu stóp długości. Żywią się drobnemi zwierzętami grzbietnemi. Rozgniéwane stawiają pionowo na ogonie i na tylnéj części ciała, rozdymaia i rozszerzaia jeszcze bardziéj ową płaską część ciała przy głowie, a pochyliwszy poziomo głowę, z przeraźliwém syczeniem uderzaia na nieprzyjaciela. Bonzowie Indyjscy i Kuglarze Egipscy złowiwszy *Okulárnika* żywego, wyrwaia mu zęby jadowite, a nauczywszy go różnych figlów: popistia się z nim przed tamtejszém spólstwem, przez co zarabiaia sobie u ludu na wielkie poszanowanie. — Ciemny albowiem gmin widząc to, że náyjadowsze i náyzłośliwsze w jch kraju zwierze, nietylko bez wywierania swéj złośliwości pozwala się Bonzom brać w ręce, ale nawet pełni z powolnością jch rozkazy; a niewiedząc o wyrwaniu mu zębów jadowitych: przypisuię tym ludziom wysokie światło i prawie nadludzkie siły. Dawnieysi Egipcyanie wyrządzali bozką część swém *Okulárnikom*, upatruiać w nich symbol Bóztwa opiekuńczego światem. Takie wyobrażenie powzięli oni zapewne z częstego podnoszenia się tych Gadów pionowo w górę na tylnéj części ciała.

W wszystkich prawie żyjących językach nazwisko tego rodzaju zastósowane jest do owego znaku, który postrzegamy na części rozszerzonéj u gatunku za przykład wymienionego, a który dokładnym jest obrazem okularów.

R O D Z Á Y XVII. (47.)

S Z É R O K O G O N . P L A T U R U S .

Plature. albo Large-queue. Fran. Breitschwanz.

albo Breitschwänzige-Natter. Niem.

Głowa płaska, w tyle miernie rozszerzoną, cała dużymi listkami rogowymi pokryta. Pysk krótki, płaski, szeroki, z przodu zaokrąglony. Otwór pasczy bardzo obszerny. Szczęki potężnie rozsuwalne. Zęby takie jak w rodzaju Grzechotnika. Ciało jednostaynie wysmukłe, okrągławe. Ogon na końcu ściśniony, nagle wiostowato rozszerzony, na wierzchu i na spodzie ostry, po bokach rowkowany. — Pod brzuchem listwy długie jednym rzędem. Pod ogonem listewki dwiema rzędami.

Ponieważ do tego rodzaju tylko jeden gatunek należy: nie będzie więc od rzeczy, gdy go pokrótce opiszemy. —

1. Szerokogon pręgowany.

Platurus fasciatus.


Coluber laticaudatus. GL:

Cecha. Błado siwo i ciemno rude cały porządnie szeroko pręgowany.

Porządne obrączkowate pręgi, z których jedno są ołowiasto siwe, a drugie ciemno rude lub brunatno czarne, czynią go dość powabnym dla oka; lecz

z przyczyny wielkiéj jadowitości, jest on równie niebezpiecznym jak Grzechotniki. Mieszka pod strefą gorącą w morzach na południowéj półkuli ziemi, a mianowicie w morzach Indyjskich. Na ląd nigdy nie wychodzi. Z resztą nic więcéj o nim nie wiemy. —

Kształtem ogona stanowi on ogniwo między tém a następującém pokrewieństwem.



Tablica XII. (109.)

P O K R E W I E Ń S T W O II. (8.) RÓWNOLUSKIE. HOMODERMES.

Węże mające na całym ciele jednakie drobne łuski: zuchwy pospolicie nierozsuwalne, a język gruby niewysuwalny.

RODZAJE. GENERA.

u c sz wyróżny ściśnięty okrągły	wiosłowato rozszerzony, obosieczny 1. Wiosłowąż.	<i>Hydrus.</i>
	szupły, na wierzchu zaokrąglony 2. Brodawkowąż.	<i>Acrochordus.</i>
	długi; otwory słuchowe zewnętrzne oznaczone 3. Samolusk.	<i>Ophisaurus.</i>
	krótki; łuski pod brzuchem zewnętrzne równe innym 5. Psiróżka. cokolwiek większe 6. Zatoceczka.	<i>Aconitias.</i>
prawie żaden; otwór odchodowy przy końcu ciała 7. Ślepucha.		<i>Typhlops.</i>

UWĄGI DO TABLICY XII. (109.)

Gady do tego pokrewieństwa policzone, różnią się tém od poprzedzających, że na spodzie ciała nie mają listew ale łuski podobne tém, któremi plecy jch są pokryte. Od tego więc, że całe jch ciało prawie jednakiemi łuskami jest przyodziane, dostały nazwisko *Równołuskich*. W dwóch prawdą tu należących rodzajach znaydziemy pod brzuchem po jednym rzędzie łusek cokolwiek większych; lecz te są za małe, ażeby je za listwy poczytać można.

Oprócz dwóch pierwszych rodzajów, wszystkie inne *Równołuskie* nie mają zębów jadowitych. Szczęki większey liczby są nierozsuwalne: większą jch przeto liczba má otwór pasczy albo mierny, albo mały. Oprócz dwóch pierwszych rodzajów, w wszystkich następnych znaydujemy język mierny lub krótki, gruby, mięsisty, nie wysuwalny i bez owéy pochewki w spodniéy szczéce, którą widzieliśmy u Gądów pokrewieństwa *Nierównołuskich*.

Większą jch liczba żywi się wyłącznie Owadami i Robákami; i jest zupełnie nieszkodliwą. W wewnętrzny atoli budowie ciała, a mianowicie w jch kośćcioskładzie spostrzeżono u niektórych ważne odstępiania od téy ogólnéy reguły, którą poznaliśmy w ogólnych uwągach nad Gadam i tego rzędu. O tych więc wyiátkach na swoiém miejscu wyraźnie mówić niezanieedbámy.

RODZAJ I. (48.)

WIOSŁOWAŻ. HYDRUS.

Hydre. albo Hydrophide. Fran. Wasser-
natter. Niem.

Głowa w tyle mnięj więcéj rozszerzoná. Pysk tępy. Otwór pasczy obszérny. Szczęki mocno rozsuwalne. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne. Dwa piérwsze zęby w zuchwach górnych od następnych dłuższe, przedziurawione, jadowite. Język długi, bardzo szczupły, na końcu rozdwoiony, wysuwalny. Ciało wysmukłe, na przodzie w znaczney części okrągławe. Tylná część ciała i ogon mocno ściśnione. Ogon potężnie w górę i na dół rozszerzony, wiosłowaty, obosieczny.

Z dopiéro odczytanéj cechy rodzajowéj pokazuje się, że *Wiosłoweże* z przyczyny zębów należą do liczby takich Gadów jadowitych jakie na tablicy *dwánastéj* pod drugim numerem są umieszczone; chociaż je drobność łusek podbrzuchowych w tém pokrewieństwie mieścić káže. Jch ogon z boków ściśniony, na górze i na spodzie ostry, kształt wiosła naśladowiaczy zbliżając je do rodzaju *Szerokogona* daie piękne przeyscie między temi dwiema pokrewieństwami. Wszystkie *Wiosłoweże* mieszkają pod strefą gorącą w wodach, i nigdy prawie na ląd nie wychodzą. W dolnéj jch szczéce znáydujemy pochwę, do którój swój długi język chowają podobnie jak Gady przeszłego pokrewieństwa. Szczęki jch są mocno rozsuwalne. Te z pomiędzy nich, które dawniéj były znane, umieścił LINNEUSZ w rodzaju *Anguis*. Tegocześni Badacze OPPEL, DAUDIN i CUVIER dzielą je na trzy następujące podrodzaie:

a. W I O S Ł O W A Ż. H Y D R U S.

Hydre. albo Hydrophis. albo Hydrophide. Fran.

Głowa mała, w tyle nierozszerzoną, całą dużemi listkami rogowemi pokrytą. Pod brzuchem łuski od jnnych cokolwiek większe jednym rzędem. n. p. Hydrus curtus. SCHN.

Do tego oddziału liczymy przeszło dziesięć gatunków. Wszystkie są bardzo jadowite. Żyją w morzach Indyjskich, a mianowicie w zatoce Bengalskiej. Wielkość, której dorastają, nie jest jeszcze oznaczoną.

b. R Y B O W A Ż. P E L A M I S.

Pelamide. Fran. Fischschlange. Niem.

Głowa w tyle potężnie rozszerzoną, całą dużemi rogowemi listkami pokrytą. Na całym ciele łuski jednakie drobne, dachówkowato na siebie zastające. n. p. Angvis platyrus. GL.

W tym podrodzaju mieścimy z pewnością tylko ten gatunek, który jest za przykład wymieniony. Jest on bardzo jadowitym. Dorasta dwóch stóp długości. Mieszka w morzu około wyspy Otaity. Według świadectwa Podróżopisarzy mieszkańcy tamtejsi złowiwszy go, ucinają mu głowę; a mięso jego gotują i jedzą.

c. C H E R S Y D R A. C H E R S Y D R U S.

Chersydre. Fran.

Głowa w tyle miernie rozszerzoną. Na głowie i na całym ciele łuski drobne, jednakie. n. p. Acrochordus fasciatus. SH.

Ten oddział obéymuie *dwa* gatunki. Obadwa są wielce jadowite. Z tych za przykład wymieniony żyje w rzekach na wyspie Jawie, i dorasta dość znaczney długości. Tamteysi mieszkańcy mają go nazywać *Ular-Limpe*.

Rodzay *Hydrus* utworzył prawda SCHNEIDER, lecz ostrzedz musimy, że tenże Autor w nowym rodzaju swoim w brew własney zasadzie pomieścić kilka takich gatunków, które z cechami tegoż rodzaju żadney nie mają styczności.

R O D Z A Y II. (49.)

BRODÁWKOWAŻ. *ACROCHORDUS*.

Acrochorde. Fran. Warzenschlange. Niem.

*Pysk tępy. Głowa mierną, spłaszczoną, w tyle nierozszerzoną, całą drobnemi łuskami pokrytą. Paszcz obszerną. Szczęki mocno rozsuwalne. Żęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, prawie równe, drobne, niejadowite. (Język wysuwalny?). — Łuski na całym ciele jednakie, drobne, miejscami kępkowato na kształt brodawek w górę popodnoszone. Ciało bardzo grube, płasko wrzecionkowate. Ogon krótki, nagle zeszuplony, ściśniony: na wierzchu tępy, zaokrąglony; na spodzie zaś ostry, prawie nożykowaty. n. p. *Acrochordus javanensis*. LACÉP.*

Wiemy tylko o jednym gatunku, który żyje na wyspie Jawie; gdzie go nazywają *Ular-Karon*. Dorasta on ogromney wielkości. Pożera zwierzęta większe i Ludzi. Ciało jego przyzwoicie szupłe, przy głowie, grubnieie coraż bardziéy ku tyłowi; a po tém będąc przy ogonie nagle zeszuplone, kończy się

(w stosunku do grubości ciała) bardzo szczupłym i krótkim ogonem. Nadto ciało jego nie jest okrągłe, lecz lekko spłaszczone; a przy tém w stosunku do długości nad miarę grube. Słowem, cała jego postać będąc na pierwszy rzut oka podobną wrzecionkowi, różni go od wszystkich jnnych dotąd znanych Gadów rzędu tego.

Ponieważ *Brodawkowąż* należy do wielkich osobliwości w zbiorach zoologicznych Europejskich, i ponieważ dotąd exemplarz jego będący w Paryżu przywieziono już wypchany i suchy: nie wiemy przeto przyczyny, dla której się na nim wspomniane kępki łusek w górę podnoszą.

O ukształceniu jch języka nic nie wiemy pewnego; a w opisie jch zębów niezgádzaia się Naturaliści: OPPEL albowiem utrzymuje, że *Brodawkowąż* má zęby jadowite; zaś LESCHENAULT i CUVIER są przeciwnego zdania. Aże powody dwóch ostatnich zdają się być ważniejsze: idę więc za jch zdaniem w powyższéj cesze rodzajowéj.

R O D Z À Y III. (5o.)

S A M O Ł U S K. *O P H I S A U R U S.*

Ophisauze. *Fran.* Ophisaur. *albo* Eidech-
senschlange. *Niem.*

Głowa mała, w tyle nierozszerzoná. Pysk mierny, stożkowaty. Oczy małe, każde trzema powiekami opatrzone. Otwór pasczy mierny. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w zuchwach liczne, drobne, prawie równe, nie jadowite. W tyle na podniebieniu dwie kupki zębów drobnych. Język mięsisty,

gruby, mierny, niewysuwalny, na końcu wycięty. Otwory słuchowe oznaczone. Ciało okrągłe, wysmukłe. Na bokach ciała rowek wklęsły. Ogon okrągły, ku końcowi coraz szuplejszy, znacznie dłuższy niż ciało. Na głowie i na całym ciele tuzi jednakie, drobne, położyste. n. p. *Anguis ventralis*. GL.

Znamy tylko jeden gatunek *Samotusków*; a ten żyje w Ameryce w południowych kraich Zjednoczonych Stanów. Jest on żółtawo zielono ciemniejszy i bledniejszy drobno pręgowany, na wierzchu czarnymi kropkami upstrzony. Ogon jego ma być trzy razy dłuższy niż ciało. Ciało jego jest tak kruche, że się za najsłabszym uderzeniem pręta w kawałki rozpada. Z tej przyczyny Amerykanie nazywają go *Wężem szklanym*; a stąd i w niektórych dziełach francuzkich czytamy opisy jego pod nazwiskiem *Serpent-de-Verre*.

Samotusk żyje prawie wyłącznie Robakami, a mianowicie Dżdżownikami, i należy do liczby Gadów nájniewinniejszych.

Samotusk czyni budowę ciała bardzo ważny wyjątek od ogólnej, temu rzędowi Gadów właściwej ustawy; i to w punktach następujących. Naprzód ma na oczach po trzy powieki. Powtórne otwory jego słuchowe, lubo nieprzebite, są jednakże zewnątrz błoną oznaczone. Nakoniec pod skórą znaydujemy u niego na przodzie ciała szczątki kości mostku, obojczyków i łopatki; a przy otworze odchodowym dość wyraźne szczątki miednicy. W żadnym z tych rodzajów *Węzów*, któreśmy dotąd poznali, niezna-
leźliśmy ani śladu tych kości.

R O D Z A Y IV. (51.)

P A D A L E C. A N G V I S.

Orvet. *Fran.* Schuppenschlange. *Niem.*

Głowa mała, od ciała nie odznaczona. Pysk krótki. Otwór paszczy mierny. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w zuchwach liczne, drobne, ściśnione, na końcach haczykowate, niejadowite. Podniebienie bez zębów. Język mięsisty, krótki niewysuwalny, na końcu wycięty. Oczy małe z dwiema powiekami. Otwory słuchowe żadne. Ciało wysmukłe, okrągłe. Ogon długości ciała równiający, okrągły, tępy. Na głowie i na całym ciele łuski jednakie, drobne. n. p. Anguis fragilis. GL.

Do tego rodzajuu liczymy pięć gatunków. Wszystkie znaydują się w wilgotnych lecz wodą niezalanymi okolicach na całym prawie Europie. Żywią się Owadami drobnymi i Dżdżownikami. Są zupełnie niewinne i nieszkodliwe stworzenia. Ich ciało jest podobnie kruche jak *Samotusków*. Ta ich kruchość czyli rozpadalność, zjednała im od dawna w języku naszym nazwisko *Padalców*. Pospólstwo nasze przez mylne zrozumienie tego nazwiska, posądza náynieśluszniej te niewinne zwierzątka o taką jadowitość, że się na tych miejscach ciała ludzkiego, które krwią *Padalca* zbroczone zostaną, má skórą ustawicznie padać czyli pękać, otwierając coráz nowe, a nigdy niezgaialne rany. Że to twierdzenie ciemnego ludu jest zupełnie mylne, za tém mogę ręczyć z własnego przeświadczenia się.

Náywiększe dotąd widziane *Padalce* nieprzechodzą łokcia długości. Samice ich wydaia dzieci żywe na świat.

Jest to drugi i ostatni rodzaj w tym rzędzie, w którego zwierzętach (podobnie jak u *Samolusków*) znaydujemy pod skórą na przodzie ciała szczątki kości mostku, oboyczków i łopatek; a przy otworze odchodowym dość wyraźne szczątki miednicy.

RODZĄY V. (52.)

PSTRÓŻKA. *ACONTIAS*.

Javelot. albo Pintade. Fran.

Pysk tepy, krótki, na wierzchu jednym dużym rogowym listkiem pokryty. Głowa bardzo mała, od ciała nieodznaczona. Otwór pasczy mały. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w zuchwach drobne, nie jadowne. Na podniebieniu ząbki bardzo drobne. Język mięsisty, niewysuwalny. Oczy drobne lub żadne. Ciało wysmukłe, okrągłe. Ogon znacznie krótszy niż ciało, ku końcowi nieznacznie coraz szuplejszy. Na całym ciele łuski jednakie, drobne. —

Liczmy tu z pewnością dwa gatunki. Z tych jeden (*Angvis Meleagris*. GL.) mieszkający w Guianie jest szary, drobnymi rudymi centkami gęsto upstrzony, ma oczy drobne. Drugi przeciwnie (*Acontias coecus*. Cuv.) znaydujący się w Indyach wschodnich, jest bez oczów. Obadwa te gatunki są niewinne i nieszkodliwe. — O ich sposobie życia nie mamy pewnego.

R O D Z Á Y VI. (53.)

Z A T O C Z E K. T O R T R I X.

Rouleau. *Fran.* Stockschuppenschlange. *Niem.*

Pysk tępy. Głowa mała, walcowata, od ciała nieodznaczona, listkami rogowymi pokryta. Otwór pasczy mierny. Szczęki nierozsuwalne. Żęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, drobne, prawie równe, nie jadowite. Język mięsisty, gruby, nie wysuwalny. Oczy małe. Od końca pyska do końca ogona całe ciało wysmukłe, jednostajnie grube. Ogon bardzo krótki, tępy. Wzdłuż spodu ciała łuski cokolwiek większe jednym rzędem. n. p. Angvis Scytale. GL.

Ten rodzaj składa się z pięciu gatunków. — Wszystkie żyją w Ameryce. Należą do liczby jstót niewinnych. Żywią się Owadami i Robakami. Dawniéj znane liczono do rodzaju *Anguis*, od których jednakże dostatecznie są rozróżnione. Na pierwszy rzut oka trudno zgadnąć, na którym końcu mają głowę; tak albowiem ciało jch wszędzie jednaką ma grubość. Nazwisko rodzajowe dostały stosowne do tego jch zwyczaju, że grzejąc się na słońcu, leżą náyczęściéj zgięte w obrączki. Náywiększe między niemi dorastają dwóch stóp długości.

R O D Z Á Y VII. (54.)

Ś L E P U C H A. T Y P H L O P S.


Typhlops. *Fran.* Blindschleiche. *Niem.*

Pysk miernie długi, spłaszczony, tępy, z przodu zaokrąglony. Głowa mała, od ciała nie odzna-

czoną, całą listkami rogowemi pokrytą. Otwór pasczy mały. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w zuchwach drobne, liczne, niejadowite. (Później bez zębów?). Język miernie długi, na końcu rozdwojony. Oczy bardzo małe, ledwie znaczne, błoną powleczone. Ciało wysmukłe, od końca pyska do końca ogona jednostajnie grube. Ogon prawie żaden; bo otwór odchodowy przy samym końcu ciała. Łuski na całym ciele jednakie, drobne, wroste. n. p. *Anguis nasutus*. GL.

Do tego rodzaju liczymy przeszło dziesięć gatunków. Wszystkie są mieszkańcami gorących krajów Azji, Afryki i Ameryki. Żywią się Robakami i Owadami. Należą do liczby najdrobniejszych, niewinnych i nieszkodliwych Gadów. Na pierwszy rzut oka mają wiele podobieństwa z Dżdżownikami. Ich walcowate, wszędzie jednostajnie grube ciało będąc prawie zupełnie bez ogona, pozwala im z równą łatwością posuwać się naprzód tak głową jak tyłem ciała. Od tego więc usposobienia, że się z równą łatwością mogą czołgać na przód jak w tył, francuzcy Naturaliści nazywają je *les Doubles Marcheurs*. —

Gady dwóch ostatnich rodzajów, czynią kształtem ciała piękny przechód do pokrewieństwa następującego. —



Ta-

Tablica XIII. (110.)

P O K R E W I E Ń S T W O III. (9.)

N A G I E. E S Q U A M A T Ł

Węże mające ciało wysmukłe jednakięj wszędzie grubości, skórą zupełnie nagą lub obrączkami łuskowatemi pokryte, otwór odchodowy przy samym końcu ciała: ogon prawie żaden:

RODZAJE. GENERA.

Na ciele	{	obraczki łuskowate wyraźne . . .	1. Zwitek.	<i>Amphisbaena.</i>
		skóra nagą, obrączkowato po-		
		zmaraszczaną	2. Nagoskór.	<i>Cocilia.</i>

UWAGI DO TABLICY XIII. (110.)

Gady tego pokrewieństwa tak w zewnętrzney jak w wewnętrzney budowie ciała mają ważne odmiiany. Zastanówmy się więc bliżęj nad niemi.

Zwierzęta tych dwóch rodzajów, które w dopiero odczytaney tablicy są wyrażone, mając otwór odchodowy przy samym końcu ciała, nie mają ogona: mogą przeto (podobnie jak *Slepuchy*) pełzać z równą łatwością w tył jak na przód.

Oczy jch są bardzo małe, ledwie widoczne, błoną powleczone: czém także będąc podobne *Slepuchom*; okazują piękny związek z Gadami pokrewieństwa przeszłego.

Z drugiey strony Gady tego pokrewieństwa stanowią ogniwo, które łączy gromadę gadów z Płazami. Wszystkie bowiem tu należące, mają ciało pokryte prawie zupełnie nagą skórą. Wszakże nawet w rodzaju *Zwitka*, chociaż się na pierwszy rzut oka здаie, że mają na ciele obrączki z łusek czworokątnych złożone: przypatrzywszy się jni atoli z blizka, przekonamy się, że te jch łuski nie są prawdziwemi łuskami rogowemi: są to tylko czworokątne łuskom podobné zagięcia na powierzchni jch skóry. Słusznie więc te Gady zasługują na nazwisko *Nagich*.

Zuchwy jch dolne są na przodzie z sobą zrosłe, a tylnemi końcami przytykają wprost do kości uchowych przy czaszce podobnie jak u zwierząt gromad poprzedzających. Jch zuchwy górne są jednostayne i do kości czaszki przyrosłe. Z takiej budowy jch zuchw pokazuje się, że szczęki jch są nierozsuwalne. To urządzenie szczęk mają wspólne z znaczną liczbą rodzajów pokrewieństwa *Równoluskich*.

Żebra w Gadach tego pokrewieństwa znaydujemy znacznie krótsze niż w jnnych *Wężach*; gdyż w tych sięgają one mało co daléy jak do połowy boków. Kości jch pácierza grzbietowego są podobnie (jak w niektórych Płazach i Rybach) na obu końcach wydrażone, i za pomocą stożkowatych warstw chrząstki z sobą pospajane.

Język mają gruby, mięsisty, nie wysuwalny. Znaydujemy w nich tylko po jednym worku płucowym. Serce jest w nich daleko ku tyłowi posunięte. Resztę uwąg anatomicznych nie omieszkamy załączyć do uwąg rodzajowych. Tu tyle jeszcze w ogólności powiedzieć musimy, że wszystkie dotąd znane *Węże Nagie* są nie jadowite.

R O D Z Á Y I. (55.)

Z W I T E K. *A M P H I S B A E N A*.Amphisbéne. *Fran.* Ringelschlange. *Niem.*

Pysk tępy. Głowa mała, od ciała nieodznaczona, listkami rogowymi pokryta. Oczy drobne, ledwie widoczne, błoną powleczone. Otwór paszczy mały. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w zuchwach drobne, stożkowate, nie jadownicze. Podniebienie bez zębów. Język mięsisty, nie wysuwalny. Ciało wysmukłe, okrągłe, wszędzie równo grube i całe jednostaynie łuskowatemi obręczkami pokryte. Ogon prawie żaden. Otwór oddechowy przy końcu ciała. Przed otworem oddechowym dziurki potowe jednym rzędem. n. p. Amphisbaena magnifica. GL.

Sądząc podług liczby różniących się opisów, należy do tego rodzaju pięć gatunków; lecz CUVIER tylko dwa gatunki (*Amphisbaena fuliginosa* i *Amphisbaena alba*) podaje za pewne.

Wszystkie *Zwitki* żyją w Ameryce południowej. Są niewinnemi i nieszkodliwemi zwierzątkami. Największe między niemi dorastaia dwóch stóp długości. Żywią się Robakami i Owadami, a mianowicie Mrówkami. Najczęściej znayduia je w dużych mrówiskach. Pospólstwo Amerykańskie poczytuiać *Zwitki* za zupełnie ślepe, utworzyło o nich bایkę, że Mrówki lituiać się ślepoty *Zwitków*, sprowadziać je do gniazd swoich, i staraia się jм o żywność. Gdyby to było prawdą, byłby to bardzo piękny i moralny postępek ze strony Mrówek; ale powieść ta jest mylną. *Zwitki* albowiem same się wciskaią do mrówisk dla tém snadniejszego pożerania Mrówek i jch jay.

Zwitki znoszą jaja, z których się lęgną dzieci zupełnie podobne rodzicom swoim. Znajdujemy w nich serce jeszcze dość wyraźnie z jednej komórki i z dwóch uszek złożone.

R O D Z A Y II. (56.)

N A G O S K Ó R. C O E C I L I A.

Cécilie. Fran. Wurmschlange. Niem.

Głowa mierna, spłaszczona, pyskiem tępym zakończona. Oczy bardzo drobne, błoną powleczone. Otwory nosdrzy w krótkich rurkach. Otwór paszczy mierny. Szczęki nierozsuwalne. Zęby w wszystkich sześciu rzędach liczne, drobne, nie jadowite. Język mięsisty, niewysuwalny. Ciało wysmukłe, wszędzie równo grube, okrągławe, skórą śluzgą obrączkowato pozmarszczaną pokryte. Ogon żaden. Otwór odchodowy na samym końcu ciała. n. p. Coecilia tentaculata. GL.

W tym rodzaju liczymy dobrze znanych *cztery* gatunki. Wszystkie żyją w ciepłych krajach Ameryki, a mianowicie w Guianie. Jedne z pomiędzy nich dorastają dość znacznej długości, drugie przeciwnie zaledwie wyrównywiają wielkością ciała Dżdżownikowi. Wszystkie są niejadowite. Sposób ich życia i rozmnażania się jest nam dotąd nie wiadomy.

Niektórzy Pisarze twierdzą, że samice Nagosków znoszą jaja; lecz czy się z tych jay lęgną dzieci podobne rodzicom, lub czy odbywają jakie przemiany: ten ważny punkt przechodzą milczeniem. — O częściach płodnych ich samców nic także pewnego nie wiemy.

Jnni Naturaliści zważając na to, że zwierzęta tego rodzaju mają skórę na ciele nagą i ślizgą, że jch żebra są krótkie, i że się jch serce składa z jednej komórki i tylko z jednego uszka wyraźnego: radzą przenieść je do gromady Plazów. Jeżeli więc dalsze postrzeżenia jeszcze i to wykażą, że się dzieci *Naguskórów* lęgną z jay opatrzone płucami i dychawkami, i że muszą w młodości odbywać przemiany: przeniesienie to bezsprzecznie nastąpi. Jeżeli zaś dzieci jch lęgną się zupełnie podobne przodkom swoim: rodzaj ten będzie musiał pozostać w téj gromadzie. Jakkolwiek bądź, zawsze jednakże będzie on pięknym ogniwem, które daie nieznaczny przechód z gromady Gadów do gromady Plazów. —

Na tém kończymy uwagi nad gromadą zwierząt zimnokrwistych, które Gadami nazywamy.

P Ł A Z Y

S I R E N I A.

Saltem remoto, des PATER, angulo

Horas senectae ducere liberas!

Tutumque vulgari tumultu

Eripias, hominumque curis.

GRAY:

Tablica XIV. (III.)

GROMADA PIĄTA. PŁAZY. SIRENIA.

Zwierzęta Grzbienną, nagą skórą pokryte, bez cyców, bez pazurów u palców: mające czerwoną zimną krew, serce o jedném uszku i o jednój komórce: oddychające przez całe życie (lub przynajmniej w młodości) za pomocą płuc i dychawek razem: podlegające w młodości przemianom.

Rzędy. ORDINES.

Dychawki	{	doczasowe, nietrwałe; ciało	{	krótkie, grube, w wieku dożyłym bez ogona	1. Bezogoniaste. <i>Ecaudata</i> .
		trwałe, wyraźne; ciało długie, wysmukłe; ogon trwały, wyraźny . . . 2. Jaszczurkowate. <i>Lacertiformia</i> .		trwałe, wyraźne; ciało długie, wysmukłe; ogon trwały, wyraźny . . . 3. Dychawkowate. <i>Branchiala</i> .	

UWĄGI DO TABLICY XIV. (III.)

W uwagach ogólnych nad gromadami (*) mówiliśmy dość obszernie o zwierzętach tu należących, które *Plazami* nazywamy: przeto tu jedynie o tych jeszcze punktach nanienić wypadá; które tam przemilczane zostały. —

Plazy stanowią piękne ogniwo przechodowe z gromady Gadów do gromady Ryb; a jednakże są one od obudwóch przyzwoicie rozróżnione. Zastanówmy się nad tym punktem. Zaráz na pierwszy rzut oka różnią się one tém od Gadów, że u palców nie mają pazurów, i że ciało jch pokryte jest nagą skórą, którą na większý jch liczbie jest workowatą czyli znacznie obszerniejszą niż ciało, i tylko w niektórych punktach do ciała przytwierdzoną. Daléy postrzegamy, że *Plazy* albo przez całe życie, albo przynajmniéy w młodości mają do oddychania płuca i dychawki razem, że serce jch składa się z jednéj komórki i z jednego uszka, że jch trzewia są długie a szczupłe, że w kośćoskładzie większą jch liczba nie má żeber, że samce pozbawione są członka płodnego, że zapładniaią jaia zewnątrz ciała swych samic, że dzieci wylęgłe z jch jáy są niepodobne rodzicom, i że wprzód (podobnie jak *Owady*) muszą kilka odbydź przemian, nim przyzwoią gatunkowi swemu postać otrzymają. Wszystkie te postrzeżenia są zupełnie przeciwne ówém, któreśmy wyłożyli w uwagach nad gromadą Gadów. Nakoniec dodadźby można, że Gady mają głos słaby i pospolicie syczący; przeciwnie zaś wię-

(*) Patrz w *Tomie Piérwszym* na stronie 34 i na następnych.

kszą część Płazów obdarzoną jest tak mocnym i donośnym głosem, iż w tym punkcie jeżeli nieprzewyższą, to pewno wyrównują náywrzaskliwszém Ptákom. W tém więc tylko zgadzaia się Płazy z Gadami, że niemając blony podpiersiowey, mają krew czerwoną zimną.

W piérwszey porze życia swego okazują Płazy w zewnetrzney postaci wiele podobieństwa z Rybami; ale i od tych różnią się mianowicie tém, że jch dychawki nie mają żadnego pokrycia, ale sterczą wolno w kształcie krzewistych gałązek na obu bokach szyi przy głowie. W późniejszym zaś wieku, gdy jh nogi wyrastać zaczęą, zniká między niemi a Rybami wszelkie podobieństwo.

Płazy niemają otworów sluchowych, a kości jch uchłowe ukryte są pod skórą. Większa jch liczba znosi corocznie wielkie mnóstwo tak drobnych jáy, że te pospolicie znane są pod nazwiskiem *jkry*. Te jch jaia po wyysciu z łona samic, i następnie po otrzymaném zapłodnieniu przez puszczane na los nasienie samców, pływaiąc samopas po wodzie rosną jeszcze przez znaczny przeciąg czasu. Wreszcie pękaią, i każde wydaie z siebie po jedném dziecku, które odmienną má postać od postaci przodków. Ponieważ stopniowe przeobrażanie się *Płazów* jest różne w różnych rodzajach: rozwinięcie zatém punktu tego zostawiamy do uwąg szczegółowych. — Tyle tu jeszcze przydadź widzimy potrzebę, że wszystkie *Płazy* młode, które *Poczwarkami Płazów* nazywać będziemy, przez cały czas jch przemian żyją w wodzie i żywią się náywięcéy gnijącemi ciałami roślinnemi.

Powiedzieliśmy wyżej, że samice większey liczby *Płazów* wydaia z siebie corocznie wielkie mnóstwo *jkry* czyli jáy: jakimże więc dzieie się sposo-

bem, że dotąd liczba *Płazów* na świecie jest tak ograniczona?—Ważne prawda, lecz do rozwiązania łatwe pytanie. Naprzód ponieważ samce tych zwierząt puszczają prawie na los nasienie swoje do wody: wiele zatem jay zostaje niedosięgniętych nasieniem, i ginie z niedostatku zapłodnienia. Z tych znowu które zostały zapłodnione, wiele zostaje pożartych przez drobne Ryby i Owady wodne. Ten sam los spotyka znaczną część wylęgłych *Poczwarek*. Z pomiędzy tych, które uszły pożarcią, wymiera wiele w czasie lat suchych, jeżeli jm woda w miejscu jch pobytu piérwéy wyschnie, nim przeobrażenia swoje odbydź zdołały. Nakoniec te, które szczęściem doszły przyzwoitego kształtu, stają się pastwą Ptaków pływających i brodzących, tudzież Gadów i Ryb większych. Tylu nieprzyjazném okolicznościom podległe stworzenia, nie tylko nad miarę rozmnożyć się nigdy niezdolają; ale owszém dziwić nás powinny, że się jeszcze dotąd w takiéy liczbie utrzymać potrafią.

Płazy dojrzałe czyli przyzwoicie ukształcone, żywią się prawie wyłącznie ciałami zwierzęcemi; a mianowicie Owadami, Robákami i jkrą Ryb. Niektóre między niemi mają mięso jadalne. Żaden *Płaz* nie má zębów jadowitych. Wszystkie te, które mieszkają w kraiach zimniejszych, przepędzają zimę w śnie letargicznym. Dla tego na początku jesieni jedne kryją się w nóry podziemne; drugie zanurzają się w muł pod wodą. Ostatnie przez całą zimę są pozbawione sposobności oddychania. Wszystkie *Płazy* rosną przez całe swe życie. W wszystkich znáydujemy duże, błonowe pąrzyste płuca w kształcie dwóch prawie równych worków jajowatych. —

Łacińskie nazwisko téy gromady (*Sirenia*) przypominając nám owe mitologiczno báieczne jstoty, które pokazując się po części z wody, miały śpie-

waniem swoim zagłuszać okolice: maluje tém samym obyczajem znaczny liczby tu należących zwierząt. —

Stósownie do różnic wykazanych w ostatniej tablicy, dzielimy Plazy na trzy rzędy. W dwóch pierwszych rzędach pomieściliśmy takie, które tylko w młodości mają widoczne dychawki obok płuc; do trzeciego zaś należą takie, u których przez całe życie dychawki i płuca są trwałe. Po tych ogólnych uwagach, przystąpmy do bliższego poznania rzędów zapowiedzianych.



Tablica XV. (112.)

R z e d P i é r w s z y. (50.) BEZOGONIASTE. *ECALUDATA.*

Plazy czworonożne mające ciało grube, mniej więcej płasko pękate, w wieku dojrzałym bez ogona: dychawki tylko w pierwszemy porze życia czasowe, nie trwałe, później znikające.

RODZAJE. GENERA.

N o g i t y l n e

krótsze niż ciało; palce przednie wolne, szczupłe, długie, gwiazdkowato zakończone 1. Grzbietoród. *Pipa.*

równe długości ciała: palce przednie krótkie, tępe niły spieje 2. Ropucha. *Bufo.*

krętkami młóściciemi 3. Żabka. *Hyla.*

dluższe niż ciało; palce zakończone kończyko lub tępo bez kręzków 4. Żaba. *Rana.*

UWĄGI DO TABLICY XV. (112.)

Plazy Bezogoniaste (les Anoures), które pod ogólném nazwiskiem *Zab* są znane, a które w dopięro odczytaney tablicy na cztery naturalne rodzaje widzimy rozdzielone, stanowiły w dawniejszych systematach tylko jeden rodzaj pod nazwiskiem *Rana*. O ile podział jch terazniejszy właściwszym jest od dawniejszego: dalsze uwagi náylepiej to wyjaśnia.

Zwierzęta rzędu tego okazują nam takie odmianny w budowie ciała swego, jakich w żadnym rzędzie tych zwierząt, któreśmi dotąd poznali, nie postrzeżono. Godną więc rzeczą, ażebyśmy się cokolwiek bliżej nad niemi zastanowili. W przód jednakże ostrzedz musimy, że w bardzo wielu punktach następujących uwąg ogólnych rodzaj *Grzbietoród* czyni wyjątek: ztąd wszystkie szczegóły, w których się on z jnnými *Plazami* tego rzędu nie zgadzają, w szczegółowych uwągach nad jego rodzajem wytknąć nie zaniedbamy.

Wszystkie zwierzęta tego rzędu w wieku dojrzałym mają ciało krótkie, mniéj więcéy spłaszczone i na boki pękato rozszerzone, czterema nogami opatrzone. Wszystkie nie mają ogona. Nogi jch tylne są znacznie dłuższe niż przednie. Stósunek tychże długości do długości ciała stanowi náywyraźniejszą cechę do poznawania rodzajów. Wszystkie dotąd znane mają u nóg przednich po cztery, a u tylnych po pięć palców bez pazurów. Znáydują się jednakże i takie między niemi; które u nóg tylnych pokazują szcátki palca szóstego. Liczba ostatnich jest bardzo małą. Palce przednie prawie u wszystkich są wolne; tylne zaś u jednych znáydujemy wolne, u drugich w pewnéy części, u jnnych aż do końców błoną spięte.

Wszystkie *Plazy Bezogoniaste* mają na sobie skórę nagą, obszerną, rozdymalną i tylko wzdłuż grzbietu do ciała przytwierdzoną. Wszystkie prawie mają oczy opatrzone dwiema powiekami i migobłoniem przezroczystym, który chowają pod powieką dolną. U wszystkich postrzegamy pascz bardzo obszerną, lecz szczęki nierozsuwalne.

Oprócz pierwszego rodzaju, wszystkie inne tego rzędu mają język mięsisty, szeroki, miękki, na końcu mniej więcej wyraźnie wycięty; lecz ten jch język zamiast być przytwierdzonym do kości podjęzykowej i do gardzieli, to on jest przyrosły do przodu szczęki dolnej w ten sposób, że koniec jego wolny obrócony jest do gardła. Jeżeli więc zwierze tego rzędu chce wiaść co na język: musi go nakształt klapki wykladać z pasczy. Takiego położenia języka nie widzieliśmy jeszcze u żadnego z tych zwierząt, któreśmy dotąd poznali. Nadto wiedzieć potrzeba, że tylko u samców cały język jest wolny; a przeciwnie u samic znaydujemy go szrodkiem tak do podgardla przyrosły, że tylko tylny koniec i boki jego są wolne. Z téy podobno przyczyny samice tych *Plazów* mają głos słaby, i rzadko się z nim odzywają; gdy przeciwnie samce większy jch liczby są bardzo wrzaskliwe. Tak odmiennie urządzone język jest u większy liczby zwierząt tego rzędu prawie jedyną pewną cechą do rozpoznania zewnętrznie płci między niemi.

Wszystkie mają płuca duże parzyste, czyli z dwóch oddzielnych jaiowatych worków złożone. Oddychanie jch odbywa się szczególniejszym sposobem. Chcąc oddychać *Plazy Bezogoniaste*, trzymają gębę ścielnie zamkniętą: wciągają powietrze przez otwory nosdrzy do gęby, a ztąd wpychają go odwrotnym językiem swoim do płuc. O rzeczywistości takiego jch sposobu oddychania łatwo przekonać się

się można. Jeżeli bowiem potrzymamy którekolwiek zwierze z tego rzędu z otwartym pyskiem przez parę minut: zobaczymy, że toż zwierze nie-mogąc oddychać, zacznie obumierać w rękach naszych. Sposób więc oddychania tych Plazów jest podobny oddychaniu Żółwiów; ta jednakże zachodzi tu różnica, że Żółwie wypuszczają z płuc swoich wciągnięte powietrze przez opuszczenie kości podjęzykowéy; te zaś muszą wypychać go za pomocą mięszkułów brzuchowych. I o tém przekonanie się jest snadne; przeciąwszy albowiem Żabię wraz z skórą mięszkuły brzuchowe w ten czas, gdy má płuca nadęte: już jéy płuca nie zdołają wycisnąć z siebie powietrza, i zostaną rozdętémi.

Cynadry samców podobnie jak jajniki samicy znáydujemy u tych zwierząt wewnątrz ciała. Te jch części płodne stają się w nich na wiosnę (przed párzeniem się) bardzo duże. Kanały nasienne samców równie jak jaiowody samicy znáydujemy w nich bardzo krótkie i schodzące się w ogólnym kanale odchodowym.

Oprócz *Grzbietoroda*, u wszystkich jnnych znáydujemy kości głowy wszędzie równo grube. Jch czaszka właściwą jest z przodu bardzo wąską; w tyle zaś rozsuwá się nagle na obie strony w kształcie obostronnego młotka. Jch zuchwy górne są tylko końcami przytwierdzone do przodu i do tyłu czaszki; w szrodku zaś będąc od niéy łukowato odsunięte, zostawiają wielkie próżne ustępy dla oczów. Oczy więc tych zwierząt osadzone między kośćmi czaszki i zuchw jak w rámkach, wspieraia się u spodu jedynie na błonie podniebieniowéy. Szyia jch składa się pospolicie tylko z jednéy kości paciérza grzbietowego.

Wszystkie niemają ani mostku ani żeber; a naboczne wystawy kości paciérzowych znáydujemy

w nich krótkie: całe więc zamknięcie i tęgość przodu ciała stanowią jch łopatki i kości obojczykowe. Jch krótka kość *krzywá* (*ossacrum*) má postać klamry z końcami w tył zwróconými. Kości jch *łonowe* (*os pubis*) są niezmiernie przedłużone i w jednéj linii z pácierzem grzbietowym tak ustawione, że przedniemi końcami swými stykają się z końcami kości *krzyżowéy*; tylne zaś jch końce znacznie grubsze schodzą się z sobą. Jch pojedynczą, prostą kość *kuprowá* (*os coccygis*) jest podobnie jak dwie przeszle przedłużoną, i jednym swym końcem przytyką do szrodka klamrowatéy kości *krzyżowéy*, drugim zaś wpadá między schodzące się końce kości łonowych. Tym sposobem te cztery kości (t. j. *krzyżowá*, *kuprowá* i dwie *łonowe*) ułożone w jednéj płaszczyźnie tworzą figurę wązkiey a długiey sprzączki o jednym trzpieniu, albowinaczey kształt kończystéy łutni o jednéj stronie, i zastępują miejsce miednicy; a tylne jch końce złączone z sobą, służą za punkt wspierny dla kości udowych.

Kości w jch nogach przednich mają podobny rozkład jak w przednich członkach Człowieka, z tą jednak różnicą, że jm niedostaie kości *promieniowéy*, że nie mają tylko po cztery palce, które u większey liczby w jednéj płaszczyźnie są ustawione, i nakoniec że w palcach nie mają równéy liczby kości; bo krótsze jch palce mają tylko po dwa a dłuższe po trzy członki.

Kości udowe nóg tylnych u *Płazów Bezogoniastych* przytwierdzone są na bokach do tylnych końców kości łonowych. W jch nogach tylnych nieznanymy także kości *promieniowéy* (*radius*); a jch stopa składa się z dwóch długich obok siebie ustawionych kości. Palce tylne większey liczby dzielą się na trzy klasy; gdyż w náykrótszych znáyduie-

my tylko po dwie, w dłuższych po trzy, a w náy-
dłuższych pospolicie po cztery kości.

Ułożenie muszkułów w nogach tylnych u zwier-
ząt tego rzędu zasługuie z tego względu na szcze-
gólniejszą uwagę, że tworzą uda i łydki podobne
udom i łydkom Człowieka. Jest to ostatni śląd po-
dobieństwa między zwierzętami Grzbietnemi, który
nam (choć w pojedynczych częściach,) uderzającym
sposobem przypomina postać budowy ciała Lu-
dzkiego. —

Lubo *Plazy Bezogoniaste* jedne żyją częścią
w wodzie a częścią na ziemi suchej, drugie na
drzewach, inne na koniec w suchych a cienistych
miejskach: wszystkie jednakże w czasie pączenia się
jdą na wody; a mianowicie na wody stojące. Tu
samiec bierze w objęcia samicę, i ściskaniem zniewa-
la ją do wypuszczania jaj, które wypływają z niej
wszród rzadkiej flegmistey cieczy. W tym samym
czasie puszcza z siebie samiec nasienie na wypływa-
jące jaja z samicy: a tak skutecznia się ich zapło-
dzenie. Takie pączenie się tych zwierząt trwa cią-
gle przez dni kilka. Po odbyciu tego stare ucho-
dzą na miejsca zwykłego pobytu swego; a plód
swój zostawiają w wodzie losowi. Tak więc w tym
rzedzie ani rodzice swych dzieci, ani dzieci swych
rodziców nigdy nieznają. Jeden rodzaj *Grzbieto-
roda*, o którym się w krótkce dowiemy, czyni w tym
punkcie ważny wyjątek.

Tak opuszczone ich jaja pływając samopas po
wodzie rosną przez znaczny przeciąg czasu: w re-
szcie pękają i wydają z siebie drobne jstoty, które
náymlniejszego nie mają podobieństwa z rodzicami
swemi. Są to male zwierzątka bez nóg, opatrzone
w niektórych gatunkach twardym pyszczkiem na
kształt dzióbka. — Wszystkie mają pod gardłem

strzępki skórzane w postaci małych pletw, a kończą się długim, ściśnionym ogonem. Na bokach jch wielkiéy głowy przy karku wznoszą się liczne dychawki w postaci drobnych krzewistych gałązek, które osadzone są na czterech łukach chrząstkowych. Wewnątrz jch ciała znáydujemy płuća paryste. W takiéy postaci nazywá je pospólstwo *Pałosami*. — Ten piérwszy jch stán trwa bardzo krótko. —

Naprzód niknie dzióbek u tych, które go mają; a na jego miejsce pokazuje się tępy, miękki pyszek. Ciało wszystkich od głowy nieodznaczone rozszerzając się niezmiernie na boki przybiera taką postać, iż na piérwszy rzut oka całe zwierze zda się składać z saméy tylko głowy, do którój w tyle przytwierdzony jest ogon ściśniony. W tym stanie nazywają je *Kiánkami*.

Późniéy pokazują się jm przy nasadzie ogona dwie tylne nogi, które codziennie stają się kształtniejszemi i wyraźniejszymi. Pod takim kształtem nazywá je pospólstwo *Głowaczkami*.

Gdy nogi tylne zostały ukształcone: ogon jch zaczyna coraż widoczniéy maléć i niknąć: dychawki znikają powoli: na koniec skora pęka na bokach przodu ciała, i wypuszcza ukształcone nogi przednie: a tak zwierze to otrzymuje postać podobną postaci rodziców swoich. Ukształcony przyzwoicie Plaz rzędu tego zabawiwszy jeszcze dni kilka w wodzie: wreszcie ją opuszcza, i szuka dla siebie takiego miejsca pobytu, jakie gatunkowi jego Przyrodzenie przepisało.

Długość czasu, którój te zwierzęta potrzebują do odbycia wszystkich powyższych przemian, jeszcze dotąd z pewnością nieoznaczono.

W czasie przeobrażeń szkielet tych zwierząt składa się z bardzo miękkiey chrząstki. Przez cały przeciąg téy jch niekształtności żywią się one náywięcéy gniiącemi ciałami roślinnemi: dla tego téż znaydujemy w nich wnętrzości bardzo długie, szczuple, ślimakowato pozwiiane. W stanie zaś dojrzałości żyjąc Robákami, Owadami, jkrą Ryb, narybkiem i jnnemi ciałami zwierzęcemi, mają w stósunku do ciała znacznie krótsze i bardziéy odznaczone wnętrzości. Z tego postrzeżenia pokazuje się, że te zwierzęta podlégaia przemianom nietylko w zewnętrzney postaci, ale nawet i w całej wewnętrzney budowie ciała swego.

Do tego rzędu náleža náywrzaskliwsze stworzenia téy gromady. Większą jch liczba będąc bardzo żarłoczną, a żywiąc się náywięcéy Owadami, czyni ważne przysługi ogrodnictwu i gospodarstwu wiejskiemu. Przystąpmy na koniec do uwąg nad każdym rodzaiem w szczególności.

R O D Z À Y I.

G R Z B I E T O R Ò D. P I P A.

Pipa. *Fran.* Pipfrosch. *albo* Pipa. *Niem.*

Pysk tróykątny, bardzo spłaszczony, a przy głowie na boki rozszerzony, na dół pochylony. Głowa uważana wraz z pyskiem jest tróykątno klinowatą, nie znacznie w pysk przechodzącą, przy ciele garbatą. Oczy małe blisko brzegów szczęki górney. Szczęki bardzo płytkie bez warg. U brzegów szczęki górney miejscami płátki skóry strzępiastéy. Pieszcz bardzo obszerna bez zębów i bez języka. — Ciało eliptyczne, płaskie, drobno brodawkowatą

bardzo grubą skórą pokryte, niezgrabne. Nogi przednie szczupłe, cztero palczaste: palce u nich wolne, okrągłe, długie, ku końcowi coraz szczuplejsze: każdy czterema końcami w kształcie gwiazdy zakończony. Nogi tylne krótsze niż ciało, grube, niezgrabne, pięcio palczaste: palce u nich aż do końców błoną spięte, tępe. n. p. Rana Pipa. GL.

Wiemy dotąd o dwóch gatunkach *Grzbietoroda*. Obadwa żyją w Ameryce; a mianowicie jeden w prowincyi Surynám, a drugi w Kaiennie. Obadwa przebywają w ciemnych wilgotnych miejscach, jako to: w zakątkach domów spustoszałych, w starych piwnicach i t. p. Mieszkańcy tamtejsi jadają ich mięso. —

Ponieważ między ogólnemi uwagami przy wielu punktach napomknęliśmy, że *Grzbietorody* czynią wyjątki: wytkniemy więc tu przynajmniéj po krótko wszystkie te punkta, w których się one z innemi tego rzędu niezgadzają; a naprzód zaczniemy od zewnętrżności.

U wszystkich jnnych *Płazów Bezogoniastych* znajdziemy pysk ogrubny i mniéj więcéj tępy, a oczy na wierzchu głowy okazałe i do siebie zbliżone; przeciwnie u *Grzbietorodów* pysk jest bardzo płaski, klinowaty, a oczy drobne rozsunione i przy brzegach szczęki górney umieszczone. U wszystkich jnnych język w pasczy jest wyraźny; te zaś nie mają ani śladu języka. U jnnych uda nóg tylnych są od boków ciała niezawisłe, wolne i tylko na samym tyle w miejscu stawów swoich do ciała przytwierdzone; przeciwnie uda *Grzbietoroda* przyrosłe są do boków ciała jego. Przednie palce wszystkich są tępe; tych zaś gwiazdkowato zakończone. Na koniec, skóra na *Grzbietorodzie* jest tak grubą i tak twardą, że ją chrząstkowatą nazwać można.

Kościoskład *Grzbietoroda* zasługuje na szczególniejszą uwagę. Naprzód kości na przodzie głowy jego są tak cienkie, że jm nawet grubości oznaczyć niepodobną. Tył zaś jch czaszki jest nagle zgrubiał; i to jest przyczyną owéy garbatości jch głowy przy ciele a pochyłości pyska. Wystawy naboczne *piérwszéy* kości paciérzowéy są u nich nożykowate i znacznie dłuższe niż jnne, ale nie równie krótsze od wystaw *drugiéy* i *trzeciéy* kości grzbietowéy; gdyż u tych dwóch wystawy naboczne będąc proste, tak są niezmiernie przedłużone, iż na piérwszy rzut oka mają postać dość długich żeber.

Kość *krzyżowa* Grzbietoroda jest mocno spłaszczoną, cienką i potężnie na boki w takiéy postaci rozszerzoną, że widzianą wraz z kością kuprową, podobną jest zupełnie *dwóm obuchami z sobą spoioném i na jedném toporzystku osadzonem toporoni ciesielskiem*; czyli (co jedno znaczy) wydają się one podobnemi *obosiecznému, na toporzystku osadzonému toporowi ciesielskiemu*. Kości *łonowe* w tym rodzaju napotykamy podobne jak w jnnych Płazach tego rzędu; tu jednakże zachodzi ta różnica, że są bardziéy rozwarte, że koniec kości kuprowéy niewrasta między jch końce, i że się kończą w tyle ostrym wystającym końcem naksztált żelézca u kopii rycérskiéy. Znająduią się prawda różnice także w ukształceniu jnnych kości; lecz te jako mniéy uderzające, omiamy. Przydadź jednakże musimy, że samce tego rodzaju mają bardzo wielką, tróygraniastą, wydrążoną kość *krztaniową*, którą SCHNEIDER (*) pod nazwiskiem *cista sternalis* opisał. Ta kość opatrzona jest wewnątrz dwiema długiémi, ruchomémi kostkami. Te dwie wewnątrz *piérwszéy* umieszczone ko-

(*) Patrz w dziele: *Historiae Amphibiorum etc. auctore SCHNEIDER.* na stronie 263.

stki służą do zamykania kłapek krztaniowych. Po takim urządzeniu ich krztani można by się domyślać, że *Grzbietorody* mają głos donośny. Ten jednakże punkt przechodzą Pisarze tak obojętnie w milczeniu, że dotąd nawet tego nie wiemy, czy one mają głos jaki. Podobnéy kości krztaniowéy niepostrzegamy w żadnym innym rodzaju téy *Gromady*. —

Z sposobu, jakim się *Grzbietorody* rozmnażają, są one najszczególniejszymi stworzeniami; w całym albowiem królestwie dotąd znanych zwierząt nieznaidujemy podobnego przykładu. Rzecz ta godną jest uwagi naszéy.

Grzbietorody odbywają w prawdzie páwienie się podobnym sposobem jak wszystkie inne *Plazy*, które do tego rzędu należą; ta jednakże zachodzi tu różnica, że nie na wodzie, ale na lądzie. Po odbytem zapłodnieniu jáy, samiec zbiera je z ziemi, i kładzie na plecach samicy. Samica mając na plecach położone jaja swoje, leży z niemi dopóty spokojnie na słońcu, dopóki z wierzchu cokolwiek nie przyschną; albo raczéy dopóki nie poczuje, że się jéy w skórę wciskać zaczęły. W ten czas udaje się z niemi na wodę. Tu owe jaja rozjątrzywszy jéy dziwnym sposobem skórę na plecach, zagłębiają się w niéy; a każde jajo tworzy sobie w jéy grubéy skórze osobną, z wierzchu zasklepioną kómkę. Cała skóra na plecach samicy *Grzbietoroda* tak jest w tym czasie miejsce w miejsce podziurawioną, iż można ją śmiało przyrównać do woszczyń w ulu Pszczół: wszakże na plecach dorosłéy samicy można *dwieście* i więcej kómków naliczyć. W tych kómkach skóry grzbietowéy zostają dopóty jaja, a następnie i młode *Grzbietorody* zamknięte, dopóki wszystkich przemian nieodbędą. Gdy już są ukształcone: w ten czas zaczynają się na wierzchu otwierać wspomnia-

ne komórki, i wypuszczają zawartych w sobie więźniów. Według twierdzenia wiary godnych Badaczów, od czasu zapłodnienia jáy, aż do wyjścia dzieci z komórek skóry plecowéy, upływa trzy miesiące czasu. Dodaia nawet, że się już przed połową tegoż młode z jáy wylęgły. Czémże więc żyją przez tak długi czas w komórkach skóry matczynéy? — To dotąd jeszcze jest zagadką. Że zaś młode w skórze na plecach matki swoiéy rzeczywiście odbywają przeobrażenia: o tem przekonałem się na tym pięknym exemplarzu samicy *Grzbietoroda*, który się znayduje w zbiorze Zoologicznym Król. Warszawskiego Uniwersytetu, a który właśnie w tym czasie był złapany, gdy się dopiero niektóre dzieci z komórek wydobywać zaczęły.

Gdy wszystkie dzieci opuściły skórę grzbietową matki: w ten czas dopiero wychodzi ona z wody, i szuka zwykłego sobie miejsca pobytu. W krótcie po tém znaydujemy stare samice, z wygoioną i wyrównaną skórą na plecach. Młode zabawiwszy jeszcze dni kilkanaście na wodzie, jdą po tém w ślady rodziców swoich.

Jak w téy gromadzie, wzrost *Grzbietorodów* można uważać za okazały; gdyż od końca pyska do otworu odchodowego miéwają one po sześć calów długości.

R O D Z Á Y II.

R O P U C H A. B U F O.

Crapaud. Fran. Kröte. Niem.

Pysk tępy, na bokach przed oczami spleaszony. Głowa wielka lub mierną. Oczy duże, wypukłe na

wierzchu głowy. Na bokach tyłu głowy dwa duże gruzły. Paszcz bez zębów. Język wyraźny, w tył zwrócony. Ciało krótkie, pękate, skórą brodawkowatą pokryte, cieczą lépką powleczone. Nogi tylne długości ciała równaiące, pięć palczaste. Nogi przednie czéto palczaste. Palce u nóg przednich krótkie, tępe, spłaszczone, wolne. Palce nóg tylnych nierówne, długie: u jednych wolne, u drugich do połowy spięte, w juncy aż do końców spięte.

Liczymy przeszło dwadzieścia gatunków *Ropuch*, które tak są rozrzucone po kuli ziemskiej, że między niemi każda część świata ma po kilka sobie właściwych. Wszystkie mają postać smutną, chód powolny i czołgający się; rzadko podskakuiący. Głos jch jest chrapliwy, kruczący. Przy wydawaniu głosu nadymają podgardle. Wszystkie prawie są zwierzętami nocnymi; dzień albowiem przepędzają one w miejscach cienistych, a pod wieczór wychodzą na żér. Żywią się náywięcéy Owadami, między którymi *Prędkonogi* są jm náyulubieńsze. Przeciawszy brzuch najedzoney *Ropusze* znayduiemy popolicie w jéy żołądku znaczną liczbę wymienionych Owadów, z których náyczęściéy większą część jeszcze jest żywą. Podobnie powoli duszący swą zdobycz żołądek poznaliśmy dawniéy u *Kozodoia* (*). *Ropuchy* stają się pastwą *Jézów* i *Sów*, a w dni pochmurne także *Čapel*, *Bocianów* i t. p. Ptaków brodzących. Cała skóra *Ropuch* najężoná jest drobnémi brodawkami, albo raczéy gruzłami, z których dwa *nauszne* (*parotis*), czyli na bokach tyłu głowy będące, są náywiększe. Z wszystkich gruzłów sączy się jm (gdy chcą) lépká, gryzącá (*caustique*), mniéy więcéy nie przyjemnie woniejącá ciecz; którą jednym słowem *ropa* nazwać by można. Taká postać z jednawszy jm od dawna nazwisko *Ropuch*, dała oráz

(*) *Kozodóy* Pták, Patrz w Tomie II. na stronie 150. i na następny.

powód, że je pospólstwo niesłusznie o jadowitość posadza. To posądzanie zdaie się mieć na pozór słuszność za sobą. Jakoż, gdy przypadkiem Pies weźmie w pysk żywą *Ropuchę*: rzuci ją natychmiast, a tárzając się po tém po ziemi, wypuszcza z pyska tak spienione śliny, jak gdyby go choroba wściekłości napadała; lecz skoro się tylko wody napije: przestaje się ślinić, i wraca do dawnéj wesołości. — Podobnież jeżeli miáwszy *Ropuchę* w reku, potrzebny sobie oczy palcami téżże ręki: uczuiemy w nich ból nieznośny; lecz skoro wymiemy je od razu wodą czystą: ból ten ustaie, i złych skutków za sobą nie pociągá. Uryna *Ropuch* jeszcze bardziéj jest gryzącą niż ropa jch skóry. Mimo to wszystko nie można je nazwać jadowitémi w ścisłym znaczeniu.

Wewnętrzna budowa *Ropuch* i sposób jch rozmnażania się są takie, jakieśmy w ogólnych uwagach nad tym rzędem wykázali. Tém się jednakże różnią od trzech następnych rodzajów, że mają w oczach źrzenice podobnie ściągalne jak *Zbiki* w gromadzie *Ssących*.

Trwałość życia *Ropuch* godną jest náywiększego podziwienia. Przy łamaniu odwiecznych skał wapiennych znáydują je czasem żywe w takich wydrążeniach kamienia, które nawet przystępu powietrza nie miały. Jak więc długo, i czém one żyły zamknięte szczelnie w szród masy kamienia wapiennego? — To pytanie jest trudném do rozwiązania. — Dopiero nadmienione znáydowania jch w skałach były pobudką dla Akademików francuzkich do następującego doświadczenia. Wsadzili oni kilka *Ropuch* w umyślnie zrobione wydrążenie w kamieniu wapiennym, zamknęli je szczelnie pokrywą z tegoż kamienia; i dla tém większój pewności kázali tę pokrywę przytwierdzić tynkiem gipsowym. Tak zamknięte bez żywności i bez przystępu powietrza

zakopali je z kamieniem na kilka stóp głęboko w ziemi; a gdy je po dwóch latach kázali wydobydź: znaleźli je żywe.

Ropuchy udują się w jesieni do nór podziemnych, które sobie same grzebią. W nich przepędzają zimę w śnie letargicznym. Na wiosnę ożywszy, szukają wód stojących, i w tychże odbywają pąrczenie się.

Z przyczyny wáżnych róźnic dzielimy ten rodzaj na *cztery* następujące oddziały, przy których widzimy się zniewolonými do opisania szczegółowego kilku przynáymniéy gatunków.

a. *Palec przyszrodkowy tak od jnnych palców odsuniony, że wszystkie cztery stopy mają kształt rąk ludzkich. Palce tylne u samic wolne, u samców zaś do połowy spięte.*

Do tego oddziału náleży *jeden* gatunek, a tym jest :

1. Ropucha rogatá *Bufo cornutus*.

Rana cornuta. GL.

Cecha. *Żółtá, na plecach wązko rudo smugowana, z białą szeroką szaro nakropioną smugą na grzbiecie. Nogi rudo i żółto pęgowane. Pąszcz nadzwyczaj wielká. Wierzchnie powieki na oczach w kształcie wysokich stożków.*

Ta Ropucha żyje w wodach słodkich południowéy Ameryki, a mianowicie w prowincyach Wirginii i Surynamu. Jest ona pewno náydziwacznieyszém i náyszkardnieyszém stworzeniem w téy gromadzie. Jéy ciało uważane wraz z głową jest jajem.

wate; przy nogach przednich nąyszérsze, na całéy powierzchni u dorosłych drobnémi ostro kończystémi kolcami najéżone. Głowę má nad miarę wielką i szérszą niż ciało, a otwór pasczy tak obszérny, że aż do bark застаie. Jéy miékkie powieki na oczach mają postać wysokich stożkowatych rogów. Słowem, w całéy téy gromadzie nie znáydziemy podobnego jéy potworu. Doróstá ona dość znaczney wielkości. Amerykanie przypisuiąc jéy własność czyszczenia wody, są dlá niéy dość wzglédnymi. Zdaje się, że ten oddział będzie z czasem stanowić osobny rodzaj; dotąd albowiem wewnétrzna budowa tych Plazów jescze przyzwoicie nie jest znana.

b. *Palce wszystkie w jednéy płasczyźnie ustawione, do siebie zbliżone, i u wszystkich nóg w obu płciach wolne. Pascz miernie obszérna.*

Do tego oddziału wiemy w Europie o dwóch gatunkach; a témi są:

1. Ropucha solná. *Bufo salsus,*

Rana salsa. GL.

Cecha. *Na wierzchu rudawo oliwkowatá, na spodzie białawá: całá czarno plamistá. Nogi i palce na wierzchu rudo i rdzawo pręgowane; na spodzie jednostaynie płowe.*

Ten mały, zaledwie Żabce drzewnéy wyrównywiający gatunek Ropuch znáyduje się dotąd tylko w państwie Salcburgskiém, a mianowicie w probostwie Bercholdsgaden na granicy Bawarskiéy. W czasie párzenia się żyje ta Ropucha w słonych stojących wodach, w których także i jéy poczwarki przeobrażenia swoje odbywają; resztę zaś lata przepędzá ona w mieyscach ciemnych. Wziętá w rękę nie wydaie

żadnéj woni, i nie powłóczy się flegmą: czém różni się od jnnych dotąd znanych Ropuch.

2. Ropucha krzyżowá. *Bufo calamita*.

Rana Bufo. var. β . GL.

Cecha. Na wierzchu brudno oliwkowatá, na spodzie popielatá rudło plamistá. Wzdłuż grzbietu prostá, siarczysto żółtá smuga. Boki ciała wężykowatą żółtawo czerwoną smugą oznaczone. Pod przednią dłońią sęczek rogowy.

Oprócz czasu párzenia się, resztę lata przepędzą ta Ropucha na suchéj ziemi. Lubi nadewszystko mieysca wyniosłe, jako to mury spustoszone i skały, po których łazi szybko i zręcznie. Na równéj ziemi nigdy niepodskakuie, ale biega może náyprędzéj z wszystkich tego rodzaju. Drażnioná wydaie z siebie mocny smród czonsku albo raczéj prochu strzeleckiego. Samce mają głos donośny. SCHNEIDER nazywá ten gatunek *Bufo cruciatus* (Kreuzkröte. Crapaud-des-jones.)

c. Palce wszystkie zbliżone, w jednéj płaszczyźnie ustawione. U nóg tylnych palce do połowy błoną spięte.

Ten oddział jest dość obfity w gatunki; lecz w Europie żyje tylko gatunek następujący.

1. Ropucha popielatá. *Bufo cinereus*.

Rana Bufo. var. α . GL.

Cecha. Ciało na wierzchu oliwkowato popielate rudémi chmurkowatými plamami upstrzone;

na spodzie zaś prawie jednostayne szare. Oczy czerwone. Gruzły nauszne bardzo duże.

Jest to w całey Europie náypospolitszą, náybardziéy pękatą i nayokazalszéz wielkości dorastaiącą *Ropucha*. Dzień przepędzà ona w ciemnych zakątkach domów, w piwnicach i w nórach podziemnych; wieczorem wychodzi na żér. Chód má náypowolniejszy. W młodym wieku bywà jednostaynie popielatą ceglastémi brodawkami posianą. Samce zawsze są ciemniejsze niż samice. Ona to bywà náyczęściéy znáydowanà w takich mieyscach, do których podług wszelkiego podobieństwa przez długi szereg lát nawet przystępu powietrzà mieć nie może. Swiérzym tego dowodem jest exemplàrz z tego gatunku *Ropuchy*, który się znáyduie w Gabinecie Zoologicznym Król. Warszaw. Uniwersytetu, a który nám przysłàł z Sieradza *Jàn Tomorowicz* (*). O téy *Ropusze* rzecz jest następuiàcà:

W mieście Sieradzu kopano rowy dlà fundamentu pod nowo wystawić się maiący dom. Grabarze ci nie mogąc się dobrać stałego gruntu, a przekopawszy już *trzy wàrstwy* przez zmiany losów od niepamiétnych czasów zasypanego *bruku*, którego trzecià wàrstwa była na sześć łokci głęboko w ziemi: natrafili na kłodę debu czàrnego dnia 12. Czerwca 1820 roku. Gdy włàśnie zajéci byli wywàżaniem téy kłody: nadszedł tam przypadkiem Pàn Tomorowicz; a skoro owà kłoda z mieysca wyruszonà została: postrzegł pod nią żyjàcà lecz wynédznią *Ropuchę popielatà*. Wziàł ją do domu swego, gdzie

(*) *JÀN TOMOROWICZ Med: i Chirurg: Doktor, Lekàrz Sztabowy w Woysku Polskim*, Mąż znany równie z głębokiéy znaiości sztuki lèkarskiéy i z gòrliwosci o dobro nauk, jak z uymuiàcéz przyjemności charakteru.

jeszcze trzydzieści trzy dni żyła; a gdy zdechła, przysłał ją w spirytusie do tutejszego zbioru Zoologicznego. — Jak długo ta Ropucha była więziona w takiej głębokości pod wspomnianą kłodą, i czemu tam żyła? — trudno nawet pozornego uczynić przypuszczenia.

d. *Palce wszystkie zbliżone, w jedney płaszczyźnie ustawione. U nóg tylnych palce aż do końców błoną spięte.*

Ten oddział jest náybogatszy w gatunki. W samej Europie znamy jch cztery; a te są:

1. Ropucha płomienistá. *Bufo igneus.*

Rana Bombina. var. α. GL.

Cecha. *Na wierzchu jednostaynie ciemno oliwkowatá; na spodzie zaś błękitnawo-czarnými i ognisto-czerwonými plamami upstrzoná. Górna warga i nogi czarno plamiste.*

Ta Ropucha jest u nas dość pospolitá w płytkich stojących, trawą lub krzakami zacięzionych wodach. Dorostá wielkości *Zabki drzewnéj*. Skacze po suchéj ziemi podobnie jak *Zaby*. Samce mają głos donośny. U wsadzonéj do spirytusu owe pięknie czerwone plamy na spodzie ciała stają się albo płowe albo blado cielisto czerwone: z tąd niektórzy Pisarze opisując ją podług exemplarzów w spirytusie zachowanych, dali jéj mylne opisy.

2. Ropucha rudá. *Bufo fuscus.*

Rana Bombina var. γ. GL.

Cecha. *Jasno rudá, ciemno rudými lub czarnými wyraźnými plamami różnéj wielkości i kształtu upstrzoná, wzdłuż grzbietu smugą białawą przyozdobioná.*

Żyie

Żyje w bliskości wód stojących. Drążnioną pryska w koło siebie z brodawek flegmą, wydaie mocny smród czosnku; i jeżeli się jest zbyt blisko przy niéy: zarażone powietrze jéy wyziéwami wyciska Człowiekowi z takim bólem łzy z oczów, jak gdyby się cybulę kraiało. Złapana zanogę tylną wydaie głos miaukliwy, i miota daleko za siebie uryną.—

3. Ropucha Jkronosz. *Bufo obstetricans*.

Rana Bufo. var. ♂. GL.

Cecha. *Mała, szara, na wierzchu czarnemi a po bokach białawemi kropkami upstrzona.*

Ta mała Ropucha z tego względu zasługuie na szczególniejszą uwagę, że samice jch wydaia większe jaja niż w jnnych gatunkach; a co osobliwszą, że każde jch jajo opatrzone jest długą błonawą nitką. Podobnych jay nieznaydziemy aż w gromadzie Skorupiaków. Po zwykłym między Płazami zapłodnieniu jay, samiec przywieszuie one za pomocą wspomnianych nitek do tylnych nóg samicy. — Z tak uczépionemi jaiami chodzi samica dopóty po ziemi, dopóki nienadéydzie czas wylégania się z nich poczwarek: w ten czas dopiero udaie się na stojącą wodę, w którę tylko tak długo zabawiá, dopóki się ciężaru z nóg nie pozbędzie. Ten gatunek czyni takiem postępowaniem wáżny wyátek między Ropuchami. Żyje on w umiarkowanych krajach Europy, a mianowicie okolicach górzystych.

4. Ropucha zmienná. *Bufo variabilis*.

Rana variabilis. GL.

Cecha. *Nogi tylne sześciopalczaste, z palcami bardzo nierównęj długości. Maść skóry zmienná.*
Tom III.

Ta Ropucha z dwóch względów zasługuje na osobną uwagę: naprzód, że ma u nóg tylnych po sześć palców, a przeto więcej niż inne dotąd znane zwierzęta. Ten szósty przybyszowy jęć palec jest náy mniejszy. Powtóre, że maść skóry swojej zmienia podobnie jak *Kameleon* lubo w innych wyrazach. Jeżeli się znáyduje w cieniu i w obojętnym stanie, na ten czas widzimy ją białą zielonemi różnemi wielkości plamami przyozdobioną i żółtymi brodawkami upstrzoną. Dráżnioną, gdy się nadmie zmienia na sobie miejsca białe w popielate. Wystawioną na upał promieni słońca staie się całą jednostajnie popielatą bez żadnych plam. Pod czas mocnego zimna jesiennego miejsca białe między plamami zielonemi zmieniają się na niey w cielisto czerwone. Wrzuconą w spirytus tło jęć staie się żółtawo szare, plamy zielone zmieniają się w oliwkowato brunátne, jęć brodawki przybierają maść brudno żółtą, i nadto pokazuie się u niey na bokach smuga rudą. *Ropucha Zmienną* jest u nás bardzo rzádką, i mieszka prawie wyłącznie w okolicach górzystych. Od końca pyska do otworu odchodowego miewá ona blisko półtrzecią całą długości. — Głos jęć podobny jest przerywanemu drzewi zgrzypieniu. —

Spodzielwám się, że mi Czytelnicy niebędą mieli za złe, że tu odstąpił od planu załączając opisy gatunków Europejskich; nikt albowiem nieopisał dotąd w języku naszym tych zwierząt; chciałem więc przynaymniéy nawiasowym sposobem zastąpić ten niedostatek.

R O D Z Á Y III.

Ż A B K A. H Y L A.

Raine. albo Rainette. Fran. Laubfrosch. Niem.

Pysk z przodu zaokrąglony. Głowa mierna. Pyszcz obszerna. Zęby w zuchwach bardzo drobne, liczne. Na podniebieniu u niektórych poprzeczny, przerwany rząd bardzo drobnych ząbków. Język wyraźny, w tył zwrócony. Oczy wypukłe na wierzchu głowy. Tył głowy bez gruzłów. Ciało przy tylnych nogach zeschuplone. Skóra na wierzchu ciała gładka, na spodzie drobno chropowata: cała ślismą powleczone. Nogi tylne dłuższe niż ciało. Palce u nóg zakończone mięsistymi, pod spodem lépkimi krążkami.

Do tego rodzaju należy przeszło dwanaście gatunków, które według jakości palców dzielimy na dwa następujące oddziały.

a. *Palce u wszystkich nóg wolne.*

Ten oddział zawiera w sobie większą część powyżej oznaczonych liczby tu należących gatunków, między którymi mieści się także gatunek w Europie zamieszkały; a tym jest:

1. Żabka drzewna. *Hyla arborea.*

Rana arborea. α. GL.

Cecha. Na wierzchu jednostajnie pięknie zielona; na spodzie płowa. Maść zieloną obrabia na bokach krzywą, żółtą, u spodu czarnobrzeżną smugą. Od nosdrzy przez oczy wąską czarną smugą. Zrzenica złocista.

Jle nám wiadomo, jést to jedyny gatunek z tego rodzaju, który zamieszkuje w Europie. Z przychyny powabnych maści ubarwień słusznie pomiędzy náypowabniéyszą zwierzetá téy gromady policzony byđź może. *Zabka drzewna* od końca pyska do końca ogona rzádko miéwá półtora cala długości. Dopiero w czwartym roku staie się płodną. Samce jéy przed nastąpić maiaćym desczém odzywaią się z swém przyjemném rechtaníem: z téy przyczyny bywaią one zamiast barometru po domach trzymane w słojach, do których jm codziennie kładą wilgotnéy trawy.

b. *Palce u wszystkich nóg błoną spięte.* n. p.
Rana palmata. LACÉP. (*Grenouille Patte-d'oie.*)

Ten oddział mieści w sobie tylko parę gatunków; a te są mieszkańcami strefy gorący.

W ogólności rodzaj *Zabki* obeymuie náypowabniéyszemi i náyżywszemi maściami przyozdobione i náyprzyjemniéy dla oka ukształcone Płazy. Wszystkie łąą zrécznie po drzewach listkowatych, na których więszą część lata przepędzaią w uganianiu się za Owadami, które jch pożywienie stanowią. — Są więc z tego względu wielce użyteczne leśnictwu i ogrodnictwu, że wytepiaią wiele szkodliwych drzewom Owadów. Po ziemi skaczą szybko i zwinnie. W jesieni zanurzaią się w muł, i tam w obumarciu przepędzaią całą zimową porę roku. Za powrotem ciepłych dni wiosny wracaią do życia. Przy końcu wiosny parzą się w wodach stojących. Młode jch odbywszy zwyczajne wszystkiém przeobrażenia w wodzie, udaia się na drzewa; lecz maści jch skóry dopóty mniéy są powabne, dopóki się niestaną zdatnémi do płodzenia: co zwykle przed trzecim rokiem nie następuje. Samce *Zabek* maia głos czysty, donośny i dość przyjemny; a gdy go wyda-

ia rozdymaia podgardle w kształcie małego worka. Z tąd téż na jch podgardlu zawsze skóra bardziéj jest owisła niż u samic, a to jest jedyną zewnętrzną cechą, którą służy do poznania płci w tym rodzaju. W dziele SCHNEIDRA rodzaj ten opisany jest pod nazwiskiem *Calamita*.

R O D Z A Y IV.

Ż A B A. R A N A.

Grenouille. Fran. Frosch. Niem.

Pysk tępo klinowaty, gruby. Głowa lekko wypukła. Oczy wypukłe na wierzchu głowy. Tył głowy bez gruzłów. Pyszcz obszerna. Język i zęby podobne jak w rodzaju Żabki. Ciało podługne, przy tylnych nogach znacznie zeszupłone. Skóra na całym ciele gładka, rzadko ślegmą powleczone. Nogi tylne znacznie dłuższe niż przednie. Palce tępo kończyste bez krążków na końcach: przednie pospolicie wolne; tylne bardzo nierówne, albo całkiem albo w części błoną spięte.

W tym rodzaju, liczymy przeszło szesnście gatunków, z pomiędzy których tylko dwa następujące żyją w Europie.

1. Żaba wczesna. *Rana temporaria*.

Cecha. Na obu bokach głowy za okiem długą, klinowatą, brunatną plamą.

Ta Żaba pokazuje się zawsze przed wszystkiemi zaraz na początku wiosny: od tego więc zyskała sobie jedno znaczące nazwisko gatunkowe niemal w wszystkich językach. Náypospoliciéy znaydujemy ją na wiérzchu rudą a pod spodem płową; lecz moc tych maści tak jest niestała, że prawie każda здаie się do jnnego náležć gatunku: jedna tylko *brunatna* plama na bokach głowy, która się tuż za okiem zaczyna, jest niemylną jéy cechą. — Oprócz czasu párzenia się, resztę lata przepędza ona na suchéy ziemi upędzając się za Owadami i Robákami po polach, w ogrodach i w lasach. Jest bardzo żarłoczną; a przeto wielce użyteczną w gospodarstwie wiejskiém; bo wytępią nieprzyjaciół roślin. Młode Żaby tego gatunku po odbytych przeobrażeniach opuściwszy wodę, chowają się przed upałem słońca w trawie, pod krzákami i w szparach ziemi; a po deszczu ożeźwione chłodem wychodzą z kryjówek swoich czasem w tak wielkiéy liczbie, iż obudzają między pospółstwem to mylne mniemanie, że z deszczem na ziemię pospadały.

2. Żaba jadalná. *Rana esculenta*.

Cecha. *Na wiérzchu zieloną, czarniawémi plamami upstrzoną, z trzema prostémi żółtawémi smugami na plecach. Na spodzie żółtawo biatą.*

Jest to náypospolitszą i náywrzaskliwszą Żabą, która żyje w stojących wodach Europy. W jkrze Ryb i w nárybku czyni ona wielkie szkody; a staie się pastwą *Czaplowatych brodzących* Ptaków. Jéy to samce rozwodzą się aż do uprzykrzenia z głośném rechaniem i kruczeniem pod czas pięknych wieczorów wiosny. Jéy uda dają smaczny i zdrowy pokarm dla ludzi. Náypiękniéy zieloną widzimy ją podczas wiosny i na początku lata, lecz ku jesieni brudnieie ona coráz bardziéy. Na początku jesieni znaydujemy ją

czasem na całym wierzchu brunatną: tylko trzy w wspomniane żółtawe smugi na plecach są stałą jej gatunku cechą.

Z pomiędzy *Żab* w jnnych częściach świata zamieszkałych wspomnieć tu wypada naprzód o *Żabie olbrzymiej* (*Rana taurina*. Cuv.), która tak okazywały się dorasta wielkości, że czasem blisko ośm funtów francuzkich (*huit kilogrammes*) wazy, i może polykać młode Kaczęta. Żyje ona w Ameryce.

Drugą także w Ameryce mieszkającą, jest *Żaba dziwaczna* (*Rana paradoxa*. GL.), która z tego względu na szczególniejszą zasługuje uwagę, że w stanie *poczwarki* dochodząc blisko sześć cali długości, jest znacznie większą, niż gdy przyzwolta gatunkowi swemu postać otrzyma. Co większą? Potrzebując ona prawie całego lata do odbycia zwykłych przeobrażeń, już ma wszystkie cztery nogi przyzwolicie ukształcone; a jeszcze przez długi czas włoczy za sobą w wodzie wielki ściśniony ogon. Tak dziwaczna jej postać dała powód między tamtejszym pospółstwem do báyki, że się ta Żaba w Rybę przeistacza. *Żaba dziwaczna* przyzwolicie ukształconą jest na wierzchu zielonawą, na spodzie płową brunatnemi plamami upstrzoną; a na nogach ukośnemi brunatnemi prążkami naznaczoną. W tym stanie mało co jest większą od naszej *Żaby jadalnej*. Náyczęścięj znáyduie się ona w stojących wodach prowincyi Guiany.

Wszystkie *Żaby* skaczą po ziemi zwinnie i szybko. Pływają i nurzają się wybornie. Na drzewa nie wylazą. Zimą przepędzają w nule pod wodą prawie obumarłe; bo bez oddychania. Samce ich mają głos donośny rechcący, który náyczęścięj

wydaia pod czas párzenia się. Gdy krzyczą: pokazują się u nich na bokach głowy dwie duże, w pół przezroczyste, błonowe, wydęte bańki, czyli pęcherzki. A że tych pęcherzyków samice nie mają: są one więc jedyną zewnętrzną cechą do poznania płci w tym rodzaju.

Na tém kończymy uwagi nad rzędem *Płazów Bezogoniastych*. —

Tablica XVI. (115.)

R Z Ę D D R U G I. (31.)

JASZCZURKOWATE. *LACERTIFORMIA.*

Płazy czworonożne mające ciało długie, wysmukłe, nieznacznie w długi trwały ogon przechodzące: dychawki tylko w pierwszemy porze życia doczasowe, nietrwałe, późniemy znikające.

RODZAIK. GENERA.

- | | | |
|------------------------|---|--|
| =
o
o
en
o | { | zaokrąglony, ku końcowi zescuplony 1. Salamandra. <i>Salamandra.</i> |
| | | z boków ściśniony, lancetowaty . . . 2. Tryton. <i>Triton.</i> |

UWĄGI DO TABLICY XVI. (115.)

Płazy do tego rzędu należące mając ciało długie, wysmukłe, nieznacznie w długi ogon przechodzące, i czterema krótkiemi nogami opatrzone: są przeto całą zewnętrzną postacią swoją podobne *Jaszczurkom*. To jch pozorne podobieństwo było przyczyną, że je dawniemy do rodzaju *Lacerta* wmięszano. Tegocześnie ściślejsze postrzeżenia przekonały Badaczów, że te zwierzęta nietylko osobne rodzaje stanowić, ale nawet do jnnéy gromady zwierząt należec powinny. Przypátrzymy się jm bliżemy dla poznania powodów do tak wielkiéy zmiany w jch pomieszczeniu.

Gady znane pod ogólném nazwiskiem *Jaszczurek* (jak się wyżemy okazało) pokryte są albo wyraźnemi łuskami, albo drobnemi tarczami, albo skórą łuskowatą, albo téż skórą ziarnkowatą łuskowatą; — te zaś zwierzęta mają na całym ciełe skó-

re naga. *Jaszczurki* mają wyraźne otwory słuchowe;— te zaś są bez otworów słuchowych, a kości jch słuchowe pokryte są mięsem i skórą. U *Jaszczurek* znáydujemy język już chrząstkowaty szczupły, już mięsisty gruby, lecz zawsze jak zwykle końcem wolnym na przód zwrócony;— te zaś stworzenia okazują język podobnie urządzony jak u *Żab*. Wszystkie samce *Jaszczurek* opatrzone są wyraźnemi członkami płodnemi, a nawet większą między niemi liczba má jch po dwa;— przeciwnie samce tych zwierząt pozbawione są całkiem członka płodnego. Palce *Jaszczurek* kończą się ostrzemi rogowemi pazurami;— przeciwnie u tych zwierząt końce palców są miękkie, i nie mają ani śladu pazurów. W kościostładzie *Jaszczurek* znáydujemy kości *mostku* (*sternum*) wyraźne;— w tych zaś zupełnie jch niedostaje. *Jaszczurki* oprócz żeber właściwych mają znaczną liczbę żeber przybyszowych;— przeciwnie w tych nie znáydujemy tylko słabe szczątki żeber właściwych. Serce *Jaszczurek* składa się z dwóch uszek i z jednéj komórki;— tych zaś serce składa się z jednego uszka i z jednéj komórki. Nakoniec dzieci wszystkich *Jaszczurek* legną się z jáy zupełnie podobne rodzicom swoim;— przeciwnie dzieci tych zwierząt przychodzą na świat opatrzone płucami i dychawkami, i muszą wprzód kilka odbydź przemian, nim przyzwoią gatunkowi swemu otrzymania postać. — Któżby w tylu i tak ważnych różnicach nie uznał potrzeby przeniesienia tych zwierząt z pomiędzy *Gadów* do *Plazów*?

Wszystkie *Plazy* tego rzędu, które mieszkają w krajach zimniejszych, przepędzają zimę w śnie letargicznym. Ta jednakże zachodzi między niemi różnica, że żyjące stale w wodach stojących zanurzają się w muł pod wodą; te zaś, które mieszkają na lądzie, wążą w nory ziemne, które od jnych zwierząt znáyda opuszczone. Za powrotem ciepłych

dni wiosny odzyskawszy życie udaią się wszystkie na wody stojące. Tu samce wypuszczają z siebie nasienie bezpośrednio na wodę. To na los wypuszczone, mleczno białawe jch nasienie ma tyle przenikłości, iż dziwnym sposobem wciska się do ciała samic, i zapładnia w jch łonie będące jaja. Samice więc tych Płazów niosą jaja nie tylko zapłodnione, ale co większą? w niektórych gatunkach do tego stopnia dojrzałe, że te zaraz po wyjściu z łona samic pękają, i żywe dzieci na świat wydają. Dzieci wszystkich legną się mając na obu stronach szyi po trzy dychawki w kształcie krzewistych gałązek. Do przepuszczania zaś wody znaydujemy przy nasadzie jch dychawek na obu stronach szyi po jednym otworze, który pokrywa płatek skórzany; dychawki zaś sterczą niczem niezastłonięte. Wszystkie jch poczwarki nie mają w pasczy zębów.

Ponieważ w odbywaniu przeobrażeń zachodzą niektóre różnice: przeto o tych w uwagach nad rodzajami obszerniey mówić niezaniedbamy.

W czasie párzenia się po tém poznaemy samice od samców, że otwór odchodowy samic jest w tym czasie mocno nabrzmiąły i w kształcie półkuli wystający. Samice mają w sobie párzysty jaynik i párzysty jaiowód.

Wszystkie Płazy Jaszczurkowate mają na ciele skórę opiętą i mocno do niego przyrosłą. Wszystkie mają na oczach tylko po dwie powieki. Żywią się Owadami, Robákami, Slimakami i jkrą Ryb.



R O D Z A Y I. (5.)

S A L A M A N D R A. S A L A M A N D R A.

Salamandre. *Fran.* Salamander. *albo* Molch. *Niem.*

Głowa spłaszczona. Pysk tępy, z przodu zaokrąglony. Paszcza mierna. Zęby w zuchwach jednym rzędem bardzo drobne, liczne. Wzdłuż na podniebieniu ząbków podobnych dwa rzędy. Język w tył zwrócony, na przodzie do szczęki i szrodkiem do podgarbła przyrośły. Grzbiet bez grzebienia. Na całym ciele skóra naga, gładka, połyskująca, w niektórych miejscach widocznymi dziurkami opatrzoną. Ogon okrągły, ku końcowi nieznacznie coraz szerszy. Nóg krótkich cztery: przednie cztery tylne pięcio palczaste. Palce wszystkie krótkie, grube, wolne.

Liczymy do tego rodzaju pięć gatunków, z pomiędzy których najpospolitszym w Europie jest.

1. Salamandra ognista. *Salamandra terrestris.*

Lacerta Salamandra. „ GL.

Cecha. Ciemno czarna, połyskująca, dużymi ognistymi albo raczej pomarańczowo czerwonymi plamami upstrzona. Ogon krótszy niż ciało. Na bokach ciała rząd dziurek widocznych.

Zamieszkuje ona cieniste lasy w okolicach górzystych blisko miejsc bagnistych. Chód po ziemi ma bardzo leniwy i pełzający, a postać smutną i odrážającą. Najulubieńszym jej pokarmem są Dżdżowniki i Ślimaki drobne. Na obu bokach ciała widzimy u niej rząd gruzelków, z których każdy ma na środku dziurkę. Przez te dziurki wyciska ona

z siebie w czasie niebezpieczeństwa ciecż mlęczastą, gorzką i mocno woniejącą, którą jest trucizną, ale tylko dla bardzo słabych zwierząt. Powieści zatem o wielkiej jadowitości *Salamander* są podaniami przesadzonemi. Tę ciecż wypuszcza ona z siebie tem obficie, im większe dla siebie widzi niebezpieczeństwo. Puszczoną więc na zarzające się węgle, gasi je tą ciecżą, i może po nich przez niejaki czas chodzić bez szkody; t. j. dopóty, dopóki jęj starczy siła do wydawania z siebie wspomnianęj ciecży: po tém ginie na ogniu podobnie jak inne zwierzęta. Ta okoliczność spłodziła w starożytności niedorzeczną bąkę, że *Salamandry* żyją w ogniu. — MAUPERTUIS pisze, że otworzywszy samice *Salamandry*, znalazł w jęj dwóch jajowodach piętnaście jaj, a w każdym jajiu już żywe dziecko opatrzone czterema nożkami i ogonem mocno ściśnionym. Te dzieci były szare czarnymi kropkami upstrzone. — Stare miewaia popolicie od końca pyska do końca ogona po sześć calów długości. Na *Salamandrach ognistych* trzymanych w spirytusie plamy pomarańczowo czerwone zmieniaia się w płowe lub w blade żółte.

Wszystkie *Salamandry* w ogólności niosą w wodzie tak dojrzałe jaja, iż te zaraz przy wychodzeniu z łona samicy pękaia, i żywe dzieci na świat wydaia. Dzieci te opatrzone są czterema nogami, ogonem mocno ściśnionym i małemi dychawkami. Naprzód znikaia im dychawki i zarastaia otwory przy dychawkach, a gdy się im ogon zaokrągli: w ten czas dopiero opuszczaią wodę, i szukaia odpowiadającego swemu rodzajowi miejsca pobytu. Ostatnie ich przeobrażenie następuie popolicie dopiero przy końcu lata. *Salamandry* odbywaią sen zimowy w obcych norach podziemnych. Wszystkie maia wątrobę bardzo wielką.

R O D Z Á Y II. (6.)

T R Y T O N. T R I T O N.

Salamandre-Aquatique. albo Triton Fran.

Triton. Niem.

Głowa, zeby i język podobne jak w rodzaju Salamandry. Skóra na ciele nagą, bez połysku albo drobno brodawkowatą, albo gładką. Grzbiet samców (pospolicie) skórzanym grzebieniem opatrzony. Ogon długi, ściśniony, lancetowaty. Nóg krótkich cztery: albo wszystkie pięcio palczaste, albo przednie czworo a tylne pięcio palczaste, albo przednie trój a tylne czworo palczaste. Palce albo wolne albo błoną spięte.

Trytony okazują się w wodzie zwinnymi i dość wesołymi zwierzętami; ale wyiete na suche miejsca są jstotami náy niedoleźniejszymi. Mimo to, gdy jm w miejscu jch pobytu woda wyschnie, z náy-większym sileniem się pelzając po ziemi szukają jnnéj wody. Ztąd dziwić się niepotrzeba, jeźli się w czasie suchego lata nawet na górach Trytony pokazują. W takich latach z przyczyny niedostatku wody zdychá bardzo wiele poczwarek tak Trytonów jak jnnych Plazów; gdyż te nie mają tyle mocy, ażeby sobie jnnéj wody szukać mogli.

Doświadczeniami SPALLANZANIEGO wsławiły się szczególniéj Trytony z mocy odrádzania członków utraconych. Ucinał on jednemu i temuż samemu Trytonowi po kilka razy nogi; a za każdą razą odrastały mu nowe mające téż samę liczbę palców, ssta-wów i kości, jak w pierwszych; a do tego tak ukształcone, że na nich nie można było dostrzedz náy-mniejszego śladu skaléczałości. Sprawdzałem na

tych zwierzętach niektóre z doświadczeń tego znakomitego Badacza, i wyznać muszę z pociechą, że je skutek okazał niemylnymi. Nadto późniejsze doświadczenia pokazały, że Trytony zamknięte szczególnie w wydrążonych bryłach lodu, bardzo długo żyć mogą.

Trytony zapładniają się podobnym sposobem jak *Salamandry*; lecz jaia jch dopiero piętnastego dnia po zniesieniu zaczynają pękać. Młode *Trytony* legną się z jáy w postaci Rybek drobnych bez nóg i bez pletw, i mają na obu bokach karku po trzy wyraźne krzewisto gałązkowate dychawki, a wewnątrz ciała płuca pąrzyste. Naprzód wyrastają jm nogi przednie; a gdy te przyzwroicie ukształcone zostały: zaczynają się jm pokazywać nogi tylne. Wreszcie, gdy wszystkie jch członki otrzymały kształt stósowny, poczynają jm znikać dychawki. Te jch przeobrażenia odbywają się tak powoli, że je częstokroć przed pozbyciem się dychawek zima zaskakuje. Co jeżeli nastąpi: *Trytony* rosnąc ciągle, zachowują dychawki przez całą zimę, i dopiero utracają je za nadejściem wiosny. Wszystkie ukształcone *Trytony* odbywają sen zimowy zanurzone w mule pod wodą.

Nie masz podobno między zwierzętami Grzbietnymi drugiego rodzaju, w którymby oznaczenie gatunków tak było trudne, jak w tym. To prawda, że samice większej liczby gatunków nie mają na grzbiecie skózanego grzebienia; ale cóż po tém? kiedy znaydują się także i takie gatunki, w których tak samiec jak samica są bez grzebienia. Nadto grzebień grzbietowy u tych samców, które go mają, tylko przez czas jch weselnych godów jest w całej okazałości swoihey: po czém maleje on do tego stopnia, że przy końcu lata na niektórych gatunkach zaledwie tylko mały śląd jego pozostaje. Podobnem

zmianom podlegą także maść ich skóry. Słowem, ażeby mieć w gabinetach pewnie oznaczone gatunki i płeć *Trytonów*, potrzeba je łowić przy końcu wiosny; w ten czas albowiem półkulistą wypukłość otworu odchodowego wyda samice, a jakość lub niedostatek grzebienia grzbietowego przy różnicy maści skóry ułatwią poznanie gatunku samców. Mimo tylu trudności liczymy dobrze rozróżnionych *dziesięć* gatunków *Trytonów*, z których następujące cztery żyją w słodkich wodach Europy.

1. Tryton plamisty. *Triton marmoratus*.

Salamandra marmorata. LATR.

Cecha. Nogi przednie cztery tylne pięć palczaste. Palce wolne, nierozszerzone. Grzbiet bez grzebienia, Skóra drobno brodawkowata. Wierzch ciała blado zielony, nieregularnemi, brunatnemi plamami upstrzony; spód ciała ciemno rudy z białemi kropkami.

2. Tryton grzebieniasty. *Triton cristatus*.

Salamandra cristata. LATR.

Cecha. Nogi przednie czworo tylne pięć palczaste. Palce wolne, nierozszerzone. Grzebień na grzbiecie w obu płciach ząbkowany. Skóra drobno brodawkowata. Ciało na wierzchu rude, na spodzie płowe: wszędzie okrągłemi czarnemi lub brunatnemi plamami upstrzone. Boki ciała białe kropkowane.

3. Tryton pstry. *Triton punctatus*.

Salamandra punctata. LATR.

Cecha. Nogi przednie czworo tylne pięć palczaste. Palce wolne, porozszerzane. Skóra gładka.
Grze:

Grzebień na grzbiecie samca pozaginany: samica bez grzebienia. Ciało na wierzchu rude, na spodzie płowe lub czerwone: wszędzie okrągłymi czarnymi lub brunatnymi plamami upstrzone. Na głowie prążki czarne.


4. Tryton pletwonogi. *Triton palmatus.*

Salamandra palmata. LATR.

Cecha. Nogi przednie czworó tylne pięcio palczaste. Palce błonę spięte. Wierzch głowy rudymi i czarnymi wężykowatymi prążkami ozdobiony. Grzbiet ciemno rudy. Boki ciała blado rude z okrągłymi brunatnymi lub czarnymi plamami. — Spód ciała jasno płowy bez plam. Samica bez grzebienia. U samca na grzbiecie grzebyk niski, a ogon nitką zakończony.

Wszystkie te cztery lepięty znane Europejskie gatunki Trytonów należą do liczby zwierząt drobniejszych; gdyż od końca pyska do końca ogona rzadko który dorasta pięciu calów długości. Wspomnieć tu musimy o gatunku *Salamandra gigantea*. BART. który mieszká w wodach Ameryki północnej, a który dorastając ośmiastu calów długości, jest z wszystkich dotąd znanych náywiększym.

Na tém kończymy uwagi nad rzędem Płazów Jaszczurkowatych.



Tablica XVII. (114.)

R Z Ę D T R Z E C I. (32.)

DYCHAWKOWATE. *BRANCHIATA.*

Plazy mające ciało długie, długim ściśnionym ogonem przez całe życie opatrzone: dychawki i płuca aż do zgonu trwałe, nóg cztery lub dwie.

RODZAJE. GENERA.

N o 5	{ cztery	przodnie czworo tylnie pięciopalczaste 1. Dychawkowiec. <i>Axolotus.</i>	
		przodnie tróje tylnie dwu palczaste 2. Proteusz. <i>Proteus.</i>	
		tylko dwie na przodzie; ciało przedłużone 3. Syrena. <i>Siren.</i>	

UWĄGI DO TABLICY XVII. (114.)

Plazy *Dychawkowate* różnią się tém od zwierząt rzędu poprzedzającego, że przez całe życie opatrzone są dychawkami i płucami. Jch dychawki niczém nie zasłonię, po trzy na obu bokach szyi, sterczą w kształcie krzewistych gałązek. Nadto w wewnętrznej budowie ciała okazują tę różnicę, że mają więcej kości w pąciérzu grzbietowym, a nierównie mniej i słabsze szcátki żeber.

Na wszystkich znáydujemy skórę opiętą i do ciała mocno przytwierdzoną. Wszystkie nie mają otworów słuchowych, a kości jch słuchowe ukryte są głęboko pod mięsem i pod skórą. U wszystkich znáydujemy język krótki gruby, mięsisty. Otwór odchodowy znáydujemy u nich podobnie jak w przeszłym rzędzie w podłuż pod nasadę ogona umieszczo-

ny. Jedne z pomiędzy nich żyją ustawicznie w wodzie; drugie zaś wychodzą czasami na ląd. Wszystkie są zwierzętami niedawno odkrytymi: dla tego też sposób ich rozmnażania się jeszcze nie został wysledzony. Poznanie tych zwierząt jest nader ważnym i przyjemnym przedmiotem dla prawych Badaczy, w nich albowiem znaleźli oni piękny a nieznanym przechód od zwierząt oddychających *płucami* do *Ryb* czyli do takich, które oddychają tylko za pomocą dychawek. Takich przechodowych (że tak powiem) zwierząt znamy dotąd tylko trzy rodzaje. Poznámy je bliżej.

R O D Z A Y I. (7.)

DYCHAWKOWIEC. *AXOLOTUS*.

Axolotl. Fran.

Głowa duża, płaska. Pysk krótki z przodu tępo przycięty. (Zęby żadne?). Oczy mierne, błona powleczone, blisko otworów nosdrzy umieszczone. — Dychawki wystające po trzy na obu stronach szyi. Ciało grube, długie, ślizgą skórą pokryte. Ogon długi, ściśniony, na wierzchu i na spodzie błoną rozszerzony, lancetowaty. Grzebień na grzbiecie skórzany niski, z ogonowym złączony. Nogi krótkie cztery: przednie czworo tylne pięć palczaste. Palce wolne, końcyste, bez pazurów.

Oprócz dopiero wyrażonych cech, u wszystkich dotąd znanych Płazów tego rodzaju postrzegamy to wspólne, że mają na bokach szyi przy głowie po trzy łuki chrząstkowe. Na każdym z tych łuków osadzona jest jedna długa dychawka w kształcie krzewistey

gałązki; a między temi łukami znaydujemy na obu stronach po cztery podłużne otwory, które mają związek z gębą, i służą do przepuszczania wody w czasie oddychania. Skóra na bokach jch głowy jest tak przedłużoną, że na obu stronach tworzy klapkę podobną skrzelom rybiem. Te klapki skórzane pokrywają jm wspomniane łuki wraz z otworami; ale dychawki całe z pod nich wystają.

Dychawkowców liczymy trzy gatunki; a te są następujące: 1. *Axolotus pisciformis*. n. (Siren pisciformis. SH.) który mieszka w jeziorze Meksykańskim, a który się w tamtejszym języku nazywa *Axolotl*. Jest on szary, czarnemi plamami upstrzony, i dorasta dziesięciu cali długości. — 2. *Axolotus lacertinus*. n. (Siren quadrupes. BART.) który się znayduje w wodach Luizyjanii, i dochodzi trzech stóp długości. — 3. *Axolotus Philadelphicus*. n. (la Sirène operculée. BEAUV.), który przebywa w wodach stojących w okolicy Filadelfii. Tak więc wszystkie trzy, dotąd żyjące gatunki znaydują się tylko w Ameryce. O jch sposobie życia nic dotąd pewnego nie wiemy. Niektórzy Naturaliści chcą utrzymywać, że te zwierzęta są poczwarkami dotąd nam nieznanymi wielkich Płazów Jaszczurkowatych. Przeciwnie mieszkańcy Ameryki utrzymują, że to są zwierzęta ukształcone, i zawsze takimi zostające.

Nóywiekszy z tego rodzaju gatunek żył niegdyś w Europie; ale już od niepamiętnych czasów zaginął. Między warstwami *Łupku pisarskiego* (*)

(*) *Łupek pisarski* (*Schistus graphicus*) kamień siwawo czarny, z którego robią tabliczki do pisania i do pokrywania dachów na domach. W tym to gatunku kamienia w kopalni Eningskiej na granicy Szwajcarskiej znaydują wspomniane odciski szkieletów *Dychawkowca europejskiego* obok mnożstwa kości rozmaitych Ryb i innych już nieistnących zwierząt.

w kopalni Eningskiej leżący nad jeziorem Konstancyjskim (*lacus acronius*) znaydowane z niego szkielety wynoszą po trzy stopy długości. Mniéj rozważni Pisarze zobaczywszy te w kamień wrosłe szkielety, niewiedzieć z kąd upatrzyli w nich podobieństwo z szkieletem ciała Ludzkiego, i ogłosili w pismach swoich, że znaleźli kości Człowieka, które potwierdzają rzeczywistość byłego potopu; nazwali bowiem te kości „*homo testis diluvii*.” Żaden jednakże z tych gorliwych ogłosicieli nie zwrócił na to uwagi, że się przy tych w kamień wrosłych kościach wyraźny długi ogon znayduje, i że kości nóg są za krótkie, ażeby w nich choć najmnieysze podobieństwo z kośćmi nóg i ramion ludzkich upatrzeć można. Pomiiam tyle jnnych uderzających różnic w budowie kości Człowieka. To prawda, że dotąd nigdzie między kośćmi kopalnemi nieznaleziono, i podobno nieznaydą kości ludzkich; gdyż te podlegają bardzo prętkiemu butwieniu. Mimo to, że niegdyś był straszny potop, jest i będzie prawdą niezawodną. Potwierdzą to miliony oczywistych dowodów.

R O D Z Á Y II. (8.)

P R O T E U S Z. P R O T E U S.

Protée. *Fran.* Proteus. *Niem.*

Głowa mierná. Pysk długi, płaski, z przodu zaokrąglony. Paszcz. mała. Zęby drobne w zuchwach jednym rzędem, a na podniebieniu dwiema rzędami. Oczy bardzo małe, ledwie widoczne, błoną powleczone. Dychawek na obu bokach szyć po trzy. Ciało długie, wysmukłe, lekko ściśnione. nieznacznie w ogon przechodzące, gładką skórą po-

kryte. Ogon ściśniony, prawie wszędzie równo wysoki, obosieczny. Nogi cztery bardzo małe: przednie tróje tylne dwu palczaste. Palce krótkie, wolne, bez pazurów.

Znamy dotąd tylko jeden gatunek; a ten jest następujący:

1. Proteusz cielisty. *Proteus angvinus*. LAUR.

Cecha. Cały jednostajnie cielisty w blado różowe przebiegający. Dychawki jasno koralowo czerwone. Ogon krótszy niż ciało.

Zamieszkuje on wody w grocie podziemnej będące w Karnioli. Dorasta dwanaście cali długości. W wodzie jest on żeżwem i wesolem zwierzątkiem; lecz wydobyty z niej i położony na suchej ziemi, staie się nąyniedołężniejszem stworzeniem. Nigdy na brzeg nie wychodzi. Za życia cały mając maść delikatnego ciała ludzkiego, a dychawki pięknie koralowo czerwone: jest dość powabnym dla oka. Trzymany w spirytusie staie się cały blado płowym. O jego sposobie życia i rozmnażania się nic jeszcze pewnego nie wiemy.

RODZAJ III. (9.)

SYRENA. SIREN.

Siréne. Fran. Sirene. Niem.

Pysk krótki, tępy, z przodu zaokrąglony. Głowa podobna głowie Sumy. Pyszcz obszerna. Zęby duże, klinowate, kilkoma rzędami usta-

wione, nie jadowite: w szczęce górney większą liczba ich rzędów niż w dolney. Oczy na bokach głowy małe. Dychawek na obu stronach szyi po trzy. Ciało mocno przedłużone, lekko ściśnione, szczupłe, wysmukłe, nieznacznie w ogon przechodzące, skórą gładką pokryte. Ogon ściśniony, prawie wszędzie równo wysoki, obosieczny. Nogi tylko dwie, krótkie, palcami krótkiemi wolnemi zakończone. n. p. *Siren lacertina*. LIN.

Spodziévám się, iż Czytelnicy moi nie potrzebuia ostrzeżenia, że te *Syreny* o których mówimy, dalekiemi są w postaci i w obyczajach od owych mitologiczno báiecznych *Syren*, które pokazując z wód morskich do połowy powabne ciało swoje, zachwycającém śpiewaniem żeglujących w sen wprawiały; a potem jch pożerały. Takie *Syreny* nie jstnęły nigdy na kuli ziemskiej. Splodziła je tylko wyobraźnia Poetów i Malarzy.

Syreny, o których właśnie mówimy, są to Płazy rude, mające głowę podobną głowie *Sumy*, a ciało podobne ciału *Węgorza*. Dorastają trzech stóp długości. Żyją w Ameryce, a mianowicie w prowincyi Karoliny. Przebywają w wodzie i na lądzie. Náyczęścięj jednakże znáydują się w tamtejszych jeziorach i na ryżowych wodą zalanych polach. Żywią się Owadami, Robákami, Mięczákami drobnými, Gądami i Płazami jnnými. Náyulubieńszym jednakże jch pokarmem są Węże. Głos wydają donośny podobny głosowi *Kaczki*. Według twierdzenia CUVIERA znáydujemy w jch grzbiecie dziewięćdziesiąt páciérzy kościanych, a tylko ośmiu pár żeber wyraźne szczátki; kości zaś miednicy ani śladu nie mają. Wiemy dotąd z pewnością tylko o jednym gatunku *Syren*. Jch sposób rozmnażania się jest jeszcze niezmany.

Lubo te *Syreny* już za czasów LINNEUSZA były znane: mimo to jeszcze dotąd niezgadzaia się Autorowie w opisach jch nóg. Jedni twierdzą, że Syrena má u obudwóch nóg po pięć palców, nie wspominając o tém: czy má u nich pazury lub nie. Drudzy piszą, że obie nogi *Syreny* mają tylko po cztery, ostrými pazurami uzbroione palce. Jnni na koniec utrzymują, że u nóg *Syreny* znáydują się po cztery palce bez pazurów. Komuż dadź wiarę?—Wszyscy jednakże zgádzaia się na to, że palce tych zwierząt są krótkie i wolne, czyli bloną nie spięte. Te zwierzęta są bardzo rzádkie, i należą w zbiorach Zoologicznych na stałym lądzie Europy do liczby náywiększych osobliwości. GMELIN do jnych zamieszań w dziełach LINNEUSZA dodał i to, że ten rodzaj zupełnie opuścił.

Oprócz dwóch nóg wyraźnych i oprócz długich wystających dycháwek, całą wreszcie zewnętrzną postacią ciała; równie jak ukształceniem kości w szkielecie, czynią *Syreny* piękny przechód do gromady Ryb. —

Na tém kończymy uwagi nad gromadą Płazów.

Koniec Tomu trzeciego.

SPIS NAZWISK

GROMAD, RZĘDÓW, POKREWIEŃSTW

i

RODZAIÓW

w Tomie trzecim zawartych:

A.

Stronā.

Ameiwa . . . Kl. . . Ameiwa . . . Lacép. . 70.

 $\bar{B}.$

Bazyliſzek - - - Kl. - - Basiliscus - - - Dau. - 43.

Bezogniaste *Ecaudata* 122.

Brodawkowaz . . n. . . Actochordus . . . Horn. . 122.

C.

Chersydra - - - - **a.** - - **Chersydrus** - - - **Cuv.** - 121.

D.

Dasznik - - - n. - - Bungarus - - - Opp. - 107.

Dwunożne *Bipedes* 76.

Dychawkowate *Branchiata* 178.

Dychawkowice - - n. - - Axolotus - - - - n. - - 179.

Dzióbosczek - " - n. - - Gavial - - - - - Fau. - - 32.

E.

Elada - - - - n. - - Scincus - - - - Dau. - 72.

G.

GADY REPTILIA 2.

Gekon - - - - n. - - Gecko Geoff. 63.

									Strona.
Grzbietoród	-	n.	-	Pipa	-	-	-	Dau.	149.
Grzebieniak	-	n.	-	Lophyrus	-	-	-	Dum.	42.
Grzechotnik	-	Czenp.	-	Crotalus	-	-	-	Lin.	94.

H.

Huryia	-	n.	-	Hurria	-	-	-	Dau.	104.
--------	---	----	---	--------	---	---	---	------	------

I.

Jadowiec	-	n.	-	Pseudoboa	-	-	-	Opp.	97.
Jaszczur	-	n.	-	Dracoena	-	-	-	Dum.	39.
Jaszczurowąż	-	n.	-	Chalcides	-	-	-	Dau.	74.
Jaszczurka	-	Rzq.	-	Lacerta	-	-	-	Lin.	71.
JASZCZURKI	-	-	-	SAURII	-	-	-	-	24.
Jaszczurkowate	-	-	-	Lacertiformia	-	-	-	-	169.
Jgłonos	-	n.	-	Langaia	-	-	-	Sh.	102.

K.

Kaiman	-	n.	-	Alligator	-	-	-	Cuv.	35.
Kameleon	-	Kl.	-	Chamaeleo	-	-	-	Dum.	51.
Kleszczonogie	-	-	-	Scandentes	-	-	-	-	51.
Kolcogon	-	Kl.	-	Stellio	-	-	-	Cuv.	61.
Korbacz	-	Knap.	-	Scytale	-	-	-	Latr.	97.
Krokodyl	-	Kl.	-	Crocodylus	-	-	-	Briss.	35.

L.

Legwan	-	Kl.	-	Jguana	-	-	-	Cuv.	68.
--------	---	-----	---	--------	---	---	---	------	-----

Ł.

Łuszczałka	-	n.	-	Cordylus	-	-	-	Dau.	59.
------------	---	----	---	----------	---	---	---	------	-----

M.

Mackowąż	-	n.	-	Erpeton	-	-	-	Lacép.	101.
Marmórka	-	n.	-	Polychrus	-	-	-	Cuv.	69.

N.

Nagie	-	-	-	Esquamati	-	-	-	-	129.
Nagoscór	-	n.	-	Coecilia	-	-	-	Lin.	132.

Nibywał - - - n. - -	Seps - - - - -	Dau. -	74.
Nierównoluskie - - - -	Heterodermes - - - -	-	90.

O.

Okularnik - - - n. - -	Naja - - - - -	Lau. -	114.
Ostrzegacz - - - n. - -	Monitor - - - - -	Cuv. -	40.

P.

Padalec - - - - Rzę.	Angvis - - - - -	Lin. -	125.
Pęcherzowiec - - - Kl.	Anolius - - - - -	Cuv. -	66.
Płaskogon - - - n. - -	Uroplatus - - - -	Dum. -	45.
PŁAZY - - - - -	SIRENIA - - - - -	-	135.
Położ - - - - - Rzę.	Boa - - - - -	Lin. -	98.
Położowąż - - - n. - -	Python - - - - -	Dau. -	104.
Proca - - - - - Kl.	Erix - - - - -	Dau. -	100.
Proteusz - - - - n. - -	Proteus - - - - -	Lau. -	181.
Przodonóg - - - n. - -	Chirotes - - - - -	Cuv. -	79.
Przyrosłojęzykie - - -	Annexilingues - - -	-	28.
Pstróżka - - - n. - -	Acontias - - - - -	Cuv. -	126.

R.

Ropucha - - - - Rzę.	Bufo - - - - -	Lau. -	153.
Równoluskie - - - -	Homodermes - - - -	-	118.
Rybowąż - - - n. - -	Pelamis - - - - -	Cuv. -	121.

S.

Salamandra - - - Rzę.	Salamandra - - - -	Rzę. -	172.
Samolusk - - - - Kub.	Ophisaurus - - - -	Dau. -	123.
Sercogłów - - - n. - -	Trigonocephalus - -	Lacép.	110.
Skrzydlate - - - -	Alati - - - - -	-	47.
Slepucha - - - - n. - -	Typhlops - - - - -	Schn. -	127.
Smok - - - - - Kl.	Draco - - - - -	Lin. -	47.
Sterczołusk - - - n. - -	Agama - - - - -	Dau. -	58.
Syrena - - - - - Kl.	Siren - - - - -	Lin. -	182.
Szerokogon - - - n. - -	Platurus - - - - -	Latr. -	116.
Szponogon - - - n. - -	Acanthophis - - - -	Dau. -	103.
Szylkret - - - - n. - -	Chelonia - - - - -	Brong. -	13.

T.

Stronę.

Tróyrzęd - - - n.	Trimeresurus - - -	Lacép.	103.
Tryton - - - n.	Triton - - -	Lau.	174.
Tyłonóg - - - n.	Bipes - - -	Lacép.	77.

W.

Wartnik - - - n.	le Sauveguarde - - -	Cuv.	41.
Wąż - - - Rzq.	Coluber - - -	Lin.	105.
Węże - - -	Serpentes - - -	-	80.
Wiosłoważ - - - n.	Hydrus - - -	Schn.	120.
Wodożółw - - - n.	Emys - - -	Brong.	17.
Wolnojęzykie - - -	Solutilingues - - -	-	37.

Z.


Zatoczek - - - n.	Tortrix - - -	Opp.	127.
Zawadyiasz - - - Kl.	Calotes - - -	Cuv.	60.
Zdradnica - - - n.	Elaps - - -	Schn.	103.
Zmieniacz - - - n.	Trapelus - - -	Cuv.	59.
Zwitek - - - n.	Amphisbaena - - -	Lin.	131.
Zwykłonogie - - -	Agiles - - -	-	55.

Ż

Żaba - - - Rzq.	Rana - - -	Lin.	165.
Żabka - - - n.	Hyla - - -	Lau.	163.
Żabojaszczur - - - n.	Lacertus - - -	Seb.	57.
Żółw - - - Rzq.	Testudo - - -	Lin.	15.
Żółwiak - - - n.	Trionyx - - -	Geoff.	19.
Żółwie - - -	Chelonii - - -	-	5.
Żółwiozwierz - - - n.	Chelys - - -	Dum.	22.

Ż

Żmija - - - Rzq.	Vipera - - -	Rzq.	109.
Żmizożółw - - - n.	Ophichelone - - -	n.	21.



INDEX NOMINUM

CLASSIUM, ORDINUM, FAMILIARUM

et

GENERUM

in tertio volumine contentorum.

A.

				<i>Pagina.</i>
Acanthophis . . .	Dau.	Szponogon . . .	n.	103.
Acontias . . .	Cuv.	Pstróżka . . .	n.	126.
Acrochordus . . .	Horn.	Brodawkowąż . . .	n.	122.
Agama . . .	Dau.	Stérczołusk . . .	n.	58.
Agiles . . .		Zwykłonogie . . .		55.
Alati . . .		Skrzydlate . . .		47.
Alligator . . .	Cuv.	Kaiman . . .	n.	35.
Ameiva . . .	Lacép.	Ameiwa . . .	Kl.	70.
Amphisbaena . . .	Lin.	Zwitek . . .	n.	131.
Angvis . . .	Lin.	Padalec . . .	Rzq.	125.
Annexilingues . . .		Przyrośłojęzykie . . .		28.
Anolius . . .	Cuv.	Pęcherzowiec . . .	Kl.	66.
Axolotus . . .	n.	Dychawkowiec . . .	n.	179.

B.

Basiliscus . . .	Dau.	Bazyliszek . . .	Kl.	43.
Bipedes . . .		Dwunożne . . .		76.
Bipes . . .	Lacép.	Tyłonóg . . .	n.	77.
Boa . . .	Lin.	Położ . . .	Rzq.	98.
Branchiata . . .		Dychawkowate . . .		178.
Bufo . . .	Dum.	Ropucha . . .	Rzq.	153.
Bungarus . . .	Opp.	Dasznik . . .	n.	107.

C.

Pagina.

Calotes	Cuv.	Zawadyiasz	Kl.	60.
Chalcides	Dau.	Jaszczurowąż	n.	74.
Chamaeleo	Dum.	Kamelson	Kl.	51.
Chelonia	Brong.	Szylkret	n.	15.
CHELONII		Żółwie		5.
Chelys	Dum.	Żółwiozwierz	n.	22.
Chersydrus	Cuv.	Chersydra	n.	121.
Chirotes	Cuv.	Przodonóg	n.	79.
Coecilia	Lin.	Nagoscór	n.	132.
Coluber	Lin.	Wąż	Rzq.	105.
Cordylus	Dau.	Łuszcátka	n.	59.
Crocodylus	Briss.	Krokodyl	Kl.	33.
Crotalus	Lin.	Grzechotnik	Czenp.	94.

D.

Draco	Lin.	Smok	Kl.	47.
Dracoena	Dum.	Jaszczur	n.	39.

E.

Ecaudata		Bezogoniaste		142.
Elaps	Schn.	Zdradnica	n.	108.
Emys	Brong.	Wodożółw	n.	17.
Erix	Dau.	Proca	Kl.	110.
Erpeton	Lacép.	Mackowąż	n.	101.
Esquamati		Nagie		129.

G.

Gavial	Fau.	Dzióboszczek	n.	52.
Gecko	Geoff.	Gekon	n.	63.

H.

Heterodermes		Nierównożuskie		90.
Homodermes		Równożuskie		118.
Hurria	Dau.	Huryia	n.	104.
Hydrus	Schn.	Wiosłoważ	n.	120.
Hyla	Lau.	Żabka	n.	163.

I.

				Pagina.
Jguana	Cuv.	Legwan	Kl.	68.

L.

Lacerta	Rzq.	Jaszczurka	Rzq.	71.
Lacertiformia		Jaszczurkowate		169.
Lacertus	Seb.	Żabojaszczur	n.	57.
Langaia	Sh.	Jgłonoś	n.	102.
Lophyrus	Dum.	Grzebieniak	n.	42.

M.

Monitor	Cuv.	Ostrzegacz	n.	40.
-------------------	------	----------------------	----	-----

N.

Naja	Lau.	Okulárník	n.	114.
----------------	------	---------------------	----	------

O.

Ophichelone	n.	Żmiiżółtw	n.	21.
Ophisaurus	Dau.	Samolusk	Kub.	123.

P.

Pelamis	Cuv.	Ryboważ	n.	121.
Pipa	Dum.	Grzbietoród	n.	149.
Platurus	Latr.	Szórokogon	Kl.	116.
Polichrus	Cuv.	Marmórka	n.	69.
Proteus	Lau.	Proteusz	n.	181.
Pseudoboa	Opp.	Jadowiec	n.	97.
Python	Dau.	Półozowąż	n.	104.

R.

Rana	Lin.	Żaba	Rzq.	165.
REPTILIA		GADY		1.

S.

Salamandra	Lau.	Salamandra	Rzq.	172.
SAURII		JASZCZURKI		24

			Pagina
<i>Scandentes</i>	.	.	51.
<i>Scincus</i>	.	<i>Dau.</i> Elada	<i>n.</i> 72.
<i>Scytale</i>	.	<i>Latr.</i> Korbacz	<i>Knap.</i> 97.
<i>Seps</i>	.	<i>Dau.</i> Nibyważ	<i>n.</i> 74.
<i>SERPENTES</i>	.	Węże	80.
<i>Siren</i>	.	<i>Lin.</i> Syrena	<i>Kl.</i> 182.
<i>SIRENIA</i>	.	PŁĄZY	135.
<i>Solutilingues</i>	.	<i>Wolnojęzykie</i>	37.
<i>Stellio</i>	.	<i>Cuv.</i> Kolcogon	<i>Kl.</i> 61.

T.

<i>Testudo</i>	.	<i>Lin.</i> Żółw	<i>Rzq.</i> 15.
<i>Tortrix</i>	.	<i>Opp.</i> Zatocek	<i>n.</i> 127.
<i>Trapelus</i>	.	<i>Cuv.</i> Zmieniacz	<i>n.</i> 59.
<i>Trionocephalus</i>	.	<i>Lacép.</i> Sercogłów	<i>n.</i> 110.
<i>Trimeresurus</i>	.	<i>Lacép.</i> Tróyrzęd	<i>n.</i> 103.
<i>Trionyx</i>	.	<i>Geoff.</i> Żółwiak	<i>n.</i> 19.
<i>Triton</i>	.	<i>Lau.</i> Tryton	<i>n.</i> 174.
<i>Typhlops</i>	.	<i>Schn.</i> Slepucha	<i>n.</i> 127.

U.

<i>Uroplatus</i>	.	<i>Dum.</i> Płaskogon	<i>n.</i> 45.
------------------	---	-----------------------	---------------

V.

<i>Vipera</i>	.	<i>Rzq.</i> Żmija	<i>Rzq.</i> 109.
---------------	---	-------------------	------------------

WYJAŚNIENIE

Wyrazów skróconych.

BART.	znaczy	Barton <i>Amerykanin.</i>
BEAUV.	— —	Beauvois.
BRONG.	— —	Brongniart.
DAU.	— —	Daudin.
DUM.	— —	Dumeril.
FAU.	— —	Faujas.
HORN.	— —	Hornstedt.
LATR.	— —	Latreille.
LAUR.	— —	Laurenti.
LÉA.	— —	Léach (<i>czyt. Licz</i>).
LUC.	— —	Lucyan.
OLIV.	— —	Olivier.
OPP.	— —	Oppel.
SCHN.	— —	Schneider.
SCHÖ.	— —	Schöpf.

Reszta wyrazów skróconych już wyjaśnioną została przy dwóch pierwszych tomach. —

OBJAŚNIENIE

R y c i n

- Na Fig. I. wyobrażony jest bardzo zmniejszony *Krokodyl Długoszczeki* (*Crocodilus acutus* Cuv.), który się znajduje na wyspach Antyllskich.
- Na Fig. II. w naturalnej wielkości *Smok Smugowany* (*Draco lineatus* DAV.)
- Na Fig. III. Głowa *Smoka smugowanego* wraz z szyją tak z boku ustawioną, że widać wewnętrzne urządzenie jego gardła i worek pod gardłem.
- Na Fig. IV. w naturalnej wielkości *Smok zielony* (*Draco viridis* WOLF.)
- Na Fig. V. w naturalnej wielkości wyprostowane trzewia *Smoka zielonego*: w tych
przy *a.* jest żołądek
— *b.* jest pęcherz urynowy wpadający do kanału odchodowego.
— *c.* otwór zewnętrzny kanału odchodowego.
- Na Fig. VI. w naturalnej wielkości części płodne samicy *Smoka zielonego*, czyli dwa jajniki *dd*, obok dwóch jajowodów *ee*, które się przy *g.* łączą z kanałem odchodowym, którego przy *h.* jest otwór zewnętrzny; za przy *i.* widzimy kawałek кишки od reszty trzewiów odcięty.
- Na Fig. VII. jest bardzo zmniejszony *Mackowąż Indyjski* (*Eryton tentaculatus* n.)
-

Fig 2



Fig 4.



Fig




Fig 2.



Fig 4.

Fig 5.

Fig 5.



Fig 6.

Fig 7.




Fig. 2.



Fig. 4.





Fig. 5.

Fig. 5.



Fig. 1.





Biblioteka Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie.