



**Digitization of the scientific library of the
State Museum of Natural History of NAS**

Schaefferi, Iacobi Christiani. [Schäffer J. C.] 1718-1790. Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum: coloribus naturam referentibus expressae = Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insecten / I. Ch. Schaefferi. – Regensburg: gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunkel, 1766. Vol. 2, pars 1. – VIII p., atlas 51-100 tab., index 12 p. [Lat. and Germ. Plates printed on both sides of the leaf].

Download a copy of the book from the site:

<https://libsmnh.com.ua>

Permanent link to the book page:

https://libsmnh.com.ua/books/schaefferi_iacobi_christiani/icones_insectorum_circa_ratisbonam/

Biblioteka Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie.

Sz. 3.d N° 103.

17-539







D. IAC. CHR. SCHAEFFERI
I C O N E S
INSECTORVM RATISBONENSIVM.

VOLVMEN II.

D. Iac. Christ. Schäffers
Abbildungen
Regensburgischer Insecten.
Zweyter Band.





THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
AND
ZOOLOGY
OF THE
CITY OF LONDON
1871



1990

✓

Nr. Inwentarza

A - 539.


D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM



COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLVM. II. PARS I.



D. Iacob Christian Schäffers

natürlich ausgemahlte

Abbildungen

Regensburgischer Insecten.

Zweyten Bandes erster Theil.

Regensburg, gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunkel.



721

AVGVSTISSIMAE
A C
SERENISSIMAE PRINCIPI
CATHARINAE II.
RVSSORVM IMPERATRICI

REL. REL.

SACRVM

HOC QVIDQVID EST OPERIS
SVBMISSISSIMO CVLTV
OFFERT

AVCTOR.

С. ПЕТЕРБУРГ

1874

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

А. А. ГАВРИЛОВ

ПРОФЕССОР

КАТЕДРЫ


ФИЗИКИ

В С. ПЕТЕРБУРГЕ

В С. ПЕТЕРБУРГЕ

1874

3075



Innumeros populos simul et vastissima regna
Quae regis imperio consilioque regis;
Mufis, o! sanctum CATHARINA! et amabile nomen
CVIVS iam resonat gloria vterque polus:
Mentibus excelsis blande fomenta parare
TE iuuat, excultis ingeniisque frui.
TV curas inter grauiiores, doctior IPSA
Doctorum chartas mente manuque tenes.
TE laeti accedunt hinc AVGVSTISSIMA PRINCEPS
Quotquot iudicii candida signa ferunt.
Naturae inprimis quicunque arcana reuelant
Auspiciis cupiunt haec referasse TVIS:

Felices Argi TIBI contenduntque probari,
Munifico CVIVS numine feruet opus.
Gratis exsultant animis TVA praemia nacti
TE lucubrat muneribusque colunt.
Poscor et has partes: hilaris quin fungor eisdem
Accepti decoris cum pietate memor.
Namque suos inter socios me Academia iussit
(Qua TVA Petropolis splendet) habere locum.
His in me meritis, potius sed ductus ab illo
Lumine virtutis, quo trahis, ALMA, bonos;
Has, AVGVSTA, TIBI tabulas, simulacra ferentes
Naturae e gremio, munera parua, sacro.
Arride votis ita mente et fronte benigna
Cara piis precibus vt TVA vita meis.
TE, DEVS OMNIPOTENS, cuius TE exornat imago
Optata populis prosperitate beet!
Vt, cum quae TVA sunt, regnis firmare salutem,
Tum sua vicinis reddere iura queas!
Quae bona sectaris, felix, longaeua et amata
Perfice, consiliis imperiisque potens!
Sic TVA Principibus bonitas, sapientia, virtus
Illustre exemplum quod venerentur, erit.



INSECTA
RATISBONENSIA.

VOL. II. PARS I.

Regensburgische

Insecten.

Zweyter Band. Erster Theil.

TABVLA CI.
Hundert und erste Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo NONA.
Neunter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis deflexis DECIMA QVINTA.
Funfzehnder Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS PRIMVS.
Ein und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA.
Zehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus muticis DECIMVS NONVS.
Neunzehnder Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DVODECIMA.
Zwölfte Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CII.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CII.
Hundert und zweyte Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* TERTIA.
Dritter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

Fig. III. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis QVARTVS. MAS.
Vierter Maulwurfskäfer mit sieben-spaltigen Fühlhörnern. Männchen.

Fig. IV. SCARABAEVS *septem* antennarum lamellis QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Maulwurfskäfer mit sieben-spaltigen Fühlhörnern. Weibchen.

Fig. V. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster Fallkäfer.

Fig. VI. MVSCA *spathula* antennarum *oblonga* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VII. APIS TRICESIMA QVINTA.
VIII. *Fünf und dreyßigste Biene.*

TABVLA CIII.
Hundert und dritte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II.III. CRABRO QVINTVS.
Fünfte Kolbenfliege.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS TERTIVS.
Drey und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEXTA.
Sechzebender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VI. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzebender Afterholzkäfer mit flachem Brustschilde.
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS,
a. b. *Zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.*
- Fig. VIII. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS PRIMVS.
a. b. *Ein und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.*

TABVLA CIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII. a.



Fig. VIII. a.



Fig. VII. b.



Fig. VIII. b.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. b.



Fig. VI. a.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. X.



Fig. IX.



Fig. XI.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CIV.
Hundert und vierte Tafel.

- Fig. I. II. CRABRO SEXTVS.
Sechste Kolbenfliege.
- Fig. III. MVSCA spathula antennarum fusiformi QVARTA.
Vierte Hausfliege mit spindelförmigem Spadel.
- Fig. IV. RHINOMACER DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Afterrüffelkäfer.
- Fig. V. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VI. ELATER antennis setaceis NONVS.
a. b. *Neunter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.*
- Fig. VII. CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Rüffelkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. VIII. IX. BIBIO SECVNDVS.
Zweyte Marcusfliege.
- Fig. X. XI. BIBIO TERTIVS.
Dritte Marcusfliege.

TABVLA CV.
Hundert und fünfte Tafel.

- Fig. I. II. *APIS TRICESIMA SEXTA.*
Sechs und dreyszigste Biene.
- Fig. III. IV. *PHALAENA seticornis alis deflexis DECIMA SEXTA.*
Sechzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. V. *ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVARTVS.*
Vier und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. *TENTHREDO antennis setaceis SEPTIMA.*
Siebende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. *TENTHREDO antennis filiformibus QVINTA.*
Fünfte Sägfliege mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. *CVRCVLIO femoribus muticis VICESIMVS QVARTVS.*
a. b. *Vier und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.*
- Fig. IX. *TELEPHORVS ouatus QVINTVS.*
a. b. *Fünfter eyrunder Warzenkäfer.*

TABVLA CV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII. a.



Fig. IX. a.



Fig. VIII. b.



Fig. IX. b.



TABVLA CVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CVI.

Hundert und fechste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* NONA.
Viertes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. APIS TRICESIMA SEPTIMA.
Sieben und dreyßigste Biene.
- Fig. III. ASILVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzehende Raubfliege.
- Fig. IV. ARANEA oculorum situ *duarum linearum* TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in zwei Reihen.
- Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA. MAS.
Zehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Männchen.
- Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* VNDECIMA. FEMINA.
Elfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

TABVLA CVII.
Hundert und fiebende Tafel.

- Fig. I. HEMEROBIVS TERTIVS.
Dritter Blattlauslöwe.
- Fig. II. LEPTURA thorace *globoso* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit *rundlichem* Brustschilde.
- Fig. III. LEPTVRA thorace *globoso* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit *rundlichem* Brustschilde.
- Fig. IV. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. MVSCA spathula antennarum *rotunda* DVODECIMA.
Zwölfte Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VI. MVSCA spathula antennarum *rotunda* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum *rotunda* DECIMA QVARTA.
Vierzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx Rat

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CVIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.




TABVLA CVIII.
Hundert und achte Tafel.

- Fig. I. LEPTVRA thorace *plano* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzbock mit flachem Brustschilde.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum truncata* TERTIA.
Dritte Hausfliege mit abgestutztem Spadel.
- Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. VIII. CARABVS *oblongus* DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzehender länglicher Laufkäfer.

TABVLA CIX.
Hundert und neunte Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO *antennis setaceis* OCTAVA.
Achte Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. TENTHREDO *antennis clauatis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. IV. PHRYGANEAE QVINTA.
Fünfte Frühlingsfliege.
- Fig. V. CARABVS *oblongus* DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender länglicher Laufkäfer.
- Fig. VI. BVPRESTIS DECIMA QVARTA.
Vierzehender Stinkkäfer.
- Fig. VII. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VIII. CIMEX *quinque* antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
IX. *Sechs und zwanzigste Wanze mit fünfgliederigen Fühlhörnern.*

TABVLA CIX.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Frdrich sc. Rat.

TABVLA CX.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Fig. VII.



Loibel pinx Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CX.
Hundert und zehende Tafel.

Fig. I. II. SPHINX alis *integris* cauda *simplici* DVODECIMA.
Zwölfter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem Schwanze.

Fig. III. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und funfzigste Schlupfwespe.

Fig. IV. V. STRATIOMYS OCTAVA.
Achte Waffenfliege.

Fig. VI. VII. TENTHREDO antennis *setaceis* NONA.
Neunte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXI.
Hundert und eilfte Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS.
Siebenzebende Schlupfwespe.
- Fig. II. III. SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* TERTIA.
Dritter Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und haarigem Schwanze.
- Fig. IV. COCCVS PRIMVS. FEMINA.
Erste Schildlausfliege. Weibgen.
- Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DVODECIMA. MAS.
Zwölfte Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA TERTIA. FEMINA.
Dreyzebende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit gekämten Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXI.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. VII.



TABVLA CXII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CXII.
Hundert und zwölfte Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *planis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehnder Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. CHRYSOMELA TRICESIMA.
Dreysigster Blattkäfer.
- Fig. IV. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA SEXTA.
Sechzehnder Afterholzkäfer mit *kegelähnlichem* Brustschilde.
- Fig. V. APIS TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreysigste Biene.
- Fig. VI. BOMBYLIVS SEXTVS.
Sechste Rüsselfliege.
- Fig. VII. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
- Fig. VIII. ARANEA *oculorum situ semilunato* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Spinne mit Augen im *halben* Monde.
- Fig. IX. PHALAENA *seticornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

TABVLA CXIII.

Hundert und dreyzehende Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. APIS TRICESIMA NONA.
Neun und dreyßsigste Biene.
- Fig. III. VOLVCELLA OCTAVA.
Achte Federbuschfliege.
- Fig. IV. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis alis deflexis* DECIMA NONA.
Vierzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VII. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA.
Zehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VIII. VESPA DECIMA SEXTA.
Sechzehende Wespe.
- Fig. IX. ARANEA *oculorum situ duarum linearum* QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in zwo Reihen.

TABVLA CXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXIV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI. b.



Fig. VI. a.

Fig. V.



Fig. VII.

Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXIV.

Hundert und vierzehende Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhängenden Flügeln.
- Fig. VI.
a. b. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. NEMOTELVS DVODECIMVS.
Zwölfte Stiletfliege.
- Fig. VIII. TENTHREDO *antennis clauatis* DVODECIMA.
Zwölfte Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

TABVLA CXV.

Hundert und funfzehende Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhan-*
genden Flügeln.

Fig. III. CHRYSIS QVARTA.
Vierte Goldwespe.

Fig. IV. TENTHREDO *antennis setaceis* VNDECIMA.
Eilfte Sägfliege mit *borstigen* Fühlhörnern.

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVARTA. MAS.
Vierzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männngen.*

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA. FEMINA.
Funfzehende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender Stutzkäfer mit *stachellosem* Brustschilde.

TABVLA CXV.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.




Fig. VI.




Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CXVI.
Hundert und sechzehende Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA *alis erectis* SEXTA.
Sechstes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* *alis deflexis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. TENTHREDO *antennis pectinatis* QUINTA.
Fünfte Sägfliege mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. V. ICHNEVMON QVINQVAGESIMVS NONVS.
Neun und funfzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS.
Sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA CXVII.

Hundert und siebenzehende Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis *erectis* SEPTIMA.
Siebendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. VESPA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Wespe.
- Fig. III. VESPA DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Wespe.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis *erectis* OCTAVA.
Achtes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA alis *erectis* NONA.
Neuntes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA SEXTA. FEMINA.
Sechzehende Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. VII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
VIII. *Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.*

TABVLA CXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXVIII.



Loibel p̄t̄c. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXVIII.

Hundert und achtzehende Tafel.

- Fig. I. DERMESTES QVARTVS.
Vierter Speckkäfer.
- Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VII. STENOCORVS *thorace inermi* DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Stutzkäfer mit stachellosem Brustschilde.

TABVLA CXIX.

Hundert und neunzehende Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA SEXTA.
Sechzebender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS TERTIVS.
Drey und zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEXAGESIMVS PRIMVS.
Ein und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und Sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. STRATIOMYS NONA.
Neunte Waffenfliche.
- Fig. VII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
VIII. *Sieben und zwanzigster* Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

TABVLA CXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

TABVLA CXX.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.

Loibel pinx. R.

L.C.F. sc. R.

TABVLA CXX.
Hundert und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *hexapus alis angulatis* SECVNDVS.
Zweyter sechsfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. LIBELLVLA *alis erectis* DECIMA.
Zehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA *alis erectis* VNDECIMA.
Eilftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. LIBELLVLA *alis erectis* DVODECIMA.
Zwölftes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS TERTIVS.
Drey und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVARTVS.
Vier und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXI.

Hundert ein und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. TETIGONIA SECVNDA.
Zweyte Singfliege.
- Fig. III. BOMBYLIVS SEPTIMVS.
Siebende Rüsselfliege.
- Fig. IV. LIBELLVLA *alis erectis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. V. LIBELLVLA *alis erectis* DECIMA QVARTA.
Vierzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. VI. VROCERVS TERTIVS.
Dritte Schwanzfliege.

TABVLA CXXI.



Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABULA CXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CXXII.

Hundert zwey und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.
- Fig. II. III. PHRYGANEIA SEXTA.
Sechste Frühlingsfliege.
- Fig. IV. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. V. PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* OCTAVA.
Achter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. VI. VESPA DECIMA NONA.
Neunzehende Wespe.
- Fig. VII. TABANVS QVINTVS.
Fünfte Bremsenfliege.

TABVLA CXXIII.
Hundert drey und zwanzigste Tafel.

Fig. I.

CERAMBYX DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehender Holzkäfer.

Fig. II. III.

CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS QVARTVS.

Vier und zwanzigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. IV.

CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS QVINTVS.

Fünf und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. V.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* NONA.

Neunter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

Fig. VI.

PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DECIMA.

Zehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.

TABVLA CXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXIV.

Hundert vier und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. CERAMBYX DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender Holzkäfer.

Fig. IV. TABANVS SEXTVS.
Sechste Bremsenfliege.

Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA SEPTIMA.
Siebende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI. ARANEA oculorum situ *quadrato* SEXTA.
Sechste Spinne mit Augen im *Vierecke*.

TABVLA CXXV.

Hundert fünf und zwanzigste Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA *alis patentibus* VNDECIMA.

Eilftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II. III.

PHALAENA *feticornis* *alis deflexis* VICESIMA NONA.

Neun und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. IV.

PHALAENA *feticornis* *alis patentibus* VNDECIMA.

Eilfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. V.

TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA TERTIA.

Dreyzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VI.

TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA QVARTA.

Vierzehende Sägfliege mit *käulförmigen* Fühlhörnern.

TABVLA CXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R

TABVLA CXXVI.

Hundert sechs und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. CHRYSOMELA TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyssigster Blattkäfer.
- Fig. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. III. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. TIPVLA DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Erdfliege.
- Fig. V. VI. TENTHREDO *antennis pectinatis* SEXTA.
Sechste Sägfleie mit gekämmten Fühlhörnern.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEXAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXVII.

Hundert sieben und zwanzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* SEPTIMVS.
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. VESPA VICESIMA.
Zwanzigste Wespe.

Fig. IV. V. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* OCTAVVS.
Achter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. VI. VESPA VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Wespe.

Fig. VII. MORDELLA PRIMA.
Erster Flohkäfer.

TABVLA CXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CXXVIII.



Loibel pinx. R.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CXXVIII.
Hundert acht und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* DECIMA NONA.
Neunzehender Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. III. BVPRESTIS DECIMA QVINTA. Vid. TAB. XLIX. Fig. I.
Funfzebender Stinkkäfer. Siehe Taf. XLIX. Fig. I.
- Fig. IV. LEPTVRA thorace *cylindraceo* VNDECIMA.
Eilfter Afterholzkäfer mit *walzenähnlichem* Brustschilde.
- Fig. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEXTVS.
Sechs und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. VI. ICHNEVMON SEXAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und Sechzigste Schlupfwespe.

TABVLA CXXIX.

Hundert neun und zwanzigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA.
Dreysigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. IV. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA NONA.
Neunzehende Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA.
Zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA PRIMA.
VII. *Ein und dreysigster* Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abhängenden* Flügeln.

TABVLA CXXIX.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loebel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXXX.

Hundert und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *pectinicornis* alis *planis* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.
- Fig. II. MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. III. TENTHREDO *antennis clauatis* DECIMA QVINTA.
Fünfzehende Sägfleie mit *käuförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. IV. ICHNEVMON *sexagesimus octavus*.
Acht und sechzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. TENEBRIO *antennarum articulis lentiformibus* QVARTVS.
Vierter Mehlkäfer mit *linsenförmigen* Fühlhörnern.
- Fig. VI. TABANVS *septimus*.
Siebende Bremsenfliege.

TABVLA CXXXI.

Hundert ein und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhan-*
genden Flügeln.
- Fig. III. TABANVS OCTAVVS.
Achte Bremsenfliege.
- Fig. IV. TABANVS NONVS.
Neunte Bremsenfliege.
- Fig. V. TABANVS DECIMVS.
Zehende Bremsenfliege.
- F g. VI. TABANVS VNDECIMVS.
Eilfte Bremsenfliege.

TABVLA CXXXI.

Fig. I.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinax. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXII.

Hundert zwey und dreyßsigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* QVARTVS.
Vierter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. APIS QVADRAGESIMA.
Vierzigste Biene.

Fig. IV. V. ICHNEVMON SEXAGESIMVS NONVS.
Neun und sechzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. SPHEX QVARTVS.
Vierte Afterwespe.

TABVLA CXXXIII.

Hundert drey und dreyßigste Tafel.

Fig. I. PLATYCERVS QVARTVS. MAS.
Vierter Kaſchkäfer. Männchen.

Fig. II. PLATYCERVS QVINTVS. FEMINA.
Fünfter Kaſchkäfer. Weibgen.

Fig. III. IV. PHALAENA *peſtinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEXTA.
*Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit gekämten Fühlhörnern und abhän-
genden Flügeln.*

TABULA CXXXIII.

Fig. I.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



TABVLA CXXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. V. a.



Fig. III. b.



Fig. IV. b.



Fig. VI. a.



Fig. V. b.



Fig. VI. b.



Lobel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXIV.

Hundert vier und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyßigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *abban-*
genden Flügeln.

Fig. III.
a. b. CHELIFER PRIMVS.
Erste Scorpionspinne.

Fig. IV.
a. b. CYNIPS PRIMA.
Erste Gallapfelfliege.

Fig. V.
a. b. GYRINVS PRIMVS.
Erster Taumelkäfer.

Fig. VI.
a. b. LEPISMA PRIMA.
Erster Zuckergast.

TABVLA CXXXV.

Hundert fünf und dreyßigste Tafel.

Fig. I.

PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* NONA.

Neunter Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. II.

PHALAENA *pectinicornis* alis *patentibus* DECIMA.

Zehender Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.

Fig. III.

ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS.

Siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. IV.

ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS PRIMVS.

Ein und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. V. VI.

SPHINX alis *integris* cauda *pilosa* QVARTA.

Vierter Dämmerungsfalter mit *ganzen* Flügeln und *haarigem* Schwanze.

TABULA CXXXV.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CXXXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXXXVI.
Hundert sechs und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit *gekürzten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.
- Fig. III. VESPA VICESIMA SECVNDA. Vid. TAB. LIII. Fig. V.
Zwey und zwanzigste Wespe. Siehe Tafel LIII. Fig. V.
- Fig. IV. V. ACRIDIUM QVARTVM.
Vierte Schnarrheuschrecke.
- Fig. VI. APIS QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Biene.

TABVLA CXXXVII.

Hundert sieben und dreyßigste Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA alis *patentibus* DVODECIMA.

Zwölftes Jüngferchen mit *offenen* Flügeln.

Fig. II.
a. b.

NEMOTELVS DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehende Stiletfliege.

Fig. III.

CARABVS *oblongus* DECIMVS NONVS.

Neunzehender länglicher Laufkäfer.

Fig. IV. V.

ACRIDIVM QVINTVM.

Fünfte Schnarrheuschrecke.

TABVLA CXXXVII.

Fig. I.



Fig. II. a.



Fig. II. b.



Fig. III.



Fig. IV.



Loibel pinx. R.

Fig. V.



I. G. Friedrich sc. R.

TABVLA CXXXVIII.

Fig. I.




Fig. II.




Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III.





Fig. III.



Loebel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXXXVIII.

Hundert acht und dreyßigste Tafel.

Fig. I. II. LOCVSTA QVINTA. MAS.
Fünfte Heuschrecke. Männgen.

Fig. III. LOCVSTA SEXTA. FEMINA.
Sechste Heuschrecke. Weibgen.

Fig. IV. V. LOCVSTA SEPTIMA.
Siebende Heuschrecke.

TABVLA CXXXIX.

Hundert neun und dreyßigste Tafel.

- Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhan-*
genden Flügeln.
- Fig. III. LOCUSTA OCTAVA. FEMINA.
Achte Heuschrecke. *Weibgen.*
- Fig. IV. V. LOCUSTA NONA. MAS.
Neunte Heuschrecke. *Männchen.*

TABVLA CXXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.





Fig. V.



Loibel pinx R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXI.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.



Fig. V.

Leche nix. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXL.
Hundert und vierzigste Tafel.

Fig. I. STENOCORVS thorace *armato* SEKTVS.
Sechster Stutzkäfer mit stachellichem Brustschilde.

Fig. II. III. PAPILIO *hexapus alis integris* NONVS.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus alis integris* DECIMVS. Vid. TAB. XL. Fig. III. IV.
Zehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln. Siehe Taf. XL. Fig. III. IV.

TABULA CXLI.

Hundert ein und vierzigste Tafel.

Fig. I.

CARABVS *oblongus* VICESIMVS. Vid. TAB. XXXVI. Fig. I.

Zwanzigster länglicher Laufkäfer. Siehe Taf. XXXVI. Fig. I.

Fig. II. III.

ACRIDIVM SEXTVM.

Sechste Schnarrheuschrecke.

Fig. IV. V.

ACRIDIVM SEPTIMVM.

Siebende Schnarrheuschrecke.

TABVLA CXLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc R.

TABULA CXLII.



Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.

Fig. VII. a.



Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII. b.



TABVLA CXLII.

Hundert zwey und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO tetrapus alis angulatis* QUINTVS.
Fünfter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. *MVSCA spathula antennarum oblonga* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. *MVSCA spathula antennarum oblonga* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. V. VI. *ACRIDIVM OCTAVVM.* Vid. TAB. XXVII Fig. VI. VII.
Achte Schnarrheuschrecke. Siehe Taf. XXVII Fig. VI. VII.
- Fig. VII.
a. b. *CASSIDA SEXTA.*
Sechster Schildkäfer.

TABVLA CXLIII.
Hundert drey und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *integris* NONVS.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *caudatis* QVINTVS.
Fünfter sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. V.
a. b. CYNIPS SECVNDA.
Zweyte Gallapfelfliege.

TABVLA CXLIII.



Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V. a.



Loibel pinx. R.

Fig. V. b.



I. G. F. sc. R.

TABVLA CXLIV.

Fig. I.



Fig. II.




Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXLIV.

Hundert vier und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *deflexis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *abhangenden* Flügeln.

Fig. III. IV. FORFICVLA SECUNDA.
Zweyter Ohrkäfer.

Fig. V. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS.
Dreyßsigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VI. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreyßsigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS SECUNDVS.
Zwey und dreyßsigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS TERTIVS.
Drey und dreyßsigster Maulwurfskäfer mit *dreyfpaltigen* Fühlhörnern.

TABVLA CXLV.

Hundert fünf und vierzigste Tafel.

- Fig. I. CERAMBYX DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehnder Holzkäfer.
- Fig. II. III. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* QVARTA.
Vierter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.
- Fig. IV. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* QVINTA.
Fünfter Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SEXTA.
Sechster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.
- Fig. VII.
VIII. PHALAENA *feticornis* alis *conuolutis* SEPTIMA.
Siebender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und zusammengerollten Flügeln.

TABULA CXLV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABULA CXLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. b.




Fig. III. a.

Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXLVI.

Hundert sechs und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SEXTVS.
Sechster vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.
- Fig. III. ACARVS QVARTVS.
a. b. *Vierte Milbe.*
- Fig. IV. NEMOTELVS DECIMVS QVARTVS.
Vierzebende Stiletfliege.
- Fig. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* DECIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CXLVII.

Hundert sieben und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. SPHEX QVINTVS.
Fünfte Afterwespe.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* SEPTIMVS.
Siebender vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. V. CVLEX PRIMVS. FEMINA.
Erste Schnaakenfliege. Weibgen.

Fig. VI. CVLEX SECVNDVS. MAS.
Zweyte Schnaakenfliege. Männgen.

Fig. VII. EMPIS PRIMA.
VIII. *Erste Schnepfenfliege.*

TABVLA CXLVII.



TABVLA CXLVIII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. II.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXLVIII.

Hundert acht und vierzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *angulatis* OCTAVVS.
Achter vierfüßiger Tagfalter mit eckigen Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS.
Zehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX.
Hundert neun und vierzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *hexapus alis integris* VNDECIMVS.
Eilfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. PAPILIO *hexapus alis integris* DVODECIMVS.
Zwölfter sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. PAPILIO *hexapus alis integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender sechsfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

TABVLA CXLIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.




Fig. V.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friderich sc. Rat.

TABVLA CL.



TABVLA CL.
Hundert und funfzigste Tafel.


Fig. I. II. BRANCHIPVS *cancriformis* PRIMVS.
III. *Erster krebsartiger Kiefenfufs.*

Fig. IV. BRANCHIPVS *cancriformis* SECVNDVS.
a. b. *Zweyter krebsartiger Kiefenfufs.*

Fig. V. BRANCHIPVS *conchiformis* PRIMVS.
a. b. *Erster muschelartiger Kiefenfufs.*

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI
ICONES
INSECTORVM
CIRCA RATISBONAM
INDIGENORVM
COLORIBVS NATVRAM REFERENTIBVS
EXPRESSAE.

VOLVM. II. PARS II.



D. Iacob Christian Schäffers
natürlich ausgemahlte
Abbildungen
Regensburgischer Insecten.
Zweyter Band. Zweyter Theil.

Gedruckt bey Heinrich Gottfried Zunkel.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS

DEPARTMENT

OF PHYSICS

CHICAGO, ILL.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
DOMINO
PAVLO PETROVITSCH
CATHARINAE II. IMPERATRICIS FILIO

ATQVE
IN IMPERIO SVCCESSORI
MAGNO PRINCIPI RVSSORVM OMNIVM
HEREDI NORVAGIAE, DVCI SLESVICENSI

ATQVE
HOLSTENIENSI, STORMARN ET DITHMARSEN
COMITI OLDENBVRGICO ET DELMENHORSTIENSI

REL. REL.

HOC QVIDQVID EST OPERIS
DEVOTISSIMO CVLTV SACRV M OFFERT

AVCTOR.



Ad MATREM AVGVSTAM cuius pars prima, libelle,
Venerat, imperii SPEM COLVMENQVE SVI;
Ad GNATVM TANTAE GENITRICIS SANGVINE DIGNVM
Altera nunc vadat pars bene fausta tui.

Quae, simul augustam Petri peruenit ad urbem,

PRINCIPIS ILLIVS limina sacra petat.

HVNC, GENITRICE SATVM DIVA, qua grandius atque

Aequius in terris sol nihil esse videt;

HVNC doceat, quantum, multis virtutibus EIVS

Inflammata, ILLVM pectora nostra colant.

Est aliquid, summis natum esse parentibus, atque
Reges posse in auis dinumerare suis:
Est aliquid, populo quondam praeesse potenti,
Imperiique manu fraena tenere sua:
Sed maius multo est, artes edificere cunctas,
Queis populos princeps rite beare queat;
Virtutumque graui studio sceptrum ante mereri,
Forti quam capias regia sceptrum manu..
Isthaec spectantem **TE, CLEMENTISSIME PRINCEPS,**
Fama per amplum orbem praedicat ore pio.
Hinc **TE** suspiciunt Russorum pectora laeta,
Ac **DIVAE MATRIS SPESQUE DECUSQUE TVAE** es.
Hinc **TE** suspiciunt, quotquot virtute tenentur,
Terras Eoas Hesperiasque colant.
Hinc **TE** virtutesque **TVAS** colit atque veretur,
Has **TIBI** qui chartas percipit esse sacras.
TE pius observat, **DVLGIS GENITRICIS IMAGO,**
Naturae ex gremio dona minuta ferens.
TE pater omnipotens, **TE** prosperitate perenni,
Optata Russis, usque beare velit!
TEque diu iubeat nunquam mortalia facta
AVGVSTAE MATRIS cernere, et inde sequi!
IPSIVS vt laeto posthac virtutibus orbi
Regnes, ac ciuem quemque beare queas.



INSECTA
RATISBONENSIA.
VOL. II. PARS II.

Regensburgische
Insecten.

Zweyter Band. Zweyter Theil.

TABVLA CLI.

Hundert ein und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA.
Zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III. CLERVS QVARTVS.
Vierter Bienenkäfer.

Fig. IV. SCARABAEVS *tribus* antennarum *lamellis* TRICESIMVS QVARTVS.
Vier und dreyssigster Maulwurfskäfer mit *dreyspaltigen* Fühlhörnern.

Fig. V. VI. ELATER *antennis ferratis* DVODECIMVS.
Zwölfter Springkäfer mit *sägförmigen* Fühlhörnern.

Fig. VII. LEPTVRA *thorace globoso* DECIMA QVARTA.
Vierzehender Afterholzkäfer mit *rundlichem* Brustschilde.

TABVLA CLI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLII.

Hundert zwey und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* VNDECIMVS.
Eilfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. III. PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DVODECIMVS.
Zwölfter vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. LEPTVRA *thorace cylindraceo* DVODECIMA.
Zwölfter Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.

TABVLA CLIII.
Hundert drey und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *tetrapus alis integris* DECIMVS TERTIVS.
Dreyzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. TETIGONIA TERTIA.
Dritte Singfliege.
- Fig. IV. a. a. CERAMBYX DECIMVS SEXTVS. Vid. TAB. I. Fig. I.
Sechszehender Holzkäfer. Siehe Taf. I. Fig. I.
- Fig. V. LEPTVRA *thorace cylindraceo* DECIMA TERTIA. Vid. TAB. XXXIX. Fig. I.
Dreyzehender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde. Siehe
Taf. XXXIX. Fig. I.

TABVLA CLIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IX.



Fig. X.



Loibel pinx. Rat.

I. M. F. sc. Rat.

TABVLA CLIV.

Hundert vier und funfzigste Tafel.

- Fig. I. II. EPHEMERA TERTIA.
Dritte Vferaasfliege.
- Fig. III. IV. TENTHREDO antennis *pectinatis* SEPTIMA. MAS.
Siebende Sägfliede mit gekämmten Fühlhörnern. Männchen.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis *pectinatis* OCTAVA. FEMINA.
Achte Sägfliede mit gekämmten Fühlhörnern. Weibchen.
- Fig. VII.
VIII. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. IX. X. ACRIDIUM NONVM.
Neunte Schnarrheuschrecke.

TABVLA CLV.
Hundert fünf und funfzigste Tafel.

- Fig. I. ONISCVS TERTIVS.
Dritte Affel.
- Fig. II. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. III. a. b. BRVCHVS PRIMVS.
Erster Buckelkäfer.
- Fig. IV. a. b. BRVCHVS SECVNDVS.
Zweyter Buckelkäfer.
- Fig. V. a. b. BRVCHVS TERTIVS.
Dritter Buckelkäfer.
- Fig. VI. BLATTA SECVNDA.
Zweyte Schabe.
- Fig. VII. BLATTA TERTIA.
Dritte Schabe.

TABVLA CLV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. III. b.



Fig. IV. b.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



Fig. VI.



Fig. VII.

Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABULA CLVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Frdrich sc. Rat.

TABVLA CLVI.

Hundert sechs und funfzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA spathula antennarum *rotunda* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. EPHEMERA QVARTA.
Vierte Uferaasfliege.
- Fig. IV. CARABVS *oblongus* VICESIMVS PRIMVS.
Ein und zwanzigster länglicher Laufkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA *feticornis* alis *deflexis* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VII. TIPVLA alis *patentibus* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Erdfliege mit offenen Flügeln.

TABVLA CLVII.

Hundert sieben und funfzigste Tafel.

Fig. I. BVPRESTIS DECIMA SEXTA.
Sechszehender Stinkkäfer.

Fig. II. III. GRILLVS SECVNDVS. MAS.
Zweyte Grille. Männchen.

Fig. IV. GRILLVS TERTIVS. FEMINA.
Dritte Grille. Weibgen.

Fig. V. VI. PHRYGANEAE SEPTIMA.
Siebende Frühlingsfliege.

Fig. VII. a. b. DERMESTES QVINTVS.
Fünfter Speckkäfer.

TABVLA CLVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII. a.



Fig. VI.



Fig. VII. b.



TABULA CLVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLVIII.

Hundert acht und funfzigste Tafel.

Fig. I. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVARTA.
Vierzebender Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.

Fig. II. BLATTA QVARTA.
Vierte Schabe.

Fig. III. a. b. CISTELA SECVNDA.
Zweyter Kegelkäfer.

Fig. IV. V. PAPILIO hexapus alis caudatis SEXTVS.
Sechster sechsfüßiger Tagfalter mit geschwänzten Flügeln.

Fig. VI. ARANEA oculorum situ quadrato SEPTIMA.
Siebende Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. VII. ARANEA oculorum situ quadrato OCTAVA.
Achte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLIX.

Hundert neun und funfzigste Tafel.

Fig. I. II. PHALAENA *pectinicornis* alis *erectis* PRIMA.
Erster Nachtfalter mit *gekämmten* Fühlhörnern und *aufrechten* Flügeln.

Fig. III. IV. TENTHREDO *antennis pectinatis* NONA.
Neunte Sägfliede mit *gekämmten* Fühlhörnern.

Fig. V. PTEROPHORVS SECVNDVS.
Zweyter Fächerfalter.

Fig. VI. VII. PHALAENA *seticornis* alis *planis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

TABVLA CLIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CLX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLX.

Hundert und sechzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA TERTIA.
Dreyzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. II. III. PERLA TERTIA.
Dritte Afterfrühlingsfliege.
- Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA SECVNDA.
Zwey und vierzigste Biene.
- Fig. VI. CVRCVLIO *femoribus muticis* VICESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXI.

Hundert ein und fechzigfte Tafel.

Fig. I.

TIPVLA alis *patentibus* DECIMA NONA. MAS.

Neunzebende Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männchen*.

Fig. II. III.

ACRIDIVM DECIMVM.

Zehende Schnarrheufchrecke.

Fig. IV. a. b.

CHRYSOMELA TRICESIMA SECVNDA.

Zwey und dreyßsigster Blattkäfer.

Fig. V. a. b. c.

MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA QVINTA.

Fünf und zwanzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. VI.

ARANEA oculorum situ *semilunato* DECIMA QVARTA.

Vierzebende Spinne mit Augen im *halben* Monde.

TABVLA CLXI.




Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Fig. V. c.



Fig. VI.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Frdrich sc. Rat.

TABVLA CLXII.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.




Fig. VIII.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXII.

Hundert zwey und fechzigfte Tafel.

Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* PRIMVS.
Erster Tagfalter mit *schiefen* Flügeln.

Fig. III. IV. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* SECVNDVS.
Zweyter Tagfalter mit *schiefen* Flügeln.

Fig. V. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA. FEMINA.
Zwanzigste Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Weibgen.*

Fig. VI. TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA PRIMA. MAS.
Ein und zwanzigste Erdfliege mit *offenen* Flügeln. *Männgen.*

Fig. VII. PAPILIO *hexapus* alis *obliquis* TERTIVS.
VIII. Dritter Tagfalter mit *schiefen* Flügeln.

TABULA CLXIII.
Hundert drey und sechzigste Tafel.

- Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS OCTAVVS.
Acht und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.
- Fig. II. III. PHALAENA *seticornis* alis *planis* VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *seticornis* alis *planis* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VI. CVRCVLIO femoribus *muticis* VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABVLA CLXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXIV.

Hundert vier und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. PAPILIO *tetrapus alis integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis alis deflexis* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. VII. PHALAENA *feticornis alis planis* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXV.
Hundert fünf und fechzigste Tafel.

- Fig. I. II. *PAPILIO hexapus alis ocellatis SEPTIMVS.*
Siebender sechsfüßiger Tagfalter mit geäugelten Flügeln.
- Fig. III. IV. *SPHINX alis integris cauda simplici DECIMA TERTIA.*
*Dreyzehender Dämmerungsfalter mit ganzen Flügeln und einfachem
Schwanze.*
- Fig. V. VI. *PHALAENA seticornis alis deflexis TRICESIMA SEXTA.*
*Sechs und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhan-
genden Flügeln.*
- Fig. VII.
VIII. *MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA SEPTIMA.*
Sieben und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



TABVLA CLXVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV. a.



Fig. IV. b.



Fig. III. b.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friderich sc. R.

TABVLA CLXVI.
Hundert fechs und fechzigfte Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS QVINTVS.
Funfzehende Stiletfliege.

Fig. III. a. b. CVRCVLIO femoribus muticis TRICESIMVS.
Dreyßigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. IV. a. b. CLERVS QVINTVS.
Fünfter Bienenkäfer.

Fig. V. a. b. ALTICA PRIMA.
Erster Hüpfkäfer.

TABVLA CLXVII.
Hundert sieben und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. DERMESTES sextvs.
Sechster Speckkäfer.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum rotunda VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigste Hausfliege mit ründlichem Spadel.
- Fig. IV. LIBELLVLA alis patentibus DECIMA QVARTA.
Vierzehendes Jüngerchen mit offenen Flügeln.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis setaceis DVODECIMA.
Zwölfte Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA QVINTA.
Funfzebende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CLXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXVIII

Hundert acht und sechzigste Tafel.

- Fig. I. BOMBYLIVS OCTAVVS.
Achte Rüsselfliege.
- Fig. II. III. PHRYGANEA OCTAVA.
Achte Frühlingsfliege.
- Fig. IV. V. NEMOTELVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Stiletfliege.
- Fig. VI. VII. PAPILIO *hexapus* alis ocellatis OCTAVVS.
Achter sechsfüßiger Tagfalter mit geäderten Flügeln.
- Fig. VIII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXIX.

Hundert neun und fechzigfte Tafel.

- Fig. I. II. MVSCA *spathula antennarum quadrata* PRIMA.
III. Erste Hausfliege mit *viereckigem* Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum oblonga* DECIMA NONA.
Neunzebende Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. VI. a. b. CVRCVLIO *femoribus muticis* TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und Dreyssigster Rüsselkäfer mit *ungezähnten* Schenkeln.
- Fig. VII. CIMEX *quatuor antennarum articulis* VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigste Wanze mit *viergliederigen* Fühlhörnern.

TABVLA CLXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI. a.



Fig. VI. b.



Fig. VII.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Fig. IX.



Loibel pinx. Rat.

I. G. Friedrich sc. Rat.

TABVLA CLXX.
Hundert und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und dreyssigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

Fig. II. III. TENTHREDO antennis *setaceis* DECIMA TERTIA.
Dreyzehende Sägfliege mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEXTVS.
Sechs und zwanzigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. VI. VII. MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. VIII. IX. MVSCA *spathula* antennarum *rotunda* TRICESIMA.
Dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

TABVLA CLXXI.

Hundert ein und fiebenzigfte Tafel.

Fig. I. a. b. COCCINELLA VICESIMA.
Zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. II. a. b. COCCINELLA VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigster Blattlauskäfer.

Fig. III. a. b. RHINOMACER DECIMVS QVINTVS.
Fünfzehender Afterrüffelkäfer.

Fig. IV. V. PHRYGANEA NONA.
VI. *Neunte Frühlingsfliege.*

TABVLA CLXXI.

Fig. I. a.



Fig. II. a.

Fig. I. b.



Fig. III. a.



Fig. II. b.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.




Fig. VII.



Leibel pinx. Rat.

I. M. Friedrich sc. R.

TABVLA CLXXII.

Hundert zwey und fiebenzigfte Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *hexapus alis integris* DECIMVS QVARTVS.
Vierzehender sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.
- Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA PRIMA.
Ein und dreyszigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyszigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VI. ARANEA *oculorum situ semilunato* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Spinne mit Augen im halben Monde.
- Fig. VII. ARANEA *oculorum situ quadrato* NONA.
Neunte Spinne mit Augen im Vierecke.

TABVLA CLXXIII.
Hundert drey und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. II. III. PHALAENA *seticornis alis planis* VICESIMA QVINTA.
Fünf und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. CHRYSOMELA TRICESIMA TERTIA.
Drey und dreyssigster Blattkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA *pedinicornis alis erectis* SECVND A.
Zweyter Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und aufrechten Flügeln.

TABVLA CLXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV. a.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV. b.



Loibel pinx. Rat.

I. M. Fridrich sc. Rat.

TABVLA CLXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V. b.



Fig. V. a.



Loibel pinx. Rat.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXIV.

Hundert vier und siebenzigste Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA QVINTA.

Funfzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II.

ARANEA oculorum situ *semilunato* DECIMA SEPTIMA.

Siebenzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. III.

ARANEA oculorum situ *quadrato* DECIMA.

Zehende Spinne mit Augen im Vierecke.

Fig. IV.

ELATER antennis *setaceis* DECIMVS.

Zehender Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. V. a. b.

CVRCVLIO femoribus *muticis* TRICESIMVS TERTIVS.

Drey und dreyssigster Rüsselkäfer mit ungezähnten Schenkeln.

TABULA CLXXV.

Hundert fünf und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. II. EPHEMERA QUINTA. MAS.
Fünfte Uferaasfliege. Männchen.
- Fig. III. EPHEMERA SEXTA. FEMINA.
Sechste Uferaasfliege. Weibchen.
- Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS TERTIVS. FEMINA, aptera.
Drey und siebenzigste Schlupfwespe. Weibchen, ohne Flügel.
- Fig. V. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVARTVS. MAS, alatus.
Vier und siebenzigste Schlupfwespe. Männchen, mit Flügeln.
- Fig. VII. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS QVINTVS.
Fünf und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXV.

Fig. I.



Fig. III.



Fig. II.



Fig. IV.



Fig. V.







Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CLXXVI.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXVI.

Hundert sechs und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. LIBELLVLA alis erectis DECIMA QVINTA.
Fünfzehendes Jüngferchen mit aufgerichteten Flügeln.
- Fig. II. III. PHALAENA seticornis alis planis VICESIMA SEXTA.
Sechs und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. IV. a. b. ANTHRENVS PRIMVS.
Erster Blumenstaubkäfer.
- Fig. V. a. b. CERAMBYX DECIMVS SEPTIMVS.
Siebenzebender Holzkäfer.
- Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEXTVS. FEMINA, aptera.
Sechs und siebenzigste Schlupfwespe. Weibgen, ohne Flügel.

TABVLA CLXXVII.

Hundert sieben und siebenzigste Tafel.

Fig. I. MVSCA spathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVARTA.
Vier und dreyssigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum *rotunda* TRICESIMA QVINTA.
Fünf und dreyssigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

Fig. IV. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS.
Sieben und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. V. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.
Acht und siebenzigste Schlupfwespe.

Fig. VI. VII. SPHEX SEXTVS.
Sechste Afterwespe.

Fig. VIII. IX. SPHEX SEPTIMVS.
a. b. *Siebende* Afterwespe.

TABVLA CLXXVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. IX. a.



Fig. IX. b.



TABVLA CLXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Loibel pinx. R.

I. M. Friedrich sc. R.

TABVLA CLXXVIII.

Hundert acht und siebenzigste Tafel.

Fig. I. II. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SEXTA.
Sechs und dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.

Fig. III. IV. PHALAENA *pectinicornis alis deflexis* TRICESIMA. MAS.
Dreyssigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln. Männchen.

Fig. V. VI. PHALAENA *pectinicornis alis deflexis* TRICESIMA PRIMA. FEMINA.
Ein und dreyssigster Nachtfalter mit gekämmten Fühlhörnern und abhängenden Flügeln. Weibchen.

TABVLA CLXXIX.

Hundert neun und siebenzigste Tafel.

- Fig. I. TENTHREDO *antennis filiformibus* SEXTA.
Sechste Sägfliede mit fadenähnlichen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA.
Zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis alis deflexis* TRICESIMA SEPTIMA.
*Sieben und dreyßsigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und ab-
hängenden Flügeln.*
- Fig. VI. VII. NEMOTELVS *DECIMVS SEPTIMVS*.
Siebenzehende Stiletfliege.
- Fig. VIII. IX. HIPPOBOSCA TERTIA.
Dritte Pferdfliege.

TABVLA CLXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



Fig. IX.



TABVLA CLXXX.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CLXXX.
Hundert und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. PHRYGANEA DECIMA.
Zehende Frühlingsfliege.

Fig. III. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA SEPTIMA. Vid. TAB.
CLXXIII. Fig. I. II.
Sieben und dreyßigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel. Siehe Tafel
CLXXIII. Fig. I. II.

Fig. IV. V. PHALAENA *feticornis* alis *planis* VICESIMA SEPTIMA.
Sieben und zwanzigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. VI. ICHNEVMON SEPTVAGESIMVS NONVS.
Neun und siebenzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXXI.

Hundert ein und achtzigste Tafel.

- Fig. I. TIPVLA alis patentibus VICESIMA SECUNDA. FEMINA.
Zwey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. II. TIPVLA alis patentibus VICESIMA TERTIA. FEMINA.
Drey und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.
- Fig. III. TIPVLA alis patentibus VICESIMA QVARTA. MAS.
Vier und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.
- Fig. IV. MVSCA spathula antennarum rotunda TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyssigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. V. VI. TENTHREDO antennis clauatis DECIMA SEXTA.
Sechzebende Sägfleie mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VII. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

TABVLA CLXXXI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CLXXXII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CLXXXII.

Hundert zwey und achtzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA *alis patentibus* DECIMA SEXTA.
Sechzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. III. TABANVS DVODECIMVS.
Zwölfte Bremsenfliege.

Fig. III. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA OCTAVA.
Achtzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.

Fig. IV. PHALAENA *feticornis* *alis planis* VICESIMA OCTAVA.
Acht und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

TABVLA CLXXXIII.

Hundert drey und achtzigste Tafel.

Fig. I.

CINEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS SEPTIMVS.

Sieben und zwanzigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. II. III.

PAPILIO *tetrapus* alis *integris* DECIMVS QVINTVS.

Fünfzehnder vierfüßiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV.

TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA QVINTA. FEMINA.

Fünf und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Weibgen.

Fig. V.

TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEXTA. MAS.

Sechs und zwanzigste Erdfliege mit offenen Flügeln. Männgen.

Fig. VI.

ASILVS DECIMVS QVINTVS.

Fünfzehende Raubfliege.

Fig. VII.

ICHNEVMON OCTOGESIMVS.

Achtzigste Schlupfwespe.

TABVLA CLXXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABULA CLXXXIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXXIV.

Hundert vier und achtzigste Tafel.

Fig. I.

LIBELLVLA alis erectis DECIMA SEXTA.

Sechzehendes Jüngerchen mit aufgerichteten Flügeln.

Fig. II. III.

PAPILIO hexapus alis integris DECIMVS QVINTVS.

Fünfzehender sechsfüssiger Tagfalter mit ganzen Flügeln.

Fig. IV. V.

TABANVS DECIMVS TERTIVS.

Dreyzehende Bremsenfliege.

Fig. VI. VII.

TABANVS DECIMVS QVARTVS.

Vierzehende Bremsenfliege.

TABULA CLXXXV.

Hundert fünf und achtzigste Tafel.

- Fig. I. II. PAPILIO *hexapus* alis *ocellatis* NONVS.
Neunter sechsfüßiger Tagfalter mit geügelten Flügeln.
- Fig. III. ASILVS DECIMVS SEXTVS.
Sechzehende Raubfliege.
- Fig. IV. a. b. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS OCTAVVS.
V. *Acht und zwanzigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.*

TABVLA CLXXXV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V. a.



Fig. V. b.



TABVLA CLXXXVI.

Fig. I.



Fig. IV.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CLXXXVI.

Hundert sechs und achtzigste Tafel.

Fig. I. LIBELLVLA alis *patentibus* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.

Fig. II. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA SEPTIMA.
Siebenzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. III. TENTHREDO antennis *clauatis* DECIMA OCTAVA.
Achtzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.

Fig. IV. CLEROIDES PRIMVS.
Erster Afterbienenkäfer.


Fig. V. CLEROIDES SECVNDVS.
Zweyter Afterbienenkäfer.

TABVLA CLXXXVII.

Hundert sieben und achtzigste Tafel.

- Fig. I. ICHNEVMON OCTOGESIMVS PRIMVS.
Ein und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. II. III. MVSCA spathula antennarum oblonga VICESIMA SECVNDA.
Zwey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.
- Fig. IV. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVARTVS.
Vier und zwanzigster Fallkäfer
- Fig. V. ARANEA oculorum situ quatuor linearum TERTIA.
Dritte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVARTA.
Vierte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA OCTAVA.
Achtzebende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABULA CLXXXVII.



TABVLA CLXXXVIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CLXXXVIII.

Hundert acht und achtzigste Tafel.

Fig. I. II. NEMOTELVS DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehende Stiletfliege.

Fig. III. NOTOXVS PRIMVS.
a. b. *Erster Brufthornkäfer.*

Fig. IV. V. MVSCA spathula antennarum *oblonga* VICESIMA TERTIA.
Drey und zwanzigste Hausfliege mit länglichem Spadel.

Fig. VI. VII. CVLEX TERTIVS.
Dritte Schnaakenfliege.

TABVLA CLXXXIX.

Hundert neun und achtzigste Tafel.

- Fig. I. BOSTRICHVS PRIMVS.
Erster Capuzkäfer.
- Fig. II. LEPTVRA thorace cylindraceo DECIMA QVINTA.
Fünfzehnder Afterholzkäfer mit walzenähnlichem Brustschilde.
- Fig. III. a. b. TELEPHORVS ouatus SEXTVS.
Sechster eyrunder Warzenkäfer.
- Fig. IV. V. PHALAENA seticornis alis deflexis TRICESIMA OCTAVA.
Acht und dreyßigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und abhangenden Flügeln.
- Fig. VI. ARANEA oculorum situ quatuor linearum QVINTA.
Fünfte Spinne mit Augen in vier Reihen.
- Fig. VII. ARANEA oculorum situ semilunato DECIMA NONA.
Neunzehende Spinne mit Augen im halben Monde.

TABVLA CLXXXIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. III. b.



Fig. VI.





Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CXC.



Loibel pinx. R.

L.M.F. sc. R.

TABVLA CXC.
Hundert und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. *LOCVSTA DECIMA. MAS.*
Zehende Heuschrecke. Männchen.
- Fig. III. *LIBELLVLA alis patentibus DECIMA OCTAVA.*
Achtzehendes Jüngferchen mit offenen Flügeln.
- Fig. IV. V. *TENTHREDO antennis clauatis DECIMA NONA.*
Neunzehende Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. VI. *APIS QVADRAGESIMA TERTIA.*
Drey und vierzigste Biene.
- Fig. VII. *VESPA VICESIMA TERTIA.*
Drey und zwanzigste Wespe.

TABVLA CXCI.

Hundert ein und neunzigste Tafel.

- Fig. I. NEMOTELVS DECIMVS NONVS.
Neunzebende Stiletfliege.
- Fig. II. III. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA QVARTA.
Vierzebende Sägfleie mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. ARANEA *oculorum situ quadrato* VNDECIMA.
Eilfte Spinne mit Augen im Vierecke.
- Fig. V. VI. NEMOTELVS VICESIMVS.
Zwanzigste Stiletfliege.
- Fig. VII. NEMOTELVS VICESIMVS PRIMVS.
VIII. *Ein und zwanzigste Stiletfliege.*

TABVLA CXCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VII.



Fig. VI.



Fig. VIII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABULA CXCI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III. a.



Fig. III. b.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Loisel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCH.

Hundert zwey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. EMPIS SECVNDA.
Zweyte Schnepfenfliege.
- Fig. II. EMPIS TERTIA.
Dritte Schnepfenfliege.
- Fig. III.
a. b. EMPIS QVARTA.
Vierte Schnepfenfliege.
- Fig. IV. V. APIS QVADRAGESIMA QVARTA.
Vier und vierzigste Biene.
- Fig. VI. CERAMBYX DECIMVS OCTAVVS.
Achtzehender Holzkäfer.

TABVLA CXCIH.

Hundert drey und neunzigste Tafel.

- Fig. I. PHALAENA *feticornis* alis *patentibus* DVODECIMA.
Zwölfter Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *offenen* Flügeln.
- Fig. II. III. MVSCA *spathula antennarum oblonga* VICESIMA QVARTA.
Vier und zwanzigste Hausfliege mit *länglichem* Spadel.
- Fig. IV. V. MVSCA *spathula antennarum rotunda* TRICESIMA NONA.
Neun und dreyßigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.
- Fig. VI. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA.
Vierzigste Hausfliege mit *rundlichem* Spadel.

TABVLA CXCH.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CXCIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Loibel pinx. R.

I. M. F. sc. R.

TABVLA CXCIV.

Hundert vier und neunzigste Tafel.

- Fig. I. ELATER *antennis setaceis* VNDECIMVS.
Eilfter Springkäfer mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. II. III. TENTHREDO *antennis clauatis* VICESIMA.
Zwanzigste Sägfliege mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. CHRYSOMELA *tricesima quarta*.
Vier und dreyßigster Blattkäfer.
- Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis alis planis* VICESIMA NONA.
Neun und zwanzigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII. CARABVS *oblongus* VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigster länglicher Laufkäfer.

TABULA CXCV.

Hundert fünf und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA PRIMA.
Ein und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. III. IV. ICHNEVMON OCTOGESIMVS SECVNDVS.
Zwey und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. V. VI. PHALAENA *seticornis alis planis* TRICESIMA.
Dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.
- Fig. VII.
VIII. APIS QVADRAGESIMA QVINTA.
Fünf und vierzigste Biene.

TABVLA CXCV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. IV.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXCVI.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



TABVLA CXCVI.

Hundert sechs und neunzigste Tafel.

Fig. I. II.

PHALAENA *seticornis* alis *planis* TRICESIMA PRIMA.

Ein und dreyßigster Nachtfalter mit *borstigen* Fühlhörnern und *flachen* Flügeln.

Fig. III.

TIPVLA alis *patentibus* VICESIMA SEPTIMA.

Sieben und zwanzigste Erdfliege mit *offenen* Flügeln.

Fig. IV. V.

PHRYGANEA VNDECIMA.

Eilfte Frühlingsfliege.

Fig. VI.

ARANEA *oculorum* situ *quadrato* DVODECIMA.

Zwölfte Spinne mit *Augen* im *Vierecke*.

TABULA CXCVII.

Hundert sieben und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA QUINTA.
Fünfzehende Sägfliede mit borstigen Fühlhörnern.

Fig. III. IV. PHALAENA *seticornis alis planis* TRICESIMA SECVNDA.
Zwey und dreyssigster Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und flachen Flügeln.

Fig. V. VI. APIS QVADRAGESIMA SEXTA.
Sechs und vierzigste Biene.

Fig. VII. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA SECVNDA.
VIII. *Zwey und vierzigste Hausfliede mit rundlichem Spadel.*

TABVLA CXCVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



Fig. VIII.



TABVLA CXCVIII.



Loüel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

TABVLA CXCVIII.

Hundert acht und neunzigste Tafel.

- Fig. I. II. APIS QVADRAGESIMA SEPTIMA.
Sieben und vierzigste Biene.
- Fig. III. ICHNEVMON OCTOGESIMVS TERTIVS.
Drey und achtzigste Schlupfwespe.
- Fig. IV. V. STRATIOMYS DECIMA.
Zehende Waffenfliege.
- Fig. VI. CRYPTOCEPHALVS VICESIMVS QVINTVS.
Fünf und zwanzigster Fallkäfer.
- Fig. VII. LEPTVRA *thorace conico* DECIMA NONA.
Neunzehender Afterholzkäfer mit kegelähnlichem Brustschilde.
- Fig. VIII. SCARABAEVS *tribus antennarum lamellis* TRICESIMVS QVINTVS.
Fünf und dreyssigster Maulwurfskäfer mit dreyspaltigen Fühlhörnern.

TABVLA CXCIX.

Hundert neun und neunzigste Tafel.

Fig. I. II. CIMEX *quatuor* antennarum articulis VICESIMVS NONVS.
Neun und zwanzigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. III. ARANEA *oculorum situ semilunato* VICESIMA.
Zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

Fig. IV. V. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS.
Dreysigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. VI. CIMEX *quatuor* antennarum articulis TRICESIMVS PRIMVS.
Ein und dreysigste Wanze mit viergliederigen Fühlhörnern.

Fig. VII. ELATER *antennis ferratis* DECIMVS TERTIVS.
VIII. *Dreyzebender Springkäfer mit sägförmigen Fühlhörnern.*

TABULA CXCIX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VIII.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CC.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. V.



Fig. VI.



Fig. VII.



TABVLA CC.
Zweyhunderfte Tafel.

- Fig. I. NEMOTELVS VICESIMVS SECVNDVS.
Zwey und zwanzigste Stiletfliege.
- Fig. II. TENTHREDO *antennis clauatis* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Sägfleie mit käulförmigen Fühlhörnern.
- Fig. III. TENTHREDO *antennis setaceis* DECIMA SEXTA.
Sechzehende Sägfleie mit borstigen Fühlhörnern.
- Fig. IV. PHALAENA *seticornis alis patentibus* DECIMA TERTIA.
Dreyzehender Nachtfalter mit borstigen Fühlhörnern und offenen Flügeln.
- Fig. V.VI. MVSCA *spathula antennarum rotunda* QVADRAGESIMA TERTIA.
Drey und vierzigste Hausfliege mit rundlichem Spadel.
- Fig. VII. ARANEA *oculorum situ semilunato* VICESIMA PRIMA.
Ein und zwanzigste Spinne mit Augen im halben Monde.

INDEX. Register.

A CARVS.
ACRIDIVM.

Afterbienenkäfer, *f.* CLEROIDES.
Afterfrühlingsfliege, *f.* PERLA.
Afterholzkäfer, *f.* LEPTVRA.
Afterrüßelkäfer, *f.* RHINOMACER.
Afterwespe, *f.* SPHEX.
ALTICA.
ANTHRENVS.
APIS.

ARANEA.
Fam. I. *Semil.*

Fam. II. *Quadrat.*

No.	Tab.	Fig.
4	146	3. a. b.
4	136	4. 5
5	137	4. 5
6	141	6
7	—	4. 5
8	142	5. 6
9	144	9. 10
10	161	2. 3
1	166	1
1	176	4. a. b.
35	102	7. 8
36	105	1. 2
37	106	2
38	112	5
39	113	2
40	132	3
41	136	6
42	160	4. 5
43	190	6
44	192	4. 5
45	195	7. 8
46	197	5. 6
47	198	1
12	101	7
13	112	8
14	161	6
15	167	7
16	172	6
17	174	2
18	187	7
19	189	7
20	199	3
21	200	7
6	124	6
7	158	6
8	—	7
9	172	7
10	174	3
11	191	4
12	196	6

Fam. IV. <i>Duar. lin.</i>
Fam. VI. <i>Quat. lin.</i>
ASILVS.
Affel, <i>f.</i> ONISCVS.
BIBIO.
Biene, <i>f.</i> APIS.
Bienenkäfer, <i>f.</i> CLERVS.
BLATTA.
Blattkäfer, <i>f.</i> CHRYSOMELA.
Blattlauskäfer, <i>f.</i> COCCINELLA.
Blattlauslöwe, <i>f.</i> HEMEROBIVS.
BOMBYLIVS.
BOSTRICHVS.
BRANCHIPVS.
Fam. I. <i>Cancrif.</i>
Bremsenfliege, <i>f.</i> TABANVS.
BRVCHVS.
Brusthornkäfer, <i>f.</i> NOTOXVS.
Buckelkäfer, <i>f.</i> BRVCHVS.
BVPRESTIS.
CARABVS.
Fam. I. <i>Oblong.</i>
CASSIDA.
CERAMBYX.

No.	Tab.	Fig.
3	106	4
4	113	9
3	187	5
4	—	6
5	189	6
14	106	3
15	183	6
16	185	3
3	104	8. 9
4	—	10. 11
2	155	6
3	—	7
4	158	4
6	112	6
7	121	7
8	168	1
1	189	1
1	150	1. 2
2	—	3. a. b.
1	155	3. a. b.
2	—	4. a. b.
3	—	5. a. b.
14	109	6
15	128	2
16	157	1
17	108	9
18	109	5
19	137	3
20	141	1
21	156	4
22	194	7
6	142	7. a. b.
13	123	1
14	124	3

No.

CHELIFER.
CHRYSID.
CHRYSIDOMELA.

CINEX.
Fam. I. *Art. quat.*

Fam. II. *Art. quinque.*
CISTELA.
CLEROIDES.

CLERVS.

COCCINELLA.

COCCVS.
CRABRO.

CRYPTOCEPHALVS.

CVLEX.

CVRCVLIO.
Fam. I. *Mutic.*

No.	Tab.	Fig.
15	145	1
16	153	4
17	176	5. a. b.
18	192	6
1	134	3. a. b.
4	115	3
30	112	3
31	126	1
32	161	4. a. b.
33	173	4. a. b.
34	194	4
22	112	7
23	119	3
24	123	2. 3
25	169	7
26	170	4. 5
27	183	1
28	185	4. a. b. 5
29	199	1. 2
30	—	4. 5
31	—	6. 7
26	109	8. 9
2	158	3. a. b.
1	186	3
2	—	4
4	151	3
5	166	4. a. b.
20	171	1. a. b.
21	—	2. a. b.
1	111	1
5	103	2. 3
6	104	1. 2
21	102	5
22	109	7
23	114	6. a. b.
24	187	4
25	198	6
1	147	5
2	—	6
19	101	6
20	103	7. a. b.
21	—	8. a. b.
22	104	5
23	—	7
24	105	8. a. b.
25	123	4

CYNIPS.

Dämmerungsfalter, *f.* SPHINX.
DERMESTES.

ELATER.

Fam. II. *Serrat.*

Fam. III. *Setac.*

EMPIS.

EPHEMERA.

Erdfliege, *f.* TIPVIA.
Fächerkäfer, *f.* PTEROPHORVS.
Fallkäfer, *f.* CRYPTOCEPHALVS.
Federbuschfliege, *f.* VOLVCELLA.
Flohkäfer, *f.* MORDELLA.
FORFICVLA.
Frühlingsfliege, *f.* PHRYGANEA.
Gallapfelfliege, *f.* CYNIPS.
Goldwespe, *f.* CHRYSID.
GRYLLVS.

GYRINVS.
Hausfliege, *f.* MVSCA.
HEMEROBIVS.
Heuschrecke, *f.* LOCVSTA.
HIPPOBOSCA.
Holzkäfer, *f.* CERAMBYX.
ICHNEVMON.

No.	Tab.	Fig.
26	155	2
27	160	6
28	163	1
29	—	6
30	166	3. a. b.
31	169	6. a. b.
32	170	1
33	174	5. a. b.
1	134	5. a. b.
2	143	5
4	118	1
5	157	7. a. b.
6	167	1
12	151	5. 6
13	199	7. 8
9	104	6. a. b.
10	174	4
11	194	1
1	147	7. 8
2	192	1
3	—	2
4	—	3. a. b.
3	154	1. 2
4	156	2. 3
5	175	1. 2
6	—	3
2	144	3. 4
2	158	2. 3
3	—	4
1	134	5. a. b.
3	107	1
3	179	8. 9
51	101	4
52	103	1
53	—	4

ICH-

ICHNEVMON.

Jüngerchen, *f. LIBELLVLA.*
 Käfer, *f. PLATYCERVS.*
 Kegelkäfer, *f. CISTELA.*
 Kolbenfliege, *f. CRABRO.*
 Laufkäfer, *f. CARABVS.*
 LEPISMA.
 LEPTVRA.
 Fam. I. *Thor. cylindr.*

Fam. II. *Thor. glob.*

No.	Tab.	Fig.
54	105	5
55	107	4
56	110	3
57	111	1
58	114	1
59	116	5
60	—	6
61	119	4
62	—	5
63	120	7
64	—	8
65	126	8
66	128	5
67	—	6
68	130	4
69	132	4. 5
70	135	3
71	—	4
72	168	8
73	175	4
74	—	5. 6
75	—	7
76	176	6
77	177	4
78	—	5
79	180	6
80	183	7
81	187	1
82	195	3
83	198	3
1	134	6. a. b.
9	101	1
10	—	5
11	128	4
12	152	4
13	153	5
14	158	1
15	189	2
12	107	1
13	—	3
14	151	7

Fam. III. *Thor. conic.*

Fam. IV. *Thor. plan.*

LIBELLVLA.

Fam. I. *Al. erect.*

Fam. II. *Al. patent.*

LOCVSTA.

Marcusfliege, *f. BIBIO.*

Maulwurfskäfer, *f. SCARABAEVS.*

Mehl'käfer, *f. TENEBRIO.*

Milbe, *f. ACARVS.*

MORDELLA.

MVSCA.

Fam. I. *Spaib. rot.*

No.	Tab.	Fig.
16	112	4
17	126	7
18	182	4
19	198	7
16	103	5
17	—	6
18	108	1
6	116	1
7	117	1
8	—	4
9	—	5
10	120	4
11	—	5
12	—	6
13	121	4
14	—	5
15	176	1
16	184	1
9	106	1
10	113	5
11	125	1
12	137	1
13	160	1
14	167	4
15	174	1
16	182	1
17	186	1
18	190	3
5	138	1. 2
6	—	3. 4
7	—	5. 6
8	139	3
9	—	4. 5
10	190	1. 2
1	127	7
12	107	5
13	—	6
14	—	7
15	113	1
16	120	3
17	124	5
18	129	3
19	—	4

No.

No.	Tab.	Fig.		No.	Tab.	Fig.
20	129	5	NOTOXVS. ONISCVS. PAPILIO.	1	188	1. 2
21	130	2		3	155	3
22	146	5		4	132	1. 2
23	—	6	Fam. I. <i>Tetr. Al. angul.</i>	5	142	1. 2
24	156	1		6	146	1. 2
25	161	5. a. b. c.		7	147	3. 4
26	164	1	Fam. II. <i>Tetr. Al. integr.</i>	8	148	1. 2
27	165	7. 8		7	127	1. 2
28	167	2. 3		8	—	4. 5
29	170	6. 7	Fam. III. <i>Hex. Al. caud.</i> Fam. IV. <i>Hex. Al. ocell.</i>	9	143	1. 2
30	—	8. 9		10	148	3. 4
31	172	3		11	152	1. 2
32	—	4. 5	Fam. V. <i>Hex. Al. angul.</i> Fam. VI. <i>Hex. Al. integr.</i>	12	—	3
33	173	1		13	153	1. 2
34	177	1		14	164	4. 5
35	—	2. 3	Fam. VII. <i>Hex. Al. obliqu.</i>	15	183	2. 3
36	178	1. 2		5	143	3. 4
37	180	3		7	165	1. 2
38	181	4	PERLA. Pferdefliege, <i>f. HIBBOPOSCA.</i> PHALAENA. Fam. I. <i>Pect. Al. defl.</i>	8	168	6. 7
39	193	4. 5		9	185	1. 2
40	—	6. 7		2	120	1. 2
41	195	1. 2	Fam. II. <i>Pect. Al. plan.</i> Fam. III. <i>Pect. Al. pat.</i>	9	140	2. 3
42	197	7. 8		10	—	4. 5
14	102	6		11	159	1. 2
15	103	7	Fam. I. <i>Pect. Al. defl.</i>	12	—	3
16	118	4		13	—	4. 5
17	142	3		14	172	1. 2
18	—	4	Fam. II. <i>Pect. Al. plan.</i> Fam. III. <i>Pect. Al. pat.</i>	15	184	2. 3
19	169	4. 5		1	162	1. 2
20	179	2. 3		2	—	3. 4
21	181	7	Fam. I. <i>Pect. Al. defl.</i>	3	—	7. 8
22	187	2. 3		3	160	2. 3
23	188	4. 5		24	124	1. 2
24	193	2. 3	Fam. II. <i>Pect. Al. plan.</i> Fam. III. <i>Pect. Al. pat.</i>	25	131	1. 2
3	108	6		26	133	3. 4
4	104	3		27	136	1. 2
1	169	1	Fam. I. <i>Pect. Al. defl.</i>	28	139	1. 2
12	114	7		29	144	1. 2
13	137	2. a. b.		30	178	3. 4
14	146	4	Fam. II. <i>Pect. Al. plan.</i> Fam. III. <i>Pect. Al. pat.</i>	31	—	5. 6
15	166	1. 2		13	130	1
16	168	4. 5		6	111	7
17	179	6. 7	Fam. I. <i>Pect. Al. defl.</i>	7	122	4
18	188	1. 2		8	—	5
19	191	1		9	135	1
20	—	5. 6	Fam. II. <i>Pect. Al. plan.</i> Fam. III. <i>Pect. Al. pat.</i>	10	—	2
21	—	7. 8				Fam.
22	200	1				

Fam. II. *Spath. oblong.*

Fam. III. *Spath. trunc.*
Fam. IV. *Spath. fusif.*
Fam. V. *Spath. quadr.*
Nachtflatter, *f. PHALAENA.*
NEMOTELVS.

Fam. IV. *Setic. Al. defl.*

No.	Tab.	Fig.
15	101	2. 3
16	105	3. 4
17	108	2. 3
18	—	4. 5
19	113	5. 6
20	114	2. 3
21	—	4. 5
22	115	1. 2
23	116	2. 3
24	117	7. 8
25	118	2. 3
26	—	4. 5
27	119	7. 8
28	122	1
29	125	2. 3
30	129	1. 2
31	130	6. 7
32	134	1. 2
33	144	7. 8
34	156	5. 6
35	164	4. 5
36	165	5. 6
37	179	4. 5
38	189	4. 5
15	112	1. 2
16	119	1. 2
17	126	2
18	—	3
19	128	1. 2
20	151	1. 2
21	159	6. 7
22	163	2. 3
23	—	4. 5
24	164	6. 7
25	173	2. 3
26	176	2. 3
27	180	4. 5
28	182	5. 6
29	194	5. 6
30	195	5. 6
31	196	1. 2
32	197	3. 4
8	112	9
9	123	5
10	—	6
11	125	4
12	193	1
13	200	4

Fam. V. *Setic. Al. plan.*Fam. VI. *Setic. Al. par.*Fig. VII. *Setic. Al. consol.*Fig. VIII. *Pectin. Al. erect.*

PHRYGANEA.

PLATYCERVS.

PTEROPHORVS.

Raubfliege, f. ASILVS.

RHINOMACER.

Rüßfliege, f. BOMBYLIVS.

Sägfiege, f. TENTHREDO.

SCARABAEVS.

Fam. I. *Lam. tres.*Fam. II. *Lam. septem.*

Schabe, f. BLATTA.

Schildkäfer, f. CASSIDA.

Schildlausfliege, f. COCCVS.

Schlupfwespe, f. ICHNEVMON.

Schnaakenfliege, f. CVLEX.

Schnarrheuschrecke, f. ACRIDIVM.

Schnepfenfliege, f. EMPIS.

Schwanzfliege, f. VROCERVS.

Scorpionspinne, f. CHELIFER.

Singfliege, f. TETIGONIA.

SPHEX.

SPHINX.

Fam. I. *Int. Cand. simpl.*Fam. IV. *Int. Cand. pil.*

P

No.	Tab.	Fig.
3	102	3
4	145	2. 3
5	—	4
6	—	5. 6
7	—	7. 8
1	159	1. 2
2	173	5. 6
5	109	3. 4
6	122	2. 3
7	157	5. 6
8	168	2. 3
9	171	4. 5. 6
10	180	1. 2
11	196	4. 5
4	133	1
5	—	2
2	159	5
14	104	4
15	171	3. a. b.
30	144	5
31	—	6
32	—	7.
33	—	8
34	151	4
35	198	8
4	102	4
5	—	5
4	132	6
5	147	1. 2
6	177	6. 7
7	—	8. 9. a. b.
12	110	1. 2
13	165	3. 4
3	111	2. 3
4	135	6. 7
		STE-

STENOCORVS.

Fam. I. *Thor. armat.*Fam. II. *Thor. inerm.*Stiletfliege, *f. NEMOTELVS.*Stinkkäfer, *f. BVPRESTIS.*

STRATIOMYS.

Stutzkäfer, *f. STENOCORVS.*

TABANVS.

Tagfalter, *f. PAPILIO.*Taumelkäfer, *f. GYRINVS.*

TELEPHORVS.

Fam. II. *Ouet.*

TENEBRIO.

Fam. I. *Ant. lentif.*

TENTHREDO.

Fam. I. *Ant. setac.*Fam. II. *Ant. filif.*Fam. II. *Ant. clav.*

No. Tab. Fig.

6 140 1

13 115 7

14 116 7

15 118 7

8 110 4. 5

9 119 6

10 198 4. 5

5 122 7

6 124 4

7 130 6

8 131 3

9 — 4

10 — 5

11 — 6

12 182 2. 3

13 184 4. 5

14 — 6. 7

5 105 9. a. b.

6 189 3. a. b.

4 130 6

7 105 6

8 109 1

9 110 6. 7

10 113 7

11 115 4

12 167 5. 6

13 170 2. 3

14 191 2. 3

15 197 1. 2

16 200 3

5 105 7

6 179 1

11 109 2

12 114 8

13 125 5

14 — 6

15 130 3

Fam. IV. *Ant. pett.*

TETIGONIA.

TIPVLA.

Fam. I. *Al. pat.*

VESPA.

Vferaasfliege, *f. EPHEMERA.*

VOLVCELLA.

VROCERVS.

Waffenfliege, *f. STRATIOMYS.*Wanze, *f. CIMEX.*Zuckergast, *f. LEPISMA.*

No. Tab. Fig.

16 181 5. 6

17 186 2

18 — 3

19 190 4. 5

20 194 2. 3

21 200 1

5 116 4

6 126 5. 6

7 154 3. 4

8 — 5. 6

9 158 3. 4

2 121 1

3 153 3

10 105 5

11 — 6

12 111 5

13 — 6

14 115 5

15 — 6

16 117 6

17 126 4

18 156 7

19 161 1

20 162 5

21 — 6

22 181 1

23 — 2

24 — 3

25 183 4

26 — 5

27 196 3

16 113 8

17 117 2

18 — 3

19 122 6

20 127 3

21 — 6

22 136 3

23 190 7

8 113 3

6 121 3



