

Biblioteka Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie.

S. 12.7. N. 103.



**Digitization of the scientific library of the
State Museum of Natural History of NAS**

Pflanzenblätter in Naturdruck mit der botanischen kunstvrache für
die Blattform: [Atlas] / gesamt. und herausgegeben von G. Ch. Reuss.
– 2-Aufl. – Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, [s.a].
– 42 Taf.

Download a copy of the book from the site:

<http://libsmnh.com.ua>

Permanent link to the book page:

http://libsmnh.com.ua/books/pflanzenblatter_in_naturdruck/

58.



1990

Nr. inventarza

A - 1279.

Pflanzenblätter in Naturdruck

mit

der botanischen Kunstsprache für die Blattform

gesammelt und herausgegeben von

Professor Dr. G. Ch. Reuch in Wm.



42 Foliotafeln

mit erläuterndem Text in Oktav.

Zweite Auflage.

Stuttgart.

G. Schweizerbart'sche Verlagshandlung

(Eduard Koch).

62161 56161
19189

Umfangslinie der Blätter.

Peripheria foliorum.

Périphérie des feuilles.

d) verkehrt-eiförmiges Blatt;
folium obovatum;
feuille obovée.



11.
Hüllblatt der
Sonnenschein-
Wolfsmilch;
Euphòbia
helioscòpia. L.
(*folium involucrele*)



12.
süße
Kirsche;
Prúnus ávium. L.
Cerasus dulcis. Gärtn.




13.
Trauben-
kirsche;
Prúnus
Pádus. L.



14.
vierblättrige
Eibe;
Páris
quadrifólia. L.

e) eiförmiges Blatt;
folium ovatum;
feuille ovée.



8.
eiförmige
Kennecke;
Kennédya
ováta. Sims.



9.
blaue Taglilie
oder
Funkie;
Hemerocállis
caerulea. Andr.
Fúntia
ováta. Spreng.



10.
gemeiner
Quittenbaum;
Cydónia
vulgáris. Pers.

b) oval; ovale;
richtiger: regelmäßig-elliptisch;
ellipticum sensu strictiori;
elliptique proprement dite.



5.
Endblättchen des
gemeinen Süßholzes;
Glycyrrhiza glabra. L.
(*foliolum terminale*)



6.
nachblättrige
Mannstreu;
(Wurzelblatt)
Eryngium
plánum. L.
(*folium radicale*)



7.
dickblättriger
Steinbrech;
Saxifraga
crassifólia. L.


a) rundliches Blatt;
folium subrotundum;
feuille arrondie.



1.
Perücken-
strauch;
Rhus
Cótinus. L.



2.
rundblättriges
Wintergrün;
Pyrola
rotundifólia. L.



3.
wurzelrankiger
Steinbrech
oder Frauenkraut;
Saxifraga
sarmentósa. L.




4.
graue Eiche;
Alnus incána. L.

c) lanzettlich;
lanceolatum;
lancéolée.




13. Mai-
blume;
Convallá-
ria majá-
lis. L.

b, 3) ADB kettenlinig;
ad lineam catenariam;
roulée en chaînette.




10. Kleinblumiges
Weiden-
Köschchen;
Epilóbium
parviflorum.
Schreb.

b, 2) ADB wellenbergig;
undans; représentant une onde
en profil.



7. rispen-
blüthige
Flammen-
blume;
Phlox
paniculáta. L.

b) nach älterer Bezeichnung: elliptisch;
ellipticum (sensu ambiguo);
en ellipse improprement dite.



4. Leopold's
Aphelandra;
Aphelandra
Leopóldi. Nees.

a) länglich; oblongum;
oblongue; richtiger: ablang-
elliptisch; oblongo-ellipticum;
en ellipse oblongue.




1. Wund-
klee
(Wurzelblatt)
Anthyllis
vulnerária.
L. (folium
radicale).




14. Ole-
ander;
Nérium
Oleánder.
L.




11. Rawson's
Alpen-Rose;
Rhododéndron
Rawsonii.
Paxt.



8. Goldrute;
Solidágo
Virga aurea.
L.



5. orangefarbige
Maclure;
Maclúra
aurantiaca. Nutt.




2. Wiesen-
Distel;
Cirsium
oleráceum. All.




15. Feuer-
lilie;
Lilium
bulbiferum.
L.



12. B. ausdauerndes
Singelkraut;
Mercuriális
perennis. L.



9. B. gestreute
Kuetlie;
Ruéllia
maculáta.
Wall.



6. chinesishe
Wistarie;
(unpaariges Endblatt)
Wistária
chinensis. DC.
(pinna impar).



3. Kürken-
bund;
Lilium
Mártagon. L.

e) schwertförmig;
ensiforme;
ensiforme.

b) lanzett-linealisch;
lanceolato-lineare;
linéaire à la lance.

a) lineal-lanzettlich;
linéari-lanceolatum;
linéaire-lancéolée.



6.
deutsche
Schwert-
Lilie;
Iris
germanica. L.

7.
Wasser-Schwert-
Lilie;
Iris Pseudacorus. L.

4.
großes
Manna-
Gras;
Glyceria
spectabilis.
M. & Koch.

5.
Bähe
Flachs-Lilie;
Phormium
tenax.
Forst.

3.
glänzendes
Kuhgras;
Lasiagróstis
splendens.
Kunth.

2.
gemeines
Schilfrohr;
Phragmites
communis.
Trin.

1.
Mais;
Welschkorn;
Zea Máys. L.

g) schuppenförmig;
squamiforme;
squamiforme.

e) haarförmig;
capilliforme;
capilliforme.

d) borstenartig;
setaceum;
setacée.

b) lineal, linealiförmig; lineaire; lineaire.



14.
chilische Libocedrus;
Libocedrus chilensis. Endl.
(ein Zweig, ramus).



10.
Wasser-Froschkraut;
Batrachium aquatile. Mey.
(ein Zweig, ramus).



9.
Gemüse-Spargel;
Asparagus officinalis. L.
(ein Zweig, ramus).



5.
Weiß-Tanne;
Abies pectinata. DC.
(ein Zweig, ramus).



4.
Eiben-Baum; Taxbaum;
Taxus baccata. L.
(ein Zweig, ramus).

f) pfriemlich; subulatum; subulé.

e) nadelförmig; aciculäre.


a) sichelförmig; falcatum, falciforme.




13.
japanische
Aryptomeria;
Cryptomeria
japonica. Don.
(ein Zweig, ramus).



11.
Acacia (squamata?)
Lindl.
(schuppige) Akazie;
(ein Zweig, ramus).



8.
Lärche;
Pinus Larix. L.
(ein Büschel,
fasciculus).



3.
gemeiner Cannenwedel;
Hippuris vulgaris. L.
(ein Quirl, verticillus).



12.
virginischer Wachholder;
Juniperus virginiana. L.
(ein Zweig, ramus).



6.
österreichische
Schwarz-Aiefer;
Pinus Laricio. Poir.
var. austriaca.



7.
nordamerikanische
Weymouths-Aiefer;
Pinus Strobus. L.



2.
Rivini's
Sicheldolde;
Falcaria Rivini. Host.
(Wodenblatt, fol. infimum).

1.
sensenblättrige Akazie;
Acacia falcata. Willd.
(Blattstiel-Blätter, phyllodia).

g) schuppenförmig;
squamiförmig;
squamiforme.

e) haarförmig;
capilliförmig;
capilliforme.

d) borstenartig;
setaceum;
setacée.

b) lineal, linealisch; lineaire; lineaire.



14.
chilische Libocedrus;
Libocedrus chilensis. Endl.
(ein Zweig, ramus).



10.
Wasser-Froschkraut;
Batrachium aquatile. Mey.
(ein Zweig, ramus).



9.
Gemüse-Spargel;
Asparagus officinalis. L.
(ein Zweig, ramus).



5.
Weiß-Tanne;
Abies pectinata. DC.
(ein Zweig, ramus).



4.
Eiben-Baum; Torbaum;
Taxus baccata. L.
(ein Zweig, ramus).

f) pfriemlich; subulatum; subulée.

e) nadelförmig; aciculäre.

a) sichelförmig; falcatum, falciforme.




13.
japanische
Cryptomeria;
Cryptomeria
japonica. Don.
(ein Zweig, ramus).



11.
Acacia (squamata?)
Lindl.
(schuppige)
Akazie;
(ein Zweig, ramus).



8.
Lärche;
Pinus Larix. L.
(ein Büschel,
fasciculus).



3.
gemeiner Cannenwedel;
Hippuris vulgaris. L.
(ein Quert., verticillus).



12.
virginischer Wachholder;
Juniperus virginiana. L.
(ein Zweig, ramus).



6.
österreichische
Schwarz-Kiefer;
Pinus Laricio. Poir.
var. austriaca.



7.
nordamerikanische
Weymouths-Kiefer;
Pinus Strobus. L.



2.
Rivini's
Sicheldoldc;
Falcaria Rivini. Host.
(Bodenblatt, fol. infimum).

1.
senfenblättrige Akazie;
Acacia falcata. Willd.
(Blattstiel-Blätter, phyllodia).

e) neuneckig;
novem angulatum;
neuf-angulé.



6. großes
Larvigium;
Farfugium;
grande.

d) siebeneckig;
septangulatum;
septangulé.



5. kletternde Aikanie;
Mikania scandens. Willd.

c) fünfeckig;
quiquangulatum;
quinquangulé.



4. Barclay's Maurandie;
Maurandia Barclayana. Bot. Beg.

b) rautenförmig;
rhombum;
en rhombe.



3. Pyramiden-
Pappel;
Populus
pyramidalis.
Rosier.

fast
quadratisch;
subquadratum;
sous-carrée.




2. gemeine
Wassernuß;
Trapa natans.
L.

a) dreieckiges Blatt;
triangulatum;
triangulé.




1. blasen-
früchtiger
Ampfer;
Rumex
vesicarius;
L.

f) glocken-
linig; campanale;
campanale.



7. Sarsaparill-
Stechwinde;
Smilax Sarsaparilla. L.



8. Bierliche
Dinnie; Zinnia
elegans. Jacq.

g) keilig; keilsförmig;
cuneatum;
cunéiforme; en coin.



9. Banister's
Eiche;
Quercus
Banisteri.
Michx.



10. silge-
artige Pistie;
Pistia
Stratiotes. L.

h) spieß-
förmig;
hastatum;
hastée.



13. dreitheilige
Einschuppe;
Monolopia
trifida. Schrad.

i) spatelig;
spatulatum;
spatulée;
en spatule.



16. Weiße
Wucher-
blume;
Chrysanthemum
Leucanthemum.
L.

k) zungig; zungenförmig;
linguiforme;
linguiforme.



18. weißblühende
Blutblume;
Hemantus
albillos. Jacq.

11. ein Fiederblättchen
von
Martinézia caryo-
taefolia. H. B. K.
(foliolum).



12. Bastard-
Fettheune;
Sedum
spurius. Bieb.



14. Winter-
Spinat;
Spinacia
spinosa. Mönch.




15. seitenblühiger
Erdbeer-
Spinat;
(oberste
Blättchen).
Blitum
virgatum. L.
(folia summa.)

a) pfeilförmig,
mit verwandten Formen.

*folia sagittata
et similia;*


*feuilles sagittées
et autres semblables.*




4.
Winter-Spinat;
Spinacia spinosa.
Mönch.



2.
gestreckter Aron;
Arum maculatum L.



1.
gemeines Pfeilkraut;
Sagittaria sagittifolia. L.



8.
geflügelte Yamswurzel;
Dioscorea alata. L.



3.
Drahenwurz;
Zantedéschia aethiópica. Speg.
Calla aethiópica. L.



9.
wappen-
schildförmiger
Ampfer;
Rumex scutatus. L.



6.
Heil-Melde;
Blitum Bonus Henricus.
C. A. Meyer.



5.
Heil-Melde;
*Blitum Bonus
Henricus. C. A. Meyer.*




7.
windenartiger Anöterich;
Polygonum Convólulus. L.



d) am Grunde schief-herzförmig;
basi oblique cordatum;
obliquement cordée à la base.

b) herzförmig; cordatum;
cordée.

a) niereförmig; reniforme;
reniforme; en forme de rein.



9.
gewöhnliche Wunderblume;
Mirabilis Jalappa. L.



8.
Großblättrige Linde;
Früh-Linde;
Tilia grandifolia. Ehrh.

4.
Wohlrichendes
Veilchen;
März-Veilchen.
Viola odorata. L.
(cultiv.)



2.
gebräuchliche
Pestwurz;
Petasites
officinalis. Mönch.
Strauß-Lattich;
Tussilago Petasites. L.

e) unsymmetrisch; asymmetricum; asymétrique;

e) verkehrt-herzförmig;
obcordatum; obcordée.

f) halbmondförmig; semi-lunatum;
lunulée ou en croissant.

eines der paarigen
Blättchen;
foliolum par.



11.
gemeine Bohne;
Phaseolus vulgaris. L.

12.
gestreiftes Schirfblättchen;
Begonia maculata. Radd.

5.
gehörnter Sauer-Alec;
Oxalis corniculata. L.

6.
kurzstieliger
Weis-Alec;
Bohnenbaum;
Cytisus
sessilifolius. L.

13.
Scharlach-Pelargonium;
Storchschnabel;
Pelargonium Smith's Scarlet. Bosset.


e) am Grund abgestuftes Blatt;
folium basi-truncatum;
feuille tronquée à la base.



4.


Gold-Johannisbrot;
Ribes aurum. Pursh.

h) an der Basis abgerundet; a) am Grund unsymmetrisch; ungleich;
basi rotundatum;
arrondie à la base. *basi asymmetricum; inaequale;*
asymétrique à la base.



3.

zugespitzter
Austerrich;
Polygonum
acuminatum. H. B.



2.

Balsam-
Pappel;
Pópulus
balsamifera. L.



1.

Kletternde Klobia;
Cobrea scandens. Cuv.


g) am Grunde
verbreitert;
basi dilatatum;
élargie à la base.



9.

gelber
Asfodill;
Asphodellus
luteus. L.

f) verwachsen; *connatum*; *connée.*



8.


Grasblatt;
Lonicera Caprifolium. L.

e) durchwachsen; *perfoliatum*; *perfoliée.*



7.


durchwachsenes
Bäpfschenkraut;
Uvularia perfoliata. L.



6.

durchwachsenes
Hasenohr;
Bupleurum perfoliatum.
Mönch.

d) schildstieliges Blatt;
folium peltatum; *feuille peltée.*



5.

Apuziner-Aresse;
Tropaeolum majus. L.

l) am Grunde
keilförmig;
basi cuneatum;
cunéiforme à
la base.



15.

Wilde Gleditschie;
Gleditschia ferox.
Desf.

k) in den Blattstiel verschmälert;
in petiolum angustatum;
rétrécie vers le pétiole.



14.

Weidenblättrige
Stevie;
Stevia salicifolia.
Cuv.

i) am Grund (asymptotisch) verschmälert;
basi angustatum; *rétrécie à la base.*



12.

Patschuli;
Pogostemon Pátchouli.
Pellet.



11.

gemeines Tollkraut;
Tollkirsche;
Atrópa Belladónna. L.


h) am Stiel herab-
laufend;
praeter petiolum decurrens;
descendant le long du pétiole.




10.

Aurikel;
Primula Auricula. L.


e) mit Nebenblättern; stipulatum; stipulé.




d) geohrt; basi auritum; oreillée à la base.




e) am Grund ohrläpplig basi auriculatum; à lobes d'oreille à la base.





h) pfeilförmig basi sagittatum; sagittée à la base.





a) Am Grunde spießförmig; basi hastatum; hastée à la base.




g) am Grunde nierenförmig; basi reniforme; réniforme à la base;



f) am Grunde herzförmig; basi cordatum; cordée à la base.




k) geschlossen-gespalten; basi clauso-fissum; fentée à lobes se couvrant à la base.



l) offengespalten; basi aperto-fissum; ouvertement fentée à la base;



h) gespalten; basi fissum; fentée à la base.



gemeiner Froschbiß; Hydrócharis L. Morsus ranae. L.

Ortgies Seeros; Nymphaea Ortgiesiana. Planch.

gelbe Seidrose; Nieren-Blume; Nuphar luteum. Smith.

Alpen-Sothen-Blume; Epimedium alpinum L.

zweiblättrige Schattenblume; Majánthemum bifolium. D. C.

große Alette; (unteres Blatt) Lappa major. Gärtn. (fol. inferius).

herzblättriger Trompetenbaum; Catalpa cordifolia. Mönch.

blatternarbiges Pfeffer; Piper bullatum. Vahl.

fuchsschwanz-ähnliche Hautkraut; Onónis alopecuroides. L.

ebensträufiger Kainfaru; Tanacétum Balsamita. L.

klebriger Tabak; Nicotiana glutinosa. L.


Kuhflohkraut; Pulicaria dysenterica. Gärt.

Färberwaid; Isatis tinctoria. L.

1. und 2.

Gemeine Flockenblume; Centauria Jacéa. L.

c) stumpf; folium apice obtusum; — feuille obtuse au sommet.




7. Dost; Origanum vulgare. L. 6. Wolfsmilch; Euphorbia amygdaloides. L. 5. schreckiges Sinngrün; Vinca variegata.

b) zugerundet; apice rotundatum; très-obtuse au sommet.




4. prächtiger Ehrenpreis; Veronica speciosa. Cunnigh. 3. rundblättriger Haderlos; Lysimachia nummularia. L.

a) an der Spitze abgestutztes Blatt; folium apice truncatum; — feuille tronquée au sommet.




2. vierblättriger Sauerbitter; Oxalis tetraphylla. Cav. 1. Eulpenbaum; Liriodendron Tulipifera. L.

e) zugespitzt; — apice acuminatum; — acuminée au sommet.




13. Spindelbaum; Pflaume; Evonymus europaeus. L. 12. Kelchblume oder Gewürzstrauch; Calycanthus floridum. L. 11. gemeines Lungenkraut; Pulmonaria officinalis. L.

d) spitz; — apice acutum; — pointue au sommet.




10. Hundswürger; Cynanchum Vincetoxicum. R.Br. 9. einjährige Sonnenblume; Helianthus annuus. L. 8. ganzblättrige Waldrebe; Clematis integrifolia. L.

h) fein gespißt; cuspidatum; — cuspidée.



20. Blättchen des Hanf; foliolium Cannabis sativae. L. 19. gefleckte Kuckelie; Ruellia maculata Wall.

g) sehr lang zugespitzt; — longissime acuminatum; — acuminée le plus long.




18. Japanischer Kanukelstrauch; Córchorus japonicus. Thunb. 17. unpaariges Blättchen der amerikanischen Erdnuß; Glycine Apios, L. pinnis impar.

f) lang zugespitzt; longe acuminat.; très-acuminée.



16. Goldruth; Solidago Virgaurea. L.

Fortsetzung: e) zugespitzt; — apice acuminatum; — acuminée.



15. edle Birne; Pyrus communis. L. kultivirt. 14. Aprikose; Prunus persicoides. Pers.

d) ausgerandetes Blatt; folium apice emarginatum; échancrée au sommet;

3) spitzwinklig; ángulo acúto; en angle aigu.



7. Kelchblatt der weiblühenden Bärenklaur; *Acánthus mollis L.* (sépalum.)

2) verkehrt-herzförmig; ángulo oboordáto; en angle oboordé.




6. Saamenblatt der dreifarbigen Winde; *Convólulus tricolor.* (folium seminále.)

1) stumpfwinklig; ángulo obtuso; en angle obtus.



5. Eulpenbaum; *Liriodéndron Tulipifera. L.*

e) an der Spitze abgebissen; apice praemorsum; mordue au sommet;



4. eichblättrige Bankse; *Bánk-sia quercifolia. R. Br.*

h) an der Spitze eingedrückt; apice retusum; rétuse ou écrasée au sommet;



3. lederblättrige Cassine; *Cassine Maurocénia. L.*



2. balearischer Buchsbaum; *Buxus balearica. Lam.*

a) an der Spitze eingedrückt mit verlängerter Achse; retusum axi prolongato; rétuse à l'axe prolongé.



1. Siederblättchen der Saat-Wicke; *Vicia sativa. L.* (foliolum.)

h) dreispitzig; tricuspidatum; tricuspidée.




14. pennsylvanischer Ahorn; *Acer pensylvanicum. L.*

g) stumpf ohne Stachelspitze; apice muticum; mutique au sommet.



13. knollige Fetthenne; *Sedum Telephium. L.* *Sedum purpurascens. Koch.*

f) sechsspaltig; apice sexifidum; sexifide au sommet.



12. a & b (Deckblätter) der sinkenden Nieswurz; *Helleborus foetidus. L.* (bractéae.)

zweispaltig an der Spitze; apice bifidum; bifide au sommet.



10. Rasenförmiger Steinbrech; *Saxifraga caespitosa. L.* 11. astmoosähnlicher Steinbrech; *S. hypnoides. L.*

e) an der Spitze gekerbtes Blatt; folium apice crenatum; feuille crénée au sommet.



9. Limonenbaum; *Citrus Limónum. Risso.*



8a & b chamädrisblättrige Spierstaude; *Spiraea chamädryfolia. L.*

m) stehend; pungens; piquant au sommet.



23. chinesisches Cunninghamia; *Cunninghámia sinénsis. Rich.*

22. stehender Mäusedorn; *Ruscus aculeatus. L.*

l) dornig; spinoso-mucronatum; terminée en épine.



21. großblättrige Stielfrucht; *Podocarpus macrophyllus. Wall.*

20. lanzettblättrige Arachdistel; *Cirsium lanceolatum. Scop.*

k) borstenspitzig; apice setaceo-mucronatum; munie de soie au sommet.



19. Stengelblatt der größeren Alette; *Lappa major. Gärtn.* (folium caulinum.)

18. orientalisches Mohn; *Papáver orientale. L.*

l) haarspitzig; apice piliferum; feuille terminée en poil au sommet.



17. weidenblättrige Eiche; *Quercus Phellos. L.*

16. Alatsch-Mohn; *Papáver Rhoeas. L.*

15. Kelchzipfel der blauen Passionsblume; *Passiflora cerulea. L.* (lacinia calycis.)

c) wellenrandig; wellig;
margine undulatum;
ondulée au bord.

Sieher
gehört auch
Ardisia
Nr. 13.




5.
Edler Lorbeer;
Laurus nobilis. L.

h) dickrandig oder nervenrandig;
margine incrassatum sive margine nervosum;
épaissie au bord.



4.
Lampher-Lorbeer;
Cámpthora officinális.
Nees.



3.
Lorbeerblättriger
Fischbeeren-Baum;
Cocculus laurifolius. Dec.

a) bordirt; gerandet; berandet;
marginatum; bordée.



2.
japanischer
Spindelbaum;
Evonymus japonicus.
Thbg.



1.
lanzettblättriger
Prachtsaden;
Callistémon lanceolatum.
Dec.

e) unzertheilt; indivisum; oder ganz; integrum; entière, indivisée;



13.
gckerbelte Spißblume;
Ardisia crenulata. Vent.




12.
bemalte Strahlblume;
Anthocercis picta.



15.
wolliger Schneeballenstrauch;
Viburnum Lantana. L.




14.
afrikanische Grewie;
Grévia occidentális. L.



16.
abendländischer
Bürgel-Baum;
Celtis occidentális. L.

d) ganzrandig; integerrimum; oder ungezahnt; indentée.




7.
brennende
Malpighie;
Malpighia urens. L.



6.
glatter Wegdorn;
Rhamnus Frángula. L.




9.
ceylonische Nacht-Achre;
Gymnostáchyum ceylánicum.
Arn. et Nees.



8.
kleinblüthige
Gauhinie; Bauhinia parviflora. Vahl.




10.
Ahorn von Montpellier;
Acer monspessulanum L.




11.
Canadischer Mondsaame;
Menispermum canadense. L.

e) kraus; *crispum*; *frisée*.




4.
krause Kaspappel.
Malva crispa. L.

b) am Rand ausgefressen;
marginē erōsum; *rongée au bord*;



3.
Kruhsarnblättrige
Salisburia;
Salisburia adiantifolia. Smith.

a) Randschweifig; ausgeschweifit;
marginē repāndum; *chantournée au bord*.



2.
Hahnenkamm-ähnlicher
Luchs Schwanz;
Amaranthus celosoides. H. B.

1.
Beißbeer-artiger
Nachtshatten;
Korallen-Airsche;
Solanum Pseudo-Capsicum. L.

f) doppelt-gekerbt; *duplicato-crenatum*;
doublement crénée.




8.
rothblühende
Wald-Salbei;
Salvia sylvestris. L. (fl. rubro).

e) fein-gekerbt; gekerbelt; *crenulatum*; *crenulée*.



7.
Meer-Kettig;
Cochlearia armoracia. L.

d) grob-gekerbt;
grosse crenatum;
grossièrement crénée.



5.
gebräuchliche Betonie;
Betonica officinalis. L.

k) schief-gekerbt;
oblique crenatum;
crénée en biais.



12.
Richard's Planera;
Planera richardi. Michx.

i) stumpfwinklig-gekerbt mit Stachelspitzen;
crenatum angulis obtusis et mucronatum;
crénée en angles obtus et mucronée.



11.
Sumpfs-
Dotterblume;
Caltha palustris. L.

h) rundbogig-gekerbt;
semicirculari-crenatum;
crénée en demicircles.



10.
gebräuchliche Betonie;
Betonica officinalis. L.

g) spitzbogig-gekerbt;
crenatum ad arcum gothicum;
crénée en arc gothique.




9.
Verschaffel's Scheidenlippe;
Caltha palustris. hort.

c) groß- oder grobgezähnt;
grosse dentatum;
grossièrement dentée;



4.
österreichische Gieswurz;
Doronicum austriacum. Jacq.

b) gezähnt; dentatum; dentée;
2) mit Drüsen-Spitzchen;
mucronibus glandulosis;
à mucrones glanduleux.




3.
kugelförmige Fuchsie;
Fuchsia globosa. Lindl. Lodd.

1) ohne Spitzchen;
sine mucronibus;
sans mucrones.



2.
Bunge's Loosbaum;
Clerodendron Bungei. Steud.

a) feingezähnt; gezähnelte;
denticulatum;
dentelée; denticulée;



1.
persische Erdschibe;
Cyclamen persicum. Mill.

h) doppelt-gezähnt;
duplicato-dentatum;
doublement dentée.




9.
bunte Gaukler-Blume;
Mimulus quinquevulnerus.
hort. gelb. (hybrid.)

g) tief und ungleich gezähnt;
profunde ac inaequaliter dentatum;
profondément et inégalement dentée.



8.
Gift-Salat;
Lactuca virôsa. L.

f) leicht-gezähnt;
leviter dentatum;
légèrement dentée.



7.
gemeine Nachtschule;
Hesperis matronalis. L.

e) sägeartig-gezähnt;
serrato-dentatum;
serrato-dentée.



6.
Fuchsische Greiskraut;
Baldgras.
Senecio Fuchsii. Gmel.

d) sägeartig-gezäh-
nelt;
serrato-denticulatum;
serrato-denticulée.



5.
krauses Laidkraut;
Potamogeton crispus. L.

k) sinusoidisch-geschweift;
repandum margine sinusoideo;
chantournée à marge sinusoïde.



13.
Anoblauchkraut;
Sisymbrium Alliaria. Scop.

l) buchtig-gezähnt; sinuato-dentatum; sinuato-dentée.
3) und zugleich gezähnelte;
sinubus denticulatis; à sinus dentelés.



12.
gemeiner Hufslattich;
Tussilago Färfara. L.

2) mit Dornspitzen;
dentibus spinoscentibus;
aux dents spinoscentes.



11.
schreckliche Stechpalme;
Ilex Aquifolium. L. variegata.

1) ohne Spitzchen;
sine mucronibus;
sans mucrones.




10.
Sastard-Gänsefuß;
stechapfelblättriger Gänsefuß;
Chenopodium hybridum. L.

Gesägte Blätter.

Folia serrata.

Feuilles serrées.

d) stumpf-gesägt; obtuse serratum; serrée à dents obtuses.



6.

Sumpf-Biest; Kopf-Nessel; Stachys palustris. L.

e) gleich-gesägt; aequaliter serratum; serrée à dents égales.



5.

Acker-Hahnenkamm oder Klappertopf; Rhinanthus Alectorolophus. Pollich.

b) spitz-gesägt; acute serratum; serrée à dents aiguës.



4.

zweihäufige Nessel; Urtica dioica. L.



3.

aufrechte Cercodie; Cercodia erecta. Murr.

a) scharf-gesägt; argute serratum; serrée à dents aiguës.



2.

virginischer Ehrenpreis; Veronica virginica. L.

1.


Bertrams Schafgarbe; gemeiner Dorant; Achillea Ptarmica. L. (ein Abschnitt; segmen).

g) eingeschnitten-gesägt; inciso-serratum; inciso-serrée.



11.

weiche Bärenklau; Acanthus mollis. L. (Deckblatt; bractea).



10.

kugel-ährlige Nessel; pillen-tragende Nessel; Urtica pilulifera. L.

f) ungleich-gesägt; inaequaliter serratum; inégalement serrée.



9.

gemeiner Wolfsfuß; Lycopus europaeus. L.



8.

gemeine Flockublume; Centaurea Jacca. L.



7.

gemeiner Wolfsfuß; Lycopus europaeus. L.


k) leicht-gesägt; leviter serratum; légèrement serrée; serrelée.



15.

Airsch-Lorbeer; Prunus Laurocerasus. L.


i) weitläufig-gesägt; remote serratum; serrée à grands intervalles; remoto-serrée.



14.

Japanische Aukuba; Aucuba japonica. L.

h) fein-gesägt; serrulatum; serrulée.



13.

liebliche Weigelle; Weigelia amabilis. Planch.



12.

drüsiges Springfame; Impatiens glandulifera. Arn.

c) schorfig-gesägt;
crustáceo-serratum;
serrée à croûtes.



5.

traubenblühiger
Steinbrech;
Saxifraga aizoides. Jacq.

b) drüsig-gesägt;
glanduloso-serratum;
glanduloso-serrée.



4.


Endblättchen der Moosrose;
Rosa muscosa. Aiton.
(foliolium impar.)

a) doppelt-gesägtes Blatt;
folium duplicato-serratum; *feuille biserrée.*




3.

schimmernder Weißdorn;
Crataegus lucida. Mill.



2.


gemeine Hainbuche;
Carpinus Betulus. L.



1.

Feld-Kiefer; Ulme;
Ulmus campestris. L.

e) fachelspitzig-gesägt;
mucronato-serratum;
mucronato-serrée;



9.

wohlriechender Pfeifenstrauch;
wilder Jasmin;
Philadelphus coronarius. L.

d) hakig-gesägtes Blatt;
folium hamato-serratum; *feuille serrée à hameçons*;




8.

ährlige Kapuzel;
Teufelskralle;
Phytolacca spicata. L.



7.


schiefe Schildblume;
Chelone obliqua. L.



6.

canadischer Schneeball;
Viburnum Lentago. L.


h) dornig-gesägt;
spinescenti-serratum;
serrée à épines.



14.


nützlicher Schraubenbaum;
Pandanus utilis. Bory.
(ein Abschnitt; segmentum.)

g) borstig-gesägt;
setaceo-serratum; *serrée et munie de soies.*



13.

Wiesendistel;
Aohl-Arabisdistel;
Cirsium oleraceum. Scop.
(Deckblatt; bractea.)



12.

gemeiner Sauerdorn;
Erbfelen;
Berberis vulgaris. L.

f) wimperig-feingesägtes Blatt;
folium ciliato-serratum; *feuille serrée à cilioles.*




11.

pontischer Felsenstrauch;
Azalea;
Azalea pontica. L.



10.


Plumbago-ähnliche
Valeraria;
Valeraria plumbaginoides.
Boiss.



4.
klimmender Hopfssaame;
Lophospermum scandens. D. Don.



3.
dreihörniger Springsaame;
Impatiens tricornis. Lindl.



2.
scharfe Deutzia;
Deutzia scabra. Thbg.



1.
Erdbeer-Spinat;
Blitum virgatum. L.



8.
glatter Trichterkehl;
Molucella laevis. L.



7.
Plumier's Duranta;
Duranta Plumieri. L.



6.
gezählter Schneeballen-Baum;
Viburnum dentatum. L.



5.
Bitter-Pappel; Aspe; Espe;
Populus tremula. L.



11.
Cortusische Schlüsselblume;
Prinula cortusoides. L.



10.
weiße Birke;
Betula alba. L.



9.
Gerold's Gesnerie;
Gesneria Geroldiana. Kunth.

Num. Als Eigenheit dieser Gattung fällt auf, daß aus einzelnen Aeren eine zweite Blattfläche, d. h. ein wirkliches Doppelblättchen entspringt, hier an sieben Stellen.



4.
Scharlach-Eiche;
Quercus coccinea. *Wangenh.*



3.
Stiel-Eiche;
Quercus petunculata. *Ehrh.*



2.
mähnige Eiche;
Quercus Tauzin. *Pers.*



1.
Berr-Eiche;
Quercus cerris. *L.*



7.
großblättrige Eiche;
Quercus macrophylla. *Nees.*




6.
rothe Eiche;
Quercus rubra. *L.*



5.
Trauben- oder Stein-Eiche;
Quercus sessiliflora. *Smith.*



8.
gemeine
Wegwarte;
Cichorie;
Cichorium
Intybus. L.



7.



6.
rauhe
Gänsefußel;
Sonchus asper.
Vill.



5.
Sinkender Schwein-
Salat, Stinksalat;
Apösëris foetida. Lessing.
Hyösëris foetida. L.



4.
zweijährige
Grundseßel;
Crepis biennis. L.



3.

officinelles
Pflasterrohrchen;
Taraxacum officinale.
Wigg.



2.



1.
officinelles
Pflasterrohrchen;
Taraxacum officinale.
Wigg.



7.
Herbst-
Löwenzahn;
Leontodon
autumnalis. L.
Oporinia
autumnalis. Don.



6.
Dach-Grundfeste;
Crepis
tectorum. L.



4.



5.

veränderliche
Grundfeste; Crepis biennis. L. β. lacēra. B.
oder Crepis virens. Will.



3.
Aker-Gänsefußel;
Sonchus arvensis. L.



2.
officinelles Pfaffenröhren;
Taraxacum officinale. Wigg.



1.


Endivien-Salat;
Endivien-Wegwarte;
Cichorium Endivia. L.



1.
geschlicht-blättrige Haselnuß;
Corylus Avellana. L.
var. *laciniata*. Lodd.



4.
farn-blättrige
Birke;
Betula alba. L.
var. *filicifolia*, hort.



9.
zerschnittener
Ahorn;
Acer dissectum.
Thunb.



3.
farnfarn-blättrige
Linde;
Tilia asplenifolia,
hort.



8.
Berr-Eiche, *Quercus Cerris*. L. var.



2.
farnfarn-blättrige
Buche;
Fagus sylvatica. L.
var. *asplenifolia*. Lodd.




5.
farn-blättrige Eiche;
Quercus filicifolia, hort.



6.
Eiche;
Quercus affinis, hort.



7.
Schön-Eiche;
Quercus elegans. Bl.




4.
edle Weinrebe; Alceuer;
Vitis vinifera. L.
var. *clavennensis*. *Dierb.*



2.
epheublättriges
Leinkraut;
Bimbelkraut;
Linaria
Cymbalaria. *Mill.*




8.
gemeiner Hopfen; wild
Humulus Lupulus. L.



5.
vielfaltiger
Kürbis;
Cucurbita Pepo. L.
var. *Anguria hort.*



9.
angenehmer Haargrissel;
Pylogyne suavis. *Schrad.*



3.
dreilappiges
Leberkraut;
Hepatica
triloba. *Chaix.*



6.
gemeiner Feigenbaum; *Ficus carica*. L.



1.
gemeiner
Frauenmantel;
Sinau;
Alchemilla
vulgaris. L.



7.
Abart der gemeinen Feige; *Ficus carica*. L. var.



1.
Platanus;
Platanus occidentalis. L.



2.
ächter Balsampfehl;
Momordica Balsamina. L.




3.
spitzblättriger
oder Platanen-Ahorn;
Acer platanoides. L.




4.
riehblättriges Weisblatt;
Symphoricarpos racemosus. Michx.



5.
fünflappige
Jaunrübe;
Bryonia
quinceloba. Thunb.



6.
Culpenbaum;
Liriodendron
Tulipifera. L.



7.
weißer Ahorn
oder großer Bergahorn;
Acer Pseudo-Platanus. L.



8.
Eisbeerbaum;
Pyrus torminalis. Ehrh.




9.
gefüllter Maschholder;
Schneeballbaum
Viburnum Opulus. L.



4.
Gold-Johannisbeere;
Ribes aureum. Pursh.



1.
gemeiner Melonen-Baum;
Caria Papaya. L.




5.
Bastard-Eibisch;
Sammet-Pappel;
Sida Abutilon. L.



3.
Schneeball-blättrige Spierstaude;
Spiraea opulifolia. L.



6.
gemeiner Wunderbaum;
Ricinus communis. L.



2.
Royle's
Schiefblatt;
Begonia Roylei. Koch.

a) fußförmig-getheilt; pedatipartitum; pedatipartie.


b) handförmig-getheilt; palmatipartitum; palmatipartie.



4.
schwarze Nießwurz;
Helleborus niger. L.



1.
Passionsblume;
Passiflora linearis. ?



5.
grüne
Nießwurz;
Helleborus
viridis. L.



2.
schwarze
Meißerwurz;
Astrantia májor. L.



6 a.
sinkende Nießwurz;
Helleborus
foetidus. L.

6 b.




3.
handförmige
Passionsblume;
Passiflora
palmata ? Lodd.

handförmig-getheilt; palmatipartitum; palmatipartie.



1.
violettblühende
Passionsblume;
Passiflora caeruleo-racemosa. Sab.



4.
Efeu-artige Laubrebe,
Jungfernrebe;
Ampelopsis hederacea.
DC. var.
Cycloanthura pedata




2.
Heilkraut,
gemeiner Sankel;
Sanicula europaea. L.




5.
Petersilien-Weinrebe,
Abart des Eutedel;
Vitis laciniosa. L.



6 a.
vielblumiger Hahnenfuß;
Ranunculus polyanthemos. L.



3.
sternblühiger
Winterling;
Eránthis hiemalis. Salisb.



6 b.




6.
hoher Kittersporn;
Delphinium elatum, L.
S. intermedium, Ait.



5.
Störk's Eisenhut;
Aconitum Störkianum,
Rehb.



8.
Wiesen-
Aranihschnabel;
Geranium
pratense, L.



2.
locherblüthiger
Kittersporn;
(oberes Blatt).
Delphinium
laxiflorum, DC.
(folium superius).




1.
kultivirte Stachelbeere;
Ribes Grossularia, L.



4.
gemeiner Löwenschweif;
Leonurus Cardiaea, L.




7.
baumartige Entelea;
Entelea arborescens, R. B.



9.
rundblättriger Aranihschnabel;
Geranium rotundifolium, L.



3.
gemeiner Löwenschweif;
Leonurus Cardiaea, L.
(oberes Blatt; fol. superius).




10.
pyrenäischer Aranihschnabel;
Geranium pyrenaeicum, L.

a) wiederholt-gabeltheilig; *dichotomum*; *dichotomée*.



1.
fluthender Hahnensfuß;
Ranunculus fluitans. Lam.

b) federförmig; *plumiforme*; *partagée en plume (en duvet)*.



3 a.
3 b.
wirtelförmiges Tausendblatt;
Myriophyllum verticillatum. L.



4 a. 4 b. 4 c.
Sumpf-Hottonie;
Hottonia palustris. L.

c) kammförmig; *pectinatum*; *pectinée*.



2 c.

2 b.



5 b. 5 a.
krähensfußblättrige Gilie;
Gilia coronopifolia. Pers.

d) wirtelartig-fiedertheilig; *verticillato-pinnatipartitum*; *pinnatipartie en verticelles*.

Andere nennen diese
Blattform:
vierreihig-gezähnt;
alias: *quadrisariam
dentatum*.



6.
cypresseartige Heiligenpflanze;
Santolina Chamaecyparissus. L.
(ein Zweig; ramus).



2 d.

2 a.

untergetauchtes Hörnerblatt
oder Hinken;
Ceratophyllum demersum. L.



4.

wilde Möhre;
Daucus Carota. L.



3.

Staub-Scabiosa;
Scabiosa columbária. L.



2.

gezeichnete Sammt-Blume;
Tagetes signata. Bart.



1.

gebräunlicher Baldrian;
Valeriana offic. L. *tenuifolia*. Vahl.
(oberes Stengelblatt; fol. caul. superius).



5.

scabiosenartige Flockenblume;
Centauria Scabiosa. L.



6.

gelber Horn-Mohn;
Glaucium luteum. Scop.



7.

verbreitete Knautie;
Knautia vulgaris. Döll.
β. *Kn. arvensis*. Coult.



12.

Mauer-Lattich;
Lactuca muralis. Lessing.



11.

dachziegelige
Wegerich-Nelke;
Statice imbricata. P. B. Webb.



10.

weiße Rübe;
Brassica Rapa. L.
β. *esculenta*. Koch.



8.

Staub-Scabiosa;
Scabiosa columbária. L.



9.

dreibleibige Brunnenkresse;
Nasturtium amphibia. R. H.
β. *Nast. variifolium*. DC.

Uebergang des getheilten ins geschnittene Blatt; *Transitus folii partiti in folium sectum*; *Transition de la feuille partie à la feuille séquée.*



1.
sinkende Kraut;
Ruta graveolens. L.



2.
Reiherschnabel;
Erodium cicutarium. Sm.




3.
Kresse;
Lepidium sativum. L.



4.
wilder Rainfarn;
Tanacetum vulgare. L.




5.
krauser Rainfarn;
Tanacetum crispum.



6.
ebensträußige Wucherblume;
Chrysanthemum corymbosum. L.
Pyrethrum corymbosum. Willd.



7 a.
Jakobskraut; *Senecio Jacobaea. L.*



7 b.



8.
feinblättriger Raukensenf;
Sisymbrium Sophia. L.



4.
Stabwurz-Beifuß;
Artemisia Abrotanum. L.



3.
Hirsch-Pelargonium;
Pelargonium roseum filicifol.



2.
kalifornische
Eschscholtzia;
*Eschscholtzia
californica. Cham.*



1.
Hast-Dolde;
Caucalis daucoides. L.



7.
starke Grevillea;
Grevillea robusta. Cungh.



6.
violette Auhsehelle;
Pulsatilla vulgaris. Mill.



5.
raufarnblättrige Phacelia;
Phacelia tanacetifolia. Benth.



10.
zweizinkiges Fingerkraut;
Potentilla bifurca. L.




9.
gestreute Flocken-Blume;
Centauria maculosa. Lam.




8.
gefiederte Schlich-Blume;
Schizanthus pinnatus. R. P.

gedreit oder dreizählig; ternatum; ternée.



1.
Giftbaum;
Rhus
Toxicodéndron. L.



2.
Pimpernuß;
Staphyléa
trifoliáta. L.



6.
Erdbeere;
Fragária vesca. L.




3.
rauhes Laserkraut;
Laserpitium latifólium. L.



4.
Himbeere;
Hohlbeere;
Rubus Idaeus. L.




5.
Doppelhócker;
Jungfernhérz;
Dicytra spectábilis. DC.




3.
rispige
Waldrose;
Clematis paniculata. Thbg.



2.
zweihäufige
Wiesen-Kraut;
*Thalictrum
dioicum*. L.



5a.
zwei Hüllen
vom Vogelneß;



5b.
Daucus Carota. L.
duo involüera.




4.
gesurchtes
Stechkraut;
Ferula sulcata.
Desf.




1.
gemeiner Haarstrang;
Peucedanum officinale. L.



1.
Alpen-Sinai;
Alchemilla alpina. L.



3.
Hain-Windröschen;
Anemone nemorosa. L.



8.
Kuhwurz;
Potentilla
Tormentilla. Sibth.



2.
Kriechendes Fingerkraut;
Potentilla reptans. L.



9.
Verstecktes Fingerkraut;
Potentilla obscura. Willd.



4.
Mikania Guaco. H. B.



6.
Grünblumige Hacquetia;
Hacquetia Epipactis. DC.



7.
Stunden-Blume;
Hibiscus Trionum. L.



5.



11.
Saaf-Hanf, weiblich;



10.
Kof-Hastanie;
Aesculus Hippocastanum. L.



5.
gemeiner
Odermennig;
Agrimonia
Eupatoria. L.



4.
Gebirgs-
Nelkenwurz;
Berg-Geum;
Geum montanum. L.
Sieversia montana.
Willd.



3.
Gänse-Finger-
kraut; Silberblatt;
Potentilla anserina. L.



1.
Sumpf-Spiräa;
Wiesen-Königin;
Spiraea Ulmaria. L.
unteres Blatt; folium inferius.



7.
Kartoffel, Erdapfel,
Grundbirne;
Solanum tuberosum. L. var.
eine gelbe Varietät.



2.
Anollige Spiräa;
wilde Garben;
Spiraea Filipendula. L.



6.
Eßbarer Liebesapfel;
Solanum Lycopersicum. L.
Lycopersicum esculentum. Mill.




5.
gemeine Berber-Blume;
Poterium Sanguisorba. L.



3.
gemeiner Wiesenknopf;
Sanguisorba officinalis. L.



1. und 2.
gemeine Dibernelle;
(Wurzelblatt; folium radicato).




Pimpinella Saxifraga. L.
(Stengelblatt; folium caulis).



4.
Sanguisorba officinalis. L.
var.



7.
Elæctryon excelsum. Gärtn.



6.
Hundrose; *Rosa canina. L.*



10.



9.
Vogelbeer-Baum;



8.
schöner Sumach;
Rhus elegans. Ait.

6.
gebräuchlicher Fenchel;
Foeniculum officinale. All.



1.
Atkinson's Schönauge;
Calliopsis Atkinsonii. DC.



2.
Damascener-Nelke;
Nigella damascéna. L.



Wasser-Fenchel;
Oenanthe Phellándrium. Lam.



5.
echte Chamille;
Matricária Chamomilla. L. fol. inférius.



4.
Sommer-Adonis-Röschen;
Adónis vstivális. L.



7b.

7a.

die untere Fieder eines
untergetauchten Blattes des

pinna inferior fólii
submersi.

3.
gemeiner Erdbauch;
Fumária officinális. L.





13.

dorniger Erbsenbaum;
Caragana spinosa. DC.



10.

Dweiblatt;
Zygophyllum Fabago. L.



2.

Heuschrecken-Baum;
Hymenaea Curbärl. L.




1.

Pomeranze;
Citrus Aurantium. L.



5.

Wald-Alec;
Trifolium alpestre. L.



9.

großblättrige
Feigbohne;

*Lupinus
macrophyllus. Benth.*



11.

ewiger Alec;
Medicago sativa. L.



6.

Bohnenbaum; Goldregen;
Cytisus Laburnum. L.



8.

eichblättriger Bohnenbaum;
Cytisus Laburnum. L.
e) *quercifolius. hort.*



12.

officinerer Stein-Alec;
Melilotus officinalis. Lam.



3.

Südl. Erbsenbaum;
Caragana australis. DC.



4.

Wiesen-Alec; kult.
Medicago pratense. L.



7.

südl. Baptisia;
Baptisia australis. R. Br.



Strauß-Wicke;
Lathyrus latifolius. L.




gemeine Erbse;
Pisum sativum. L.



gebräuchliches Guajakholz;
Guajacum officinale. L.



knollige Wald-Erbse;
Oröbus tuberosus. L.



Frühlings-
Wald-Erbse, *Oröbus*
vernus. L.




Baum-Wicke;
Vicia sepium. L.



baumartiges Guajakholz;



Saat-Wicke;
Vicia sativa. L.



Vogel-Wicke;
Vicia Cracca. L.



6.
Palisander-Baum.
Machærium firmum. Benth.
Nissolia firma. Arrab.



7.
exotische
Murraya.
Murraya
exotica. L.



1.
Nechpalmblättrige *Mahonia*;
Mahonia Aquifolium. Nutt.



5.
strauhartige



4.
parkwurzelder
Crompeten-Strauch;



2.
Crompeten-Strauch
vom Cap d. g. Hoffnung.
Bignonia capensis. Thbg.
Tecoma capensis. H. Don.




3.
Kleinblättrige
Edwardsia;
Edwardsia microphylla.
Salisb.
syn:
Sophora
microphylla.

unpaarig-gesiedert; impari-pinnatum; pennée avec impaire




1.
Erbsenbaum;
Robinia Caragana.
L.




2.
strauchige
Kronwicker;
Coronilla Emerus. L.



3b.
Japanische
Sophora;
Sophora japonica. L.



4.
gemeines Süßholz;
Glycyrrhiza glabra. L.



3a.



5a.
angebauter Esparsette;
Onobrychis sativa. Lam



6a.
dreidornige Gleditschie; Gleditschia triacantha. L.



6b.

Mehrmal-zusammengesetzte
Gelenks-Blätter.

Folia articulata
pluries composita.


Feuilles articulées
composées à plusieurs reprises.




3.
arabische Akazie;
Acacia arabica. Willd.



1.
Drummond's
Akazie; *Acacia*
Drummondii. Benth.




2.
schamhafte Sumpflanze;
Mimosa pudica. Benth.



6.
canadischer Schusterbaum,
Gymnocladus canadensis. Lam.

zerstüßter
Flügel-Lappen;
Pterolobium
lacerans. R. Br.
5.



4.
verschiedenblättrige Akazie;
Acacia heterophylla. Willd.
(Zweig mit 2 Blattstiel-Blättern.)

(ramus cum 2
phyllodis).

